

欽定四庫全書

子部
傷寒類方卷下



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

傷寒類方卷下

文選

傷寒類方卷下

吳江徐大椿撰

五枚芒硝 三合 右四味

五升去滓內大黃煮取
兩沸分溫再服得下餘

欽定四庫全書

傷寒類方

一

勿服

傷寒若吐若下後不解壞症不大便五六日上至十餘日

日晡時發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不

識人循衣摸牀惕而不安微喘直視以上皆陽明危症因吐下之後竭其

中氣津液已耗孤陽獨存胃中乾燥或有燥屎故現此等惡症脈弦者生濇者死陰氣

尚存且能尅制胃實濇則氣血已枯矣然弦者尚有可生之理未必盡生濇則斷無不死者也微者但

發熱潮熱譫語者惡症皆無大承氣湯主之若一服利止後服

中病即止

陽明病譫語有潮熱反不能食者

客熱不能消穀

胃中必有燥

屎五六枚若能食者但鞭爾

能食非真欲食不過粥飲猶可入口耳不能食則穀

氣全不可近腸胃實極故也

宜大承氣湯下之

鞭即可下當在腸中今云胃中

何也蓋邪氣結成糟粕未下則在胃中欲下則在腸中已結者即謂之燥屎言胃則腸已該矣

汗出譫語者以有燥屎在胃中此為風也

陽明本自汗出然亦有不

汗出者此指明汗出之為風則知汗出乃表邪尚在不汗出者為火邪內結也

須下之過經乃

可下之

此下之時

下之若早語言必亂

輕於譫語

以表虛裡實

故也

下早則引表邪入裡故表虛而裡實

下之則愈宜大承氣湯

雖已誤下然見

譫語等症則更下之亦不
因誤下而遂不復下也

二陽併病

同起者為合病一經未罷一經又病者為併病

太陽症罷但發潮熱

手足絳絳汗出大便難而譫語者

以上皆陽明現症

下之則愈

宜大承氣湯

陽明病下之心中懊懣而煩

此乃下之未盡故有此實煩

胃中有燥

屎者可攻

胃中燥屎必別有現症

腹微滿初頭鞭後必溏不可下

也

僅微滿則無燥屎故不可攻

若有燥屎者宜大承氣湯

病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明

也脈實者宜下之脈虛浮者宜發汗下之與大承氣湯

發汗宜桂枝湯

詳解前桂枝湯下

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也

所以然者本有宿食故也

惟有宿食故雖大下而燥屎終未盡

宜大承氣

湯

病人不大便五六日繞臍痛

正在燥屎之位

煩燥發作有時者

此有燥屎故令不大便也

病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘冒不能卧

者有燥屎也

喘冒不卧燥屎現症宜大便秘有難無易所以乍易者以小便不利之故燥屎不以易

便而宜大承氣湯

以上三條皆証明有燥屎之法

得病二三日脈弱無太陽柴胡症煩燥心下鞭

邪熱入裡

至

四五日

又隔二日

雖能食以小承氣湯少少與微和之

不必用全

方祇通其胃氣而已又用藥之一法

今小安至六日

又隔一日而病未除

與大承氣

湯一升

亦不必用全方古人用藥雖現症鑿鑿而輕方小試敬慎小心如此

若不大便六

七日小便少者雖不能食但初頭鞭後必溏未定成鞭

小便不利則水穀未盡分大便猶濕也

攻之必溏須小便利屎定鞭乃可

攻之

以小便之利否定宜下不宜下又一法

宜大承氣湯

傷寒六七日目中不了了睛不和

皆陽盛之象

無表裏症

邪已

結在裏

大便難身微熱者此為實也

邪結為實

急下之宜大承

氣湯

陽明病

此三字包陽明諸症

發熱汗多者急下之

此重在汗多恐內熱甚而逼陽

於外以致亡陽也

宜大承氣湯

發汗不解腹滿痛者

不解二字必兼有陽明症加以腹滿且痛則實邪有徵矣

急下

之宜大承氣湯

腹滿不減減不足言

雖畧減而仍腹滿也

當下之宜大承氣湯

以上

諸條舉當下之一二症即用下法然亦必須參觀他症而後定為要

陽明少陽合病必下痢其脈不負者順也負者失也

少陽

屬木脈當弦緊陽明屬土脈當洪緩若少陽脈勝為負陽明脈勝為不負也厥陰篇云少陰負趺陽者為順也少陰屬水趺陽屬土土能勝水則胃氣尚強故為順即此意但彼處乃手足厥冷之利故屬少陰此則屬少陽為異
互相尅賊名為負也脈滑而數者有宿食也

滑數則陽

明之脈獨見而過盛此為實邪故知有宿食

當下之宜此湯

寸口脈浮而大按之反澁尺中亦微而澁

有食而反微澁此氣結不

通之故知有宿食當下之宜大承氣湯

少陰病得之二三日

陽邪初轉入陰

口燥舌乾者急下之

陽邪傳陰

腎水欲涸故當急去其邪以保津液

宜大承氣湯

少陰病自利清水色純青

純青則非寒邪乃肝邪入腎也難經云從前來者為實邪

心下必痛口乾燥者

二症尤見非寒邪

急下之宜大承氣湯

二條

俱重口乾知

為熱邪無疑

少陰病六七日腹脹不大便者急下之

不便而脹為日久是以當下

宜大承氣湯

下利三部脈皆平

無外邪症

按之心下鞭者

實邪有形

急下之宜

大承氣湯

下利脈遲而滑者內實也利未欲止當下之宜大承氣

湯

下利不欲食者以有宿食故也

傷食惡食凡禁口利當亦必因宿食之故

須下之宜大承氣湯

下利差後至其年月日復發者以病不盡故也當下之

宜大承氣湯

下利脈反滑當有所去

脈滑則實邪不留

下之乃愈宜大承氣

湯病腹中滿痛者此為實也當下之宜大承氣湯

脈雙弦而遲者必心下鞭

木邪乘土

脈大而緊者陽中有陰

也

大為陽緊為陰

可以下之宜大承氣湯

按以上七條見傷寒論可下條內似指雜

症可下法不入

六經治法中

小承氣湯二

大承氣去芒硝厚朴枳實亦減

大黃

四兩

厚朴

二兩

枳實

三枚

右三味以水四升煮

取一升二合去渣分溫二服初服湯當更衣不爾者

盡飲之若更衣勿服

陽明病脈遲雖汗出不惡寒者

凡汗出者皆惡寒

其身必重短

氣腹滿而喘有潮熱者

以上皆內實之症

此外欲解

不惡寒

可攻裡

也手足濇然汗出者此大便已鞭也

四支為諸陽之本濇然汗出陽氣已

盛於土中矣以此驗大便之鞭又一法

大承氣湯主之若汗多微發熱惡

寒者外未解也其熱未潮未可與承氣湯若腹大滿不

通者可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下

腹滿不通雖外未解

亦可用小承氣此方乃和胃之品非大下之峻劑故也

陽明病潮熱大便微鞭者可與大承氣湯不鞭者不可

與之

潮熱而便不鞭亦禁下

若不大便六七日恐有燥屎欲知之

法少與小承氣湯入腹中轉失氣者此有燥屎也

此以藥探

之又乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞭後必溏不

可攻之攻之必脹滿不能食也

邪氣因正虛而陷入

欲飲水者與

水則噦

寒熱相爭則噦

其後發熱者必大便復鞭而少也

重傷津液

以小承氣湯和之

仍用小承氣以大便鞭故也

不轉失氣者慎不可

攻也

又再申前戒聖人之慎下如此

陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞭鞭則

譫語

譫語由便鞭便鞭由胃燥胃燥由汗出津液少層層相因病情顯著

小承氣湯主之

若一服譫語止更莫復服

陽明病譫語發潮熱脈滑而疾者小承氣主之

因滑疾則易下

故止用小承氣

因與小承氣湯一升腹中轉失氣者更服一升

若不轉失氣勿更與之明日不大便脈反微濇者裡虛

也為難治

攻之不應是為難治

不可更與承氣也

太陽病若吐若下若發汗後

治過微煩小便數大便因鞭

者因字當著眼大便之鞭由小便數之所致蓋吐下小汗已傷津液而又小便太多故爾微鞭非實邪也

承氣湯和之愈

下利譫語者有燥屎也

利而仍譫語邪火不因利而息則必有燥屎蓋燥屎不因下利

而去也後醫見利則不復下豈知燥屎之不能自出乎

調胃承氣湯三

大黃

四兩去皮清酒洗

甘草

二兩炙

芒硝

半升

右三味以水三

升先煮大黃甘草取一升去滓內芒硝更上火微煮

令沸少少溫服之

按芒硝善解結熱之邪大承氣用之解已結之熱邪此方用之以解