

# 欽定四庫全書

子部

續名醫類案卷二十六



南京中医药大学图书馆版权所有



欽定四庫全書

續名醫類案卷二十六

遺精

錢塘魏之琇撰

孫文垣治一人色慾過度夢遺精滑先服清相火之劑  
不效繼用固澁之劑亦無功求孫治與以玉華白丹  
濃煎人參湯送二錢兩服後稍固無進六味地黃丸  
加蓮鬚芡實遠志五味子凡一月而愈玉華白丹鍾

乳粉白石脂陽起左顧牡蠣

李妓兩寸短澁兩尺洪滑關弦孫診之問經可行否曰  
僅行一日亦點滴耳曰此脉在良家主夢遺若不宜  
有也曰良然即御客時亦或遺遺則冷汗淫淫體倦  
不能支不與藥或問故曰金木相勝心神無主法在  
不治或謂人尚無恙何便至此曰弦為春令當金之  
時猶然猖獗設在卯月木旺火相則肺金枯痿水之  
上源竭矣且腎脉洪滑妓以慾勝陰血既虧淫火愈

熾陰虛則病陰絕則死今已咳嗽其兆見矣烏可治乎次年二月果死

薛立齋治朱工部勞則遺精齒牙即痛用補中益氣加半夏茯苓白芍并六味地黃丸更以十全大補加麥冬五味子而痊

一男子白濁夢遺兼脚跟作痛口乾作渴大便閉澀午後熱甚用補中益氣湯加白芍元參并加減八味丸而愈

龔子才治陳桂林秀才患夜夢遺精每月一二次或三五次遺後神思昏沈身體困倦診之六脉微瀯無力此陰虛火動之症以辰砂既濟丸加紫河車龍骨服之數月奏效奈數患不能謹守因口占里語一章以戒之曰培養精神貴節房更祛塵慮慎寒涼食惟半飽宜清淡酒止三分勿過傷藥餌隨時應勉進功名有分不須忙幾行里語君能味便是長生不老方

黃履素曰余年三十外曾患遺精龜頭時有精微微流

出晝夜常然初時驚懼特甚人身中幾許精血而堪  
此涓涓不絕乎醫之高明者謂為無害但毋服瀉藥  
緣病以服附子得之知是火症但涼補而勿熱補用  
六味丸加沙苑蒺藜兔絲子及炒黃柏少許等藥將  
此病付之度外莫寘諸懷如常將理凡兩年始全愈  
龍骨牡蠣等藥從未入口蓋人身中惟氣血周流斯  
快暢豈可澁之使滯雖得暫效為害實深患者審之  
予初有懼心及兩年間應酬如常絕無倦態豈此精



與交媾之元精不同故無大害耶

張路玉治韓慕廬季子素稟清癯宿有精滑不禁之恙  
診之脉微弦而數尺中畧有不續之狀此不但腎氣  
不充抑且氣秘不調致不能司封藏之令與六味丸  
去澤瀉加鯢膠五味畧兼沈香於補中寓宣法雖如  
此但久滑竅䟽難期速效耳

李士材治一人考試勞神患精滑小便後及夢寐間俱  
有遺失自服金櫻膏經月不驗李診之曰氣虛而神

動非遠志丸不可服十日減半一月全愈

王叔權曰有士人年少覓灸夢遺為點腎腧痠疼令其  
灸而愈不拘老少皆腎虛也古人云百病皆生于心  
又曰百病皆生于腎心勞生百病人皆知之腎虛亦  
生百病人未知也蓋天一生水地二生火腎水不上  
升則心火不下降茲病所由生也人不可不養心不  
愛護腎也

資生  
經

平江譚醫云夫遺泄尋常只治心腎未有別治以素問



仲景考之當治脾服之藥屢效用厚朴二兩薑汁製羊

脛一兩

炭火煨過通紅取出  
審殺別研細如粉

右二味白水麵糊為丸

如梧桐子大每服百丸至三百丸米湯下

集成  
全上

陸祖愚治一人因作文夜深倚几而卧卧即夢遺明早

吐血數口數日後復遺復吐自此或間日或連日或

吐血或夢遺或與六味地黃湯幾百帖即加減亦不

出滋陰清火而已數月不愈口乾微欬惡風惡寒懶

于動作大便澹小便短赤脉之豁大無力沈按則駛

曰此症非得之房室乃思慮太過損其心血心血虛則無以養其神而心神飛越因有夢交之事神不守舍則志亦不固而腎精為之下遺腎虛則火益無制逼血妄行而吐上刑肺金而欬其畏風寒而懶動作者火為元氣之賊火旺則元氣自虛也其肌肉消而大便溏者思慮損其心血即是傷其脾陰也與歸脾湯二十劑遺吐遂減半又二十劑諸症俱痊百劑而精神加倍矣

繆仲淳治婁東王官壽患遺精聞婦人聲即泄瘠甚欲死醫告術窮繆之門人以遠志為君蓮鬚石蓮子為臣龍齒茯神沙苑蒺藜牡蠣為佐使丸服稍止然終不斷繆于前方加鯁膠一味不終劑即愈

趙景之太史未第時因肄業勞心太過患夢遺症已三四年矣不數日一發發過則虛火上炎頭面烘熱手足逆冷終夜不寐補心腎及瀉精藥無不用過壬申春偶因感冒來邀診視談及前症之苦為疏丸方以



黃柏為君佐以地黃枸杞蓮鬚鰾膠萸肉五味車前  
及麥冬之類不終劑而瘳初景之疑黃柏太寒不欲  
用謂尊恙之所以久而不愈者正未用此藥耳五臟  
苦欲補瀉云腎欲堅急食苦以堅之黃柏是也腎得堅則心經雖  
有火而精自固何夢遺之有哉向徒用補益收澁而  
未及此故難取效

立齋治王上舍遺精勞苦愈甚坳中結核服清心蓮子  
飲連翹消毒散不應以八珍湯加山藥萸肉遠志十

餘劑漸愈更以茯苓丸治之遂不復作葉巡檢患此  
云諸藥不應盧丹谷與八味丸治之而愈

白濁

沈朗仲治王雨泉壯年氣弱溺後精水淋漓不斷服六  
味丸不應易八味丸反加澁痛兩尺脉數而氣口虛  
大此土虛不能隄水也與補中益氣加麥冬五味十

劑而痊

張氏  
醫通

薛立齋治一婦人善怒或小腹痞悶或寒熱往來或小

便頻數時下白淫藥久不愈面青口苦薛以此積憤而不能發散所致用龍膽瀉肝湯而愈用加味道遙散八珍湯間服而安

龔治一男子莖中痛出白津小便閉時作痒用小柴胡加山梔澤瀉木通炒連膽草茯苓二劑頓愈又兼六味地黃而痊

司廳陳石鏡久患白濁發熱體倦用補中益氣加炮薑四劑白濁稍止再用六味地黃丸兼服諸症悉愈



少宰汪涵齋患頭暈白濁用補中益氣湯加茯苓半夏  
愈而復患腰痛用山藥山萸五味草薢遠志頓愈又  
因勞心盜汗白濁以歸脾湯加五味而愈後不時眩  
暈用八味丸全愈

孫文垣治一人稟質素強縱飲無度忽小便畢有白精  
數點自以為有餘之疾不宜醫治經三月以來雖不  
小便時有精出覺頭目眩暈此上病多由下之證驗也醫者以固  
精澁脫之劑治之兩月畧不見功診之六脉滑大此

因酒味濕熱下注精藏遂以白朮茯苓橘紅甘草乾葛白豆蔻加黃柏少許兩劑即效不十日全安

潘見所患白濁精淫淫下治三年不效孫診之兩寸短弱兩關滑兩尺洪滑曰疾易愈第待來年春仲一劑可瘳問故曰素問云必先歲氣毋伐天和今所患為濕痰下流症也而脉洪大見於尺部為陽乘於陰法當從陰引陽今冬令為閉藏之候冬之閉藏實為來春發生根本天人一理若強升提之是逆天時而洩

元氣也後醫者接踵竟無效至春分逆孫以白螺螄

殼火煅四兩消痰為君牡蠣二兩固瀉為臣半夏消痰葛根

升陽明之清氣柴胡升少陽之清氣苦參燥濕各一兩為佐黃柏堅腎一

兩為使麵糊為丸名端本丸令早晚服之不終劑而

愈

李士材治李郡侯白濁服五苓散數劑無功診之兩尺

大而瀉是龍火虛炎精瘀竅道用牛膝茯苓黃柏麥

冬山藥遠志細生甘草十劑而安