

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百四十八



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院院使_臣張肇基

編修_臣倉聖脈覆勘

華濟方卷之二十四

痛症

心症

胃氣

周王朱櫛 撰

痛者痛也由陰陽氣責于

痛謂之心也其痛也

候也○內經謂診得心

也心為牡臟小腸為之

使故曰小腹當有形也夫臟病必傳於腑今心不受邪
病傳於腑故小腸受之為疝而痛當有形也世之醫者
以疝為寒濕之疾不知心氣之厥亦能為疝心疝者當
兼心氣以治之

方

牡丹丸 治心疝心痛如錐所刺

牡丹皮

桂皮去

芍藥

烏頭

皮炮去

細辛

甘草

炙

木香

吳茱萸

湯浸
焙炒

檳榔

各一
兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下不拘

時

赤芍藥丸

出聖惠方

治心疝心腹中如錐刺疼痛脇下脹滿

赤芍藥

去蘆

桔梗

去蘆頭

細辛

桂心

川椒

去目及閉口微

炒出汗

乾姜

炮製剉

附子

炮製去皮臍

木香

檳榔

各一兩

右為末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服以熱

酒下三十丸日四五服

木香散 治心疝心痛不可忍

木香

羌活

去頭 蘆

檳榔

生剉

牡丹皮

當歸

切炒

桂皮

青橘皮

湯浸去白皮炒

蓬莪朮

煨各一兩

右為散每服二錢沸湯或溫酒調下不拘時

蓬莪散

治心疝痛肢體虛冷

蓬朮

煨

檳榔

生剉

附子

炮製去皮臍

甘草

剉

桂皮

去麁

胡椒

半兩 芎藭

白朮

各三分

右為末每服二錢水一盞煎七分溫服不拘時

桃仁丸

出聖惠方

治心疝心痛四肢逆冷面色青黑

桃仁湯浸去皮尖双仁麩炒微黃沒藥安息香乳香麝

香細研桂心木香吳茱萸湯浸七遍焙乾微炒各一分

右為末都研令勻用蒸餅和丸如小豆大不拘時以少酒嚼下二十丸

治心疝心腹中如錐刀所刺疼痛出聖惠方

巴豆木香檳榔各半兩附子去皮臍生用川烏頭去皮

臍生用乾漆搗碎炒桃仁湯浸去皮尖蓬莪茂各共一兩
令煙盡
分

右件藥先以巴豆附子烏頭等三味以水煮一日久
取出各去皮巴豆去心膜一處搗如泥諸藥別搗羅
為末相和巴豆等分入醋麵糊丸菴豆大不拘時醋
湯下五丸

芍藥丸 治心疝心脇痛及繞臍痛

芍藥

桔梗

去蘆炒

細辛

去苗葉

蜀椒

去目閉口炒去汗

桂心

去皮 乾姜

炮共三分

附子

炮製去皮臍半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸溫酒或鹽

飲不拘時

木香散 治心疝心脇痛及繞臍痛

芍藥

桔梗

去蘆頭

細辛

去苗葉

蜀椒

去目閉口炒去汗

桂

去皮

乾姜

各五分

附子

炮去皮臍一兩

牡丹丸 治疝氣心腹痛

牡丹

桂心

川烏頭

炮製去皮臍

木香

吳茱萸

湯浸

七
遍
檳榔

各一兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如菉豆大每服以溫

酒服十丸日四五服

硃砂丸 治心疝心腹中疔刺疼痛不可忍

硃砂細研半兩桂心半兩桃仁湯浸去皮尖雙仁麩炒黃半兩附子炮製去皮

臍一兩麝香半錢巴豆二十一枚去皮心研紙煨去油

右為末麵糊和丸如梧桐子大每服醋湯下二丸

治心疝發作有時激痛難忍者

以麝茵吳茱萸等分搗末蜜丸如麻子大每服二

丸日三服勿熱食一方以茱萸一升麝茵如彈子

大服一丸合搗以鷄子白和丸如小豆大服二丸

即止

紫桂丸 治陰交攻心疝疼痛

桂

去粗皮
半兩

當歸

焙三分

吳茱萸

湯洗焙
一兩

右為末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服二十丸炒生

姜鹽酒下米飲亦得日三服

治心疝心腹內攻刺疼痛腹脇虛脹宿食不消或時吐

逆少思飲食

硃砂

細研水飛過

半夏

湯洗七次去滑共一兩

川烏頭

半兩去皮臍生用

右為細末醋煮麵糊和丸如小豆大不拘時以生姜

橘皮湯下

三溫散 治心疝冷痛不可忍

附子

炮製去皮臍

蓬莪茂

煨剉各一兩

右為散每服一錢匕熱酒調下不拘時婦人醋湯下

治三十年心疝神效方

射干

半兩

吳茱萸

二兩湯浸七次焙乾微炒

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服五丸以粥飲下日
三服藥勢欲盡乃可喫熱食良

木香散 治心疝小腹痛悶已絕者

木香 陳皮 各一兩 良姜 乾姜 訶子皮 赤芍

藥 枳實 各半兩 草豆蔻 川芎 黑牽牛 各三錢

右為末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

厥疝 附論

夫內經謂脉黃之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣

名曰厥疝女子同法得之疾使四肢汗出當風夫疝臟疾言隱而難見陰沉而伏也今脾虛風寒客於膜腹之間不能興通行水穀之氣結而成積使氣道厥而通故謂之厥疝

方

懷香丸 治厥疝上攻腹痛無時

懷香子

炒

吳茱萸

酒浸焙乾炒

桂

去粗皮

胡椒

棟實

剉碎

麩炒

延胡索

各半兩

蜚蠊

去翅足炒

海蛤

芫花

醋炒焦

礞石

研木香共一兩

右為末酒煮麵糊和丸梧桐子大每服十丸鹽酒下

食前

山茱萸丸 治厥疝上搶心腹冷痛

山茱萸 吳茱萸湯洗焙乾 食茱萸 棟實剉碎麩炒 馬蘭

花 懷香子焙 青橘皮湯浸去白焙 陳橘皮湯浸去白焙 乾

姜炮 荊三棱炮各三兩 附子一枚重兩半者炮製去皮臍

右為末醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十丸酒

或鹽湯下空心服

細辛丸 治厥疝冷逆攻心腹痛

細辛

去苗葉

芍藥

吳茱萸

湯浸焙乾炒

人參

白朮

桂

去粗皮

乾姜

炮

甘草

炙

當歸

切焙

附子

炮製去皮臍各一兩

右為末稀麵糊丸梧桐子大空心米飲下三十丸日

三服

木香湯 治厥疝逆上攻心腹冷痛

木香

檳榔

生剉

烏頭

炮製去皮臍

細辛

去苗葉

當歸

切焙 吳

茱萸

湯浸焙乾炒

枳殼

去瓢麩炒

甘草

炙各一兩

右咬咀如麻豆每服三錢水一盞煎至七分去滓溫

服不拘時

吳茱萸湯

出宣明論

治厥疝腹中陰冷痛積氣上逆

吳茱萸

湯洗焙乾炒二兩

烏頭

炮製去臍皮

細辛

去苗葉各三分

當歸

切焙

高良姜

剉炒

乾姜

炮去粗皮各一兩

桂

去粗皮各一兩

右剉如麻豆大每服五錢水三錢煎一盞去滓溫服

日三