

采談座中醫仁崇

(附 祕 驗 方)

第 一 集

江西省崇仁縣醫葯衛生學會合編
醫葯科學研究所

1959年12月

前、言

「崇仁中醫座談錄」，它是全縣人民向疾病作鬥爭的極為豐富的經驗積累，又是全縣中醫豐富經驗的總結。同時，也是祖國醫學偉大寶庫的一部份。

在黨和毛主席的英明領導下，全縣中醫中藥工作者經過一系列的政冶運動，政治思想覺悟和工作積極性都大大地提高了。由於堅持貫徹執行了黨的中醫政策，中醫中藥事業在全縣亦得到了巨大的發展和提高。在除害滅病、保護廣大勞動人民身體健康，促進工農業生產都取得了輝煌的成績。


「崇仁中醫座談錄」，主要是根據全縣兩次老中醫座談會上交流經驗、獻方獻寶的材料整理而成的，同時，把搜集到的流傳在廣大勞動人民手中的寶貴的驗方、秘方編了進去，本書包括內科、外科、婦科、兒科、針灸科、耳、鼻、眼、喉科。而且着重介紹姜片蟲、鉤蟲、血絲蟲、瘧疾、頭癬等六個危害最大的地方病。這主要是供給醫務工作者臨床參考，讓廣大羣眾所掌握，使祖國醫學不斷的豐富和提高。因此，殷切地希望全縣醫務工作者在實踐中不斷地注意隨時總結提高，並隨時向我們反映情況，準備以後陸續出第二集、第三……。

在這里，我們謹向獻出單方、驗方、秘方的中醫和廣大羣眾致以崇高的敬意。在搜集整理過程中，許多同志都給予熱情的幫助，我們表示衷心的感謝。特別希望全縣人民繼續獻出寶貴的單方、驗方、秘方。由於編者缺乏經驗，有錯誤之處，誠懇地希望同志們批評指正。

崇仁縣醫藥衛生學會 合編
醫藥科學研究所

45661

崇仁县第二届中医座谈会 59年11月3日



江西崇仁中医座談录第一集

目 录

病 例

絲 虫 病	1 例
鉤 虫 病	1 例
姜 片 虫	1 例
瘧 疾	1 例
变形虫痢疾	1 例
头 瘡	1 例
五 运 六 气	1 例

58年病例(附秘驗方)

瘧 疾	1 例
痢 疾	1 例
麻 疹	1 例
流行性腦膜炎	1 例
流行性感冒	1 例

內 科(寄生虫)

瘧 疾	10 方
变 形 虫 痢	7 方
鉤 虫 病	15 方
姜 片 虫	2 方
絲 虫 病	27 方

呼吸系統

肺	結	核		2方
肺		癰		1方
咯		血		5方
肺	水	腫		1方
胸		痛		1方

消化系統

食	后	作	飽		3方
胃			痛		15方
呃			逆		1方
朝	食	暮	吐		1方
腹			痛		4方
吐			得		8方
赤	白		痢		23方
霍			亂		1方
先	霍	后	痢		1方
黃			疸		13方
脫			肛		2方
虫			痛		1方
腸			瀉		2方
鼓	腸		痧		3方
腹			水		2方
單	腹		脹		1方
扁	桃	體	炎		2方
先	便	后	血		1方
水	腫		病		5方

循环系統

經常頭昏	1方
心悸	1方

神經系統

偏頭痛	2方
體弱頭痛	1方
頭痛不愈	1方
癲·狂·瘋	8方

泌尿生殖系統

疝氣	3方
血淋	2方
遺精	2方
白濁	1方
小便不通	5方
小便頻數	1方

婦科

調經	6方
白帶	3方
崩漏	7方
子宮下墜	6方
安胎	2方
產后	5方
血瘀	1方
骨蒸癆	1方

避 孕..... 1方

儿 科

急 驚 風..... 3方

慢 驚 風..... 2方

兒 不 吃 乳..... 2方

赤 白 痢..... 1方

吐 瀉..... 3方

疳 積..... 2方

百 日 咳..... 1方

冷 積 腹 痛..... 1方

誤 吞 銅 錢..... 1方

虫 痛..... 2方

遺 尿..... 2方

顙 門 腫 起..... 1方

顙 門 下 陷..... 1方

顙 門 不 合..... 1方

丹 毒..... 1方

蚯 蚓 風..... 1方

麻 疹..... 3方

走 馬 牙 疳..... 2方

針 灸 科

扁 桃 體 炎..... 1方

腿 夾 生 痒..... 1方

唇 疔..... 1方

牙 痛..... 2方

咽 喉 腫 痛..... 1方

虛 脫..... 2方

嘔	吐	1方
絞	腸痧	1方
風濕關節	炎	2方
大腿神經	痛	1方
胃	痛	3方
腹	痛	1方
腹	瀉	1方
癰	瘰	1方
三	日瘧	1方
偏	頭痛	1方
經	閉	1方

眼耳鼻口齒咽喉科

眼	病	13方
耳鳴耳聾		1方
鼻	炎	1方
鼻	衄	8方
酒渣	鼻	1方
口腔	炎	8方
腮腺	炎	2方
牙	痛	5方
咽喉	痛	11方

• 其他系統

大	頸病	1方
痧	痧	1方
食	菇中毒	1方
下肢關節	腫痛	2方
鶴	膝風	1方

腰 背 痛	1 方
風溼關節痛	3 方

外 科

癰	毒	7 方
担	癰	2 方
背	發	4 方
楊 梅	瘡	1 方
疥	瘡	2 方
溼	疹	6 方
痔	瘡	2 方
馬 面	毒	3 方
乳	癰	1 方
乳 腺	炎	2 方
鼠溪淋巴腺	炎	1 方
癰	瘡	2 方
鷄 眼	疽	1 方
疔	瘡	9 方
癰	疽	4 方
無 名 腫	毒	4 方
穿 節	龜	1 方
下	疳	1 方
皮 膚 潰 爛		2 方
皮 膚 炎		1 方
踝 腫 爛		1 方
頭 癬(卷子頭)		12 方
髮	癬	1 方
頑	癬	3 方
凍	瘡	3 方

刀		伤		16方	
湯	火	伤		12方	
蛇	咬	伤		10方	
蜈	蚣	伤		2方	
狗	咬	伤		1方	
虎	咬	伤		1方	
跌	打	損	伤		5方

絲 虫 病

(一) 絲虫病即古代脚气

1. 絲虫病為現代醫學病名，在祖國醫籍中并無該病名的記載，然對此病狀的敘述及治療，則可謂豐富多采，如聖濟總錄脚氣統論曰：風毒中人，隨處悉能為病，偏著于脚者何也？蓋五臟經絡心肺起于手十指，肝腎脾起于脚十指、地之蒸濕毒氣，脚先受之，久而不差，漸及四肢。古人所謂微時不覺，痼滯乃知，所以謂之脚氣也」，又串雅中亦有此記述，「脚氣一症，俗稱大脚風是也，水鄉農人多患之，一腫不消，與尋常脚氣發過即消者不同，此因經絡凝滯氣阻，熱邪夾雜留戀，膀間焮核而痛，憎寒壯熱，滯而下行，至脚即腫脹木硬，終身不便，誠可憫也」諸病沉候論脚腫候云，「脚腫病者，自脚以下至踝反趾俱腫是也」，皆由氣血虛弱，風邪傷之，經絡否澀而成也」，又脚氣不仁候云，「此由風濕毒氣與氣血相搏，正氣與邪氣交击，而正氣不宜散故疼痛，邪在膚腠，氣血則澀，澀則皮膚厚、搔之而隔衣不知覺，是名為不仁也」。

2. 從現代醫藥的敘述，謂絲虫寄生于人體的淋巴管與淋巴結中，交尾后雌虫所生的幼虫（幼絲虫）隨淋巴液到達血液循環中，白天大部份存在于肺內，以蚊虫傳染為媒介，至于此症的記載、與祖國醫學文獻所述，如出一轍，是以現代絲虫病，即可肯定為古代の脚氣。

(二) 病 因

絲虫病的病因，有內外二因，一是內因，七情失節，正氣虛弱，二是外因，感受濕邪風毒所致，發病地區，大多數在我國東南各省，因地處卑濕易于感受濕邪風毒而成是病。

(三) 病 理

1. 脚氣之爲病，多由正氣虛弱，濕邪風毒因之而入，蓋地之濕毒脚先受之，營衛氣血，受其損傷，以致陰陽失調，故憎寒壯熱，正邪相拒，氣血則滯，瘀凝氣阻，于是熱邪相雜，以致腠間形成癰核，逐漸下肢腫大，（左右不定），久而不愈，皮膚增厚，則知道不仁，至此邪氣根深蒂固，故下肢腫硬不消，甚至上肢及陰囊，陰唇、乳房等处均有腫症出現。

2. 考現代醫學常見的絲虫有馬來及班氏二種是經蚊之媒介，而傳入人體后，需經一年左右才發育爲成虫，以后因成虫寄生于淋巴管或淋巴結內，時日一久，淋巴管不斷受成虫物理性刺激，使管壁逐漸增厚，以致梗塞，使淋巴液流通不暢，故常易引起淋巴管及淋巴結發炎、疼痛，且伴有發熱。此種病狀持續10—14日后，淋巴管炎則形消失，患者暫時又無症狀，但數日后又復發，如是反復發作，轉成慢性期，淋巴管及淋巴結因時常發炎其結果四周組織就逐漸增生變厚，數年后形成爲各部位象皮病，如腿脚的象皮病，陰囊或陰唇象皮病等。此等部位，因淋巴流通不暢極易爲細菌侵襲傳染，越受細菌傳染，越易發炎增厚，患者發生下肢象皮病時，可較正常下腿粗達數倍，他如精索炎，付睪炎、睪丸炎、乳糜尿等亦所常見。

(四) 症 狀

1. 早期症狀：中醫稱之爲流火、如外科全生集云，「患生小腿，紅腫熱痛，不潰不爛、總無痊愈之日，經常發作」，又瘍醫大全云，「流火兩足紅腫光亮，其熱如火者是也」，本症初起時憎寒壯熱，下肢紅腫疼痛，并有紅絲沿脚脛至腠間，兼有癰核等症狀，雖不治療，數天后亦能自愈，但不久復發。

2. 中期症狀：發時仍有寒熱，下肢腫硬，皮膚增厚，雖全身症狀消失后，惟脚脛仍有微腫，頻發則腫，勢隨之增加。

3. 晚期症狀：因病勢繁發，下肢腫硬不消，皮膚增厚，下肢知

覺不仁（即今所謂象皮病），間或亦稍有寒熱，有少數患者除下肢腫滿以外，陰囊、陰唇、上肢及乳房等处均能引起腫滿。

（五）診 斷

1. 根據居住地區及病史來決定。
2. 現代醫學，區域及年齡均屬重要，12歲以下的兒童患絲虫病者很少，在無症狀期及急性期于午夜檢查患者血液，尋獲特殊之幼絲虫，診斷即確實。

（六）治 療

絲虫病初期小腿紅腫光亮其熱如火，脈數有力者可用清涼解毒之劑，如黃芩、黃柏、黃連、玄參、生地、梔子、銀花、連翹、甘草等。

如屬于寒濕者，用人參敗毒散、鷄鳴散、立效散、檳榔湯等。

中期可用，通絡消腫劑，如歸尾、防已、雙皮、丹皮、牛夕、茜草、加皮、海桐皮、蒼朮、紫草等。

晚期腫大不消者，元氣衰弱，可以補劑，如八珍湯、補中益氣湯、金匱腎氣湯等。

人參敗毒散：黨參、羌活、獨活、柴胡、廣皮、桔梗、川朴、甘草。

鷄鳴散：檳榔、木瓜、廣皮、蘇葉、吳萸、桔梗。

立效散：檳榔、木瓜、廣皮、吳萸、蘇葉、生薑。

檳榔湯：檳榔、木瓜、廣皮、香附、蘇葉、加皮、甘草。

補中益氣湯：黨參、當歸、柴胡、升麻、廣皮、白朮、甘草、生薑、紅棗。

八珍湯：黨參、云苓、白朮、熟地、川芎、當歸、白芍、炙甘草。

金匱腎氣湯：熟地、山萸、山藥、茯苓、丹皮、宅下、附子、官桂。

絲虫病初期如無紅腫灼熱症狀多採用人參敗毒散、加牛夕、加皮、海桐皮等藥收效頗多，中期則採用朴中益氣湯、加獨活、牛夕、寄參、靈仙，雖不全愈但復發減少。

參考資料：

聖濟總錄，六科准繩、實用傳染病學、中醫雜誌（1959年第三期）。

鈎 虫 病

（1）鈎虫相当于古代的白虫

我國古代并無鈎虫的名稱，根據外台秘要九虫的記載，略曰，白虫長一寸，白虫相生，子孫轉大，長至四五尺，亦能殺人，與現代醫籍對鈎虫的記載相對照，頗相類似，蓋鈎虫為病，自古有之，非現代新產生之病也，不過名稱不同耳。

（2）病 因

人身強弱，視其氣血之盛衰，氣血即正氣，正氣虛不能抵抗外邪，因此邪氣乘虛而入，故經云，邪之所湊，其正必虛，此闡明內因之旨也，蓋人身強壯，邪氣無可乘之機，即有病虫侵入，亦被正氣所驅，焉能成病，蓋善養生者恆養其正氣也，故能却病延年。外因即六淫之邪（風、寒、暑、燥、火、濕）是也，而鈎虫之繁殖，必須濕熱熏蒸之候，過寒過熱，皆非所宜，此濕熱之邪，即鈎虫病來沅之外因也。

考現代醫學，鈎虫卵隨人糞便排出，如達到適宜潮濕溫暖的土地中，在8—12小時即發育成初期幼虫，幼虫鑽破卵壳，（虫體約2—3毫米長）寄居土中，以土壤中的有机物碎屑為食物，數日后脫皮一次，身體長大一倍，成二期幼虫，再發育一星期左右，成為絲狀幼虫，不再食物，在土中上下活動，或地而上待機鑽入人體，（如菜園

地桑園紅薯地爲感染所) 这种傳染性的幼虫大約活存 5—6 星期, 有時甚至可活數月, 絲狀幼虫若遇見暴露的皮膚, 如人赤足行走或用手掘土, 皮上粘了泥塊, 尤其是趾縫間粘有帶幼虫的泥土, 隨即鑽入到达小靜脉, 或淋巴管內, 隨血液運到心, 再轉入肺, 因虫體不能通過毛細血管而暫時停下, 破毛細血管侵入肺泡, 由氣管爬入喉頭, 隨唾液吞入腸胃, 發育爲成虫, 但幼虫侵入人體到發育成成虫大約 5—8 星期, 雌雄交配后產卵, 此虫生存大約 1—2 年, 很少數的 (10%) 可以生活 5—7 年。

(3) 症 狀

初感染時, 鉤虫病的幼虫侵入人體的皮膚, 被侵襲的局部, 發生僵硬疙瘩, 異常搔痒, 甚則變成膿疹。

被感染之后, 幼虫侵入肺泡內可發生咳嗽、氣促、咯血等, 但非十分嚴重的也就沒有這些征候, 這時病者, 覺心窩壓重, 惡心腹脹, 消化不良現象, 漸漸地出現貧血, 顏面爪甲蒼白色, 口唇眼臉的粘膜淡白而無血色, 面部及足踝浮腫, 十足表現黃胖的特征。

大多數病者, 發生異嗜症, 愛吃茶葉、生米、芝麻、泥土等物, 以吃茶葉者爲最多。

兒童感染了鉤虫能阻礙身體發育, 成人受到感染后, 性欲減退, 在男子則陽萎不舉, 在女子則月經停止, 智力的發育也受到阻礙。

(4) 病 理

我們從上面的病因來看, 始則傷于皮毛, 故經云: 「皮毛肺之合也」皮毛傷則肺金肅殺之氣起而抗病, 故其脉多浮, 皮表則起僵硬疙瘩搔痒, 或變成膿疹以排毒外出的象征, 至由靜脉而連心臟, 故病者感心窩壓重, 心爲君主之官, 肺爲相傳之官, 君主之官病, 相傳之官未有不病者, 以故由心傳肺, 因之咳嗽、氣促、咯血等症相繼發現, 由肺傳胃, 全病及土, 子病及母也。胃病則惡心腹脹之症狀作矣, 此時脉象轉沉, 再由胃傳小腸, 是鉤虫最終寄生之所, 乃由土及火, 亦千

病及母也，小腸者受感之官，化物出焉，于行爲火，小腸病則化物失取，所有水谷精微，不能充分吸收，分布五臟。胃病脾亦病，脾胃皆衰，故失其運化之機，脾胃爲后天之本，各臟腑皆賴以資生者也，今脾胃病，則各臟腑無以營養，經云：中焦受氣取汁，變化而赤，是爲血，今中焦（脾胃）病；受氣取汁之機能削弱，以致出現貧血症狀，此時脈象由沉而增細弱，顏面爪甲蒼白，口唇眼臉的粘膜淡白，均無血色，由是土衰則水泛，以致水來侮土，而面部的肌肉浮腫，十足表現黃腫病矣，此病發展嚴重時，多數病者發生異嗜症，愛吃茶葉、生米、芝麻、泥土等物，以吃茶葉爲最多，考其沉因，凡病者沉重時，均有自救能力，如陰陽煩渴引飲，病者必引水自救，此其一例也，鉤虫患者，何獨不然，其所以愛吃茶葉者，則因茶葉有消脹提神益智之功能，鉤虫病者，多屬精神萎靡，須茶葉以資救濟，其所以愛吃生米者，則因米有資養腸胃之功，是以仲景白虎桃花等湯，皆用米，鉤虫病患者，腸胃皆傷，食米則可以補助腸胃，所以愛吃芝麻者，蓋以芝麻內含丰富的油脂，鉤虫病者，腸胃枯槁，急待油脂，以滋潤之，至于愛吃泥土者，則因泥土有殺虫解毒之功，如誤吞蝨蝗，用田中污泥爲丸服下，蝨蝗則被殺死，从大便排出，是以諸異嗜之症狀，皆爲病者自救之表現。

(5) 診 斷

- (1) 檢查大便有無虫卵。
- (2) 血液檢查，嗜酸性白血球增加，紅血球及血色素減少，且有幼稚性紅血球出現。
- (3) 設備不完全的地方就不得不依靠它的特有症狀來作診斷，如初感染時的症狀鉤虫幼絲虫，侵入人體的皮膚，被侵襲的局部發生強硬疙瘩（丘疹）異常搔痒，甚則化膿潰爛，這是一個幫助診斷的可靠病史之一。
- (4) 惡心腹脹漸漸出現貧血症狀，顏面爪甲蒼白，口唇眼臉的粘膜淡白而無血色，皮膚枯暗如土，虎口處隱隱出現暗黃

色，面部及踝膝浮腫，十足表現黃胖的特征。此時大多數病者發生異嗜症，愛吃茶葉、生米、芝麻、泥土等特征。

(6) 鑒別診斷

本病因有感染的病史和特征，食血以及異嗜症的出現，所以與其他黃病及水腫很容易鑒別，分述如下。

- (1) 鉤虫病病史有鉤虫感染史，嚴重貧血，顏色枯暗如土色腫脹，面部浮腫，心臟先病，自后心悸充進尿如常。
- (2) 其他黃疸病史有肝膽等病史，或有急性炎症顏色，全身皮膚鞏膜都如枝子色，腫脹不腫心臟不復，尿色如枝子，有時大便為灰白色。
- (3) 一般水腫病史有心臟或肝腎等病史，顏色皮膚色澤透明腫脹，因病沉不同而腫的部位各異，心臟性水腫先有心悸充進而后腫，尿色如常，量減少。

沈氏尊生書云，黃疸宿病也，與黃疸暴病不同蓋黃腫眼目皆黃無腫狀，黃胖多腫，色黃中帶白，眼目如故，或洋洋少神，虽病後都發子脾，然黃疸則脾經濕熱至極而成，黃胖則濕熱未甚，多因虫與食積所致，必吐黃水，髮毛皆直，或好食生米、茶葉、土、炭之類。

(7) 治 療

本病是一個嚴重貧血的症候，根據座談總結臨床經驗選方後作治療上參考

- (1) 綠礬丸：綠礬(炒)，蒼朮，厚朴，陳皮，神油各一兩，甘草五錢，為末以大紅棗六兩，煎濃汁為丸如梧子大，白開水送下三錢，早晚各服一次，忌食蕎麥、羊肉等療效80%。
- (2) 大積中湯加梔子(金匱要略方)：蜀椒二錢，干姜八錢，人參六錢，膠飴二兩，梔子七枚。
- (3) 貫眾湯：
藥效：貫眾五錢，苦楝樹根皮五錢，紫草五錢，荆芥五錢。