

欽定古今圖書集成博物彙編醫部全錄

第一百六十一卷目錄

醫部彙考一百四十一

目四

徐春甫古今醫統五卷

白雲先生醫集 卷一 八 諸家醫論
醫統五卷 卷二 八 諸家醫論
醫統五卷 卷三 八 諸家醫論
醫統五卷 卷四 八 諸家醫論
醫統五卷 卷五 八 諸家醫論
醫統五卷 卷六 八 諸家醫論
醫統五卷 卷七 八 諸家醫論
醫統五卷 卷八 八 諸家醫論
醫統五卷 卷九 八 諸家醫論
醫統五卷 卷十 八 諸家醫論
醫統五卷 卷十一 八 諸家醫論
醫統五卷 卷十二 八 諸家醫論
醫統五卷 卷十三 八 諸家醫論
醫統五卷 卷十四 八 諸家醫論
醫統五卷 卷十五 八 諸家醫論
醫統五卷 卷十六 八 諸家醫論
醫統五卷 卷十七 八 諸家醫論
醫統五卷 卷十八 八 諸家醫論
醫統五卷 卷十九 八 諸家醫論
醫統五卷 卷二十 八 諸家醫論
醫統五卷 卷二十一 八 諸家醫論
醫統五卷 卷二十二 八 諸家醫論
醫統五卷 卷二十三 八 諸家醫論
醫統五卷 卷二十四 八 諸家醫論
醫統五卷 卷二十五 八 諸家醫論
醫統五卷 卷二十六 八 諸家醫論
醫統五卷 卷二十七 八 諸家醫論
醫統五卷 卷二十八 八 諸家醫論
醫統五卷 卷二十九 八 諸家醫論
醫統五卷 卷三十 八 諸家醫論
醫統五卷 卷三十一 八 諸家醫論
醫統五卷 卷三十二 八 諸家醫論
醫統五卷 卷三十三 八 諸家醫論
醫統五卷 卷三十四 八 諸家醫論
醫統五卷 卷三十五 八 諸家醫論
醫統五卷 卷三十六 八 諸家醫論
醫統五卷 卷三十七 八 諸家醫論
醫統五卷 卷三十八 八 諸家醫論
醫統五卷 卷三十九 八 諸家醫論
醫統五卷 卷四十 八 諸家醫論
醫統五卷 卷四十一 八 諸家醫論
醫統五卷 卷四十二 八 諸家醫論
醫統五卷 卷四十三 八 諸家醫論
醫統五卷 卷四十四 八 諸家醫論
醫統五卷 卷四十五 八 諸家醫論
醫統五卷 卷四十六 八 諸家醫論
醫統五卷 卷四十七 八 諸家醫論
醫統五卷 卷四十八 八 諸家醫論
醫統五卷 卷四十九 八 諸家醫論
醫統五卷 卷五十 八 諸家醫論
醫統五卷 卷五十一 八 諸家醫論
醫統五卷 卷五十二 八 諸家醫論
醫統五卷 卷五十三 八 諸家醫論
醫統五卷 卷五十四 八 諸家醫論
醫統五卷 卷五十五 八 諸家醫論
醫統五卷 卷五十六 八 諸家醫論
醫統五卷 卷五十七 八 諸家醫論
醫統五卷 卷五十八 八 諸家醫論
醫統五卷 卷五十九 八 諸家醫論
醫統五卷 卷六十 八 諸家醫論
醫統五卷 卷六十一 八 諸家醫論
醫統五卷 卷六十二 八 諸家醫論
醫統五卷 卷六十三 八 諸家醫論
醫統五卷 卷六十四 八 諸家醫論
醫統五卷 卷六十五 八 諸家醫論
醫統五卷 卷六十六 八 諸家醫論
醫統五卷 卷六十七 八 諸家醫論
醫統五卷 卷六十八 八 諸家醫論
醫統五卷 卷六十九 八 諸家醫論
醫統五卷 卷七十 八 諸家醫論
醫統五卷 卷七十一 八 諸家醫論
醫統五卷 卷七十二 八 諸家醫論
醫統五卷 卷七十三 八 諸家醫論
醫統五卷 卷七十四 八 諸家醫論
醫統五卷 卷七十五 八 諸家醫論
醫統五卷 卷七十六 八 諸家醫論
醫統五卷 卷七十七 八 諸家醫論
醫統五卷 卷七十八 八 諸家醫論
醫統五卷 卷七十九 八 諸家醫論
醫統五卷 卷八十 八 諸家醫論
醫統五卷 卷八十一 八 諸家醫論
醫統五卷 卷八十二 八 諸家醫論
醫統五卷 卷八十三 八 諸家醫論
醫統五卷 卷八十四 八 諸家醫論
醫統五卷 卷八十五 八 諸家醫論
醫統五卷 卷八十六 八 諸家醫論
醫統五卷 卷八十七 八 諸家醫論
醫統五卷 卷八十八 八 諸家醫論
醫統五卷 卷八十九 八 諸家醫論
醫統五卷 卷九十 八 諸家醫論
醫統五卷 卷九十一 八 諸家醫論
醫統五卷 卷九十二 八 諸家醫論
醫統五卷 卷九十三 八 諸家醫論
醫統五卷 卷九十四 八 諸家醫論
醫統五卷 卷九十五 八 諸家醫論
醫統五卷 卷九十六 八 諸家醫論
醫統五卷 卷九十七 八 諸家醫論
醫統五卷 卷九十八 八 諸家醫論
醫統五卷 卷九十九 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百一 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百二 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百三 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百四 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百五 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百六 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百七 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百八 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百九 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百一十 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百一十一 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百一十二 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百一十三 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百一十四 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百一十五 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百一十六 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百一十七 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百一十八 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百一十九 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百二十 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百二十一 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百二十二 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百二十三 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百二十四 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百二十五 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百二十六 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百二十七 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百二十八 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百二十九 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百三十 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百三十一 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百三十二 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百三十三 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百三十四 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百三十五 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百三十六 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百三十七 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百三十八 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百三十九 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百四十 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百四十一 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百四十二 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百四十三 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百四十四 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百四十五 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百四十六 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百四十七 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百四十八 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百四十九 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百五十 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百五十一 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百五十二 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百五十三 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百五十四 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百五十五 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百五十六 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百五十七 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百五十八 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百五十九 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百六十 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百六十一 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百六十二 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百六十三 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百六十四 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百六十五 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百六十六 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百六十七 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百六十八 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百六十九 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百七十 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百七十一 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百七十二 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百七十三 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百七十四 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百七十五 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百七十六 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百七十七 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百七十八 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百七十九 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百八十 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百八十一 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百八十二 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百八十三 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百八十四 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百八十五 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百八十六 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百八十七 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百八十八 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百八十九 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百九十 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百九十一 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百九十二 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百九十三 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百九十四 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百九十五 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百九十六 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百九十七 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百九十八 八 諸家醫論
醫統五卷 卷一百九十九 八 諸家醫論
醫統五卷 卷二百 八 諸家醫論

醫部彙考一百四十一

目四

明徐春甫古今醫統

五輪論

血輪病因心經火熱驚恐所生宜瀉心涼肝所病大
小皆赤痢多生淫醫血海瀉人太腎先赤小腎左眼
先病右眼皆屬心
氣輪病因脾熱白睛紅腫多主赤血有淚白膜侵睛
名曰氣障而赤因侵胃氣鬱結是所生宜瀉脾補心
風輪病因肝經燥熱氣太盛所生病則昏翳黑花
噴流淚汨汨宜瀉肝補肺
肉輪病因脾胃勞倦飲食不節熱厚厚味所生病則
上下瞼腫眼胞腫起眵肉侵睛外生小塊在睛名曰
偷鍼倒睫赤毛皆屬於脾宜瀉肝清脾
水輪病因腎虛虛弱色太通相火所成病則眼目
青睛頭痛冷淚視人物若昏暗太陽若水久而失治
青盲內障宜補腎補肝

八邪病

開吳郡屬小腸經病主頭額常痛淚多黑花
水穀筋屬脾經病主頭額常痛淚多黑花
會陰筋屬腎經病主昏眩淚生痛痛
抱胎筋屬命門病主胎肉赤腫痛多赤血
清淨筋屬膀胱經病主面青腫痛淚出
傳道筋屬大腸經病主脊腰多淚
津液筋屬膀胱經病主血絲使睛肉生瘰
養化筋屬肝經主赤筋赤毛倒睫

八癆瘵

經云眼癆五臟六腑百脈之精而具明故五輪之說
有所本也八癆之說無義可據目所以明之者考
八癆乃後世龍木神醫五行八卦配合之意於義
不切奈何傳誤既久俗習一辭連貫紛紛似為脫簡
夫何世謂眼科開口五輪八癆者過言者即謂佛工
姑存而筆之以俟杜漸

七十二證歌

開水清濕散浮沉白睛黃心橫翳新暴花黑便寒風
受驚振振頭暈目生綠烏青黑風障胎患傷寒熱
後昏肝經積熱淚眼腫肉赤睛腫眼黑如珠
花翳肝火夜淚腎入水輪針針根深浮主腎偶然逆
腦筋於冰氣逆眼肉赤生要眵肉腫浮主腎偶然逆
突起逆風淚倒睫赤毛翳雙分雙眼眩暈神痛旋
線笑起眼腫形打傷損損眼赤眼血腫眼人眼目腫
天行赤眼腫赤眼胎赤眼胎赤眼胎赤眼胎赤眼胎
刺瞳人乾眼難難任黃眼上衝赤眼上衝中生贅與
過時府眼難難任黃眼上衝赤眼上衝中生贅與
女子並早衰午後有其因痛微微與傷損七十二
候此分明

開腎

開腎初起如輕煙薄霧不痛不癢漸而失明名曰內
障或先痛一目後則俱病此是頭脂流下肝風衝上
宜以金黃散之服防風散
冰膏
冰膏初起頭額眉處痛眼中赤澀此由肝風積熱
久成內障其目如冰人漸大宜服蓮藕丸

溫腎

溫腎初起不痛先病一日後乃相牽漸漸失明有腎如木銀珠子亦由腦脂流下肝風上衝宜決明散

溫腎

溫腎先病一日後兩目俱病如雲霧障不見二光陰看則太陽昏則小瞳人欲散宜溫腎丸

散腎

散腎初因風熱上攻久而生腎漸而失明其腎如雲霧布散太虛滿如帛絮物遂成內障宜服綠花無九

浮腎

浮腎初起一日久則俱病亦因肝風上衝腦脂流下腎如銀色宜服綠腎丸

沉腎

此因肝熱勞熱常見黑花年久凝結成腎色青白瞳人若沉如在水中宜還睛丸

白腎黃心

此由勞傷太過虛火上攻有時昏朦不能辨物久成內障白腎中黃宜服參扶還睛丸

橫腎

此證瞳人有膜青白已其腎上下皆平中有如橫刺之狀宜服還睛丸

藥花

此證頭眩痛熱痛不休眼旁常見黃黑花膜中有醫藥差如藥花互服參扶還睛丸

黑圓腎

此證頭眩痛熱眼黑生花肝膽積熱風火上衝腦脂結成腎如烟色隱隱深沉如木之中不能覩物宜服萬肝散

假月腎

此證為肝腎俱勞致生腎障如假月白色不能辨物服降腎丸

五風變化

此證乃是虛勞內熱嘔吐傷肝膽熱生風今日失明初覺宜服除風湯後服補腎丸

驚振

此因五臟虛勞肝氣內促熱上衝腦毒氣流下眼中而成白腎故成內障宜服鎮肝丸

雷頭風

此毒因熱毒上衝於頭及面日頸項俱腫痛故曰雷頭風久面毒氣入目致令失明瞳人漸大宜服清肝散

高風雀目

此因肝熱熱極腎水不滋金不制木肝氣損日久則變為青盲不見宜服清肝散

綠風

此證頭眩痛眼內多赤常見紅黑不定皆因肝風熱盛致令瞳人絲閉久則無見宜服還睛丸

烏風

此證不痛不癢漸漸昏暗是由氣運使然如烏風宜服補腎丸

青盲

此證多因酒色太過內傷腎氣不痛不癢漸失其明

眼目俱不傷損有似常人只因一懸腎氣不充故無所見有謂瞳人反背有謂腎虛者皆非也宜服還睛滋腎之藥

黑風

此證頭眩痛眼黑生花往來黑量乃是肝臟虛勞致使失明瞳人漸小宜補肝丸

黃風

此證多因肝火太盛上衝頭目初病痛濕久則昏花如霧漫天紅焰煙煙漸至失明宜服清散決明散

胎患

此證因母懷孕之時酸甘太過酒色不潔致毒於胎致生目疾或赤或腫或膜或腎宜服清涼散

傷寒熱病後患

此因熱病愈後風氣未盡餘熱未盡或食香辛味致令眼閉黑睛瞳人開大視物不明宜服養睛丸

肝經積熱

此因肝經熱毒氣入瞳下注於目赤腫生翳或聚或散初起而漸重宜服清散消散

流精

此證初起不痛不癢漸覺昏朦亦因勞神太過熱燄生風肝邪為腎虛成內障久則失明宜服養睛清肝散

勞傷鼻痛

此因心脾二經火邪循目至有內皆內患漸足舉睛久而不退必失明宜服洗心瀉肺湯分點老眼散及用手法去之

陰生風象

此因脾胃積熱肝木生風致使兩瞳內生風果如果

子癰發日疼痛成管障久久漸昏流淚不止宜先以
燈草去裏去血後服清脾退熱除風之藥

墨腎如珠

此因肝經熱勞作腎虛致使冷痛出淚為睛上連
墨腎內起如珠宜服除風湯後服補腎丸

花腎白陷

此症初起頭痛眼淚淚出離開眼中白腎如碎米或
如銀錢陷陷為肝風太盛血氣俱虛宜用疎風活血
湯外點熊膽膏

冰霞深醫

此因肺熱肝風致令黑睛生白腎如冰霞之象不宜
鉤刺宜服養肝散

眼入冰輪

此症虛勞之過肝熱風熱年久烏睛變為白衣漸入
冰輪若有血脈紅筋難治宜服活血湯銀心丸

釘腎外障

此因心火肝風上炎入目致使赤腫有淚伯日羞明
疼痛太甚生翳如釘高突如粟宜服除熱湯心湯後
服玉冰丸

玉醫浮睛

此因熱毒不退使生白膜如王凝睛或痛或腫久則
滿睛失明宜服退翳湯

逆翳生醫

此因五臟虛勞風熱毒氣時常赤腫生翳生醫或從
上生或從下生上下交貫甚則厚如努肉使及瞳人
白翳紅者先服知母飲後服補虛人參丸

難冠銀肉

此因脾胃積熱毒氣入腦而流於目以致目生肉醫
如雞冠銀肉之狀鉤刺可去宜服養睛千九換風湯

兩臉枯膜

此因脾胃熱毒毒於兩眼致使兩臉赤多路如膜或
眼皮番出青角不開宜服活血湯外用消風湯
洗

胞肉旋脂

此因脾胃伏熱風邪上衝久則胞肉內生肉醫如粟
米破爛如桃膠之象雖內服藥必先去餘肉及瘀血
點退毒膏方可

拿毛倒睫

此因脾胃熱毒致令眼乾癢澀日以手指以致倒睫
有因勞傷思慮太過致令脾氣下陷而睫倒刺毛拳
反內眼珠受害漸生翳膜久而不起必致失明宜以
方法催起眼皮先服細辛湯後服補脾藥

望腎

此因風熱久亢而生翳醫養膏也於黑睛上不能不
棄久則失明宜服退翳散

翳眼凝睛

此因五臟風熱結積而然所患眼目忽然疼痛眼珠
脈硬視物不隱血氣凝滯不能旋轉宜鍼灸合諸穴
以引氣血流通後用摩風膏塗之宜服搜風湯

神眼痛痛

此因心火積鬱血熱為病或日輕夜重或好惡不常
久久延遲謂之邪祟宜服安心丸養心補血湯

旋風起

此因肝水不足肝火有餘上注目中初覺眼痛漸生

醫子起至黑睛高突如旋螺宜服薄肝散補腎丸

難癒風瘡

此因臟腑虛毒致目之患兩臉上下各開毒反不相
連故舉出狀如蟻蟻堆堆毒不能轉動急用薄肝散
寧門又毒

打傷傷損

若因跌打傷損積血注目者宜敷止血藥內宜行血
當歸川芎湯其或物傷眼珠突出可從容以手輕輕
托起緩緩揉按不可洗面及目若有汚血在面上可
用熱酒淋搨封貼面上少時取下血自去宜地黃酒
除風湯

逆風冷淚

此症肝風入目肝氣內伏外面逆風則淚隨出內風
以應外風亦各從其類也至夏月陽氣在外則不出
淚則風亦在外故也若久而肝虛夏月亦有淚也宜
服細辛養睛散

白膜侵睛

此症肝虛肝盛故有白膜侵上黑睛白珠多赤亦障
有火邪先服薄肝散後服養花散

青膜內障

此為肝風太過入目生青膜蔽睛如雲如烟此因熱
久生風致有此障久而不退必致失明宜點八寶散
服薄肝養金之藥

羞明怕日

此蓋因脾經濕熱目中驗不能開疼痛流淚怕日
羞明此則內火所惹外火亦然也宜服清肝散及去
水散地龍二條為熱

小兒痘毒

此因痘毒未盡餘熱在目故目赤只宜清涼解毒不須點藥

滿痛膿血

此因五臟積熱毒不敷以致目內生毒膿血之流久則潰爛因而成漏甚者破陷失明宜服黃連湯

蟹睛突起

此因五臟熱毒所攻至令烏睛上有黑睛突起如蟹睛之狀初起急服枯梗散後服補肝丸有用小蟹刺蟹睛上洗出清水以藥點之而愈者

風車出險

此因脾胃熱肝經風盛致患赤腫相爭甚則眼胞掉出治宜刺去瘀血烙以燈燒宜服黃連湯

血灌瞳人

此因外物撞傷不曾散行致血以致血灌瞳人或燥或脹疼痛難開不治則失明服止痛散後用活血散點以七寶膏

珠目飛塵

此因飛塵入目粘貼眼皮睛上疼痛流淚難開不能視物治須點出眼皮用掃拭淨方點藥宜服寧心丸

天行赤眼暴發

此因運氣所加風火淫鬱大熱患眼赤腫流出而痛或致頭項俱痛漸生胥腫是微患人紅紫不敢必有熱血宜去之可服清肝散鎮心丸

天行赤眼

亦因運氣流行忽然疼痛淚出鼻塞不利初患一日後復相傳或一二日後亦不愈不宜去血宜服清肝散

散邪外用洗藥

爛弦風險

此因脾胃熱風邪相干致患眼危亦屬小兒皆因胎氣風熱之毒宜用碧雲膏塗之使眼黃黃涕

暴風客熱

此因三焦積熱久則攻目忽然白睛紅腫散烏睛痛發不一淚出難開先用洗肝散後服補肝丸

臉硬睛迷

此因風熱凝滯凝結不散久則生醫不能視物宜熨鹽煎洗點以紫金膏服活血清熱散風之劑

痛如刺割

此證先惟頭痛淚出漸生痛如刺割此是心經伏火鬱熱太過久則醫藥救難悉宜洗心涼痛

瞳人乾缺

此因腎虛肝熱致令瞳人乾缺上下短長斜偏不正久而損目失明先宜洗肝散後服補腎丸

風熱難任

皆因風熱太盛所以滯留難任或有迎風便棄久則兩眸赤腫宜去瘀血洗以燈燒煎服補肝湯

黃膜上衝

此證初患赤淚淚出漸而白睛下邊黃膜衝上烏睛遮蔽障人皆因風熱所致則宜點支推雲散服清肝散

赤膜下垂

此證赤膜發年久漸至黑睛上邊生有赤膜垂下如紅霞之狀俗云倒垂黃膜則點支推雲散服清涼散

眼中生黃

此證脾胃積久而發出以致敗肉生黃如黍或如血塊俱以手法去瘀血服活血清熱藥而愈

血腎包翳

此證多因心經熱毒肝風盛致有赤脈後睛赤肉撞睛睛如棉子包裹之狀有因上下險有舉而致有赤血者先去險內瘀血服活血湯及退雲散

小兒疳眼

此證多是飲食不節甘辛積熱以致脾胃成疳上攻眼目赤腫烏珠有翳久漸變白宜速治藥若不早除多成固疾初服清熱散大服五疳丸

早晨疼痛

此因虛陽上攻頭風注目早晨血氣皆從上行故盡陽得風火而動益發疼痛痛宜服清肝散及白痰散

午後昏朦

此因陰虛不足滯而不行血至午後則熱而氣不充其血故也此皆陰虛腎弱九服回陽養血湯後服滋腎丸

女人血氣逆流

此證得之機血不通氣血逆行而上攻於目故曰母毒之漏眼紅筋如血腎包翳之狀若者血灌瞳人治此者但引經絡而目隨氣血順流通之藥

痛楚危甚

目痛憎寒乃為陽虛而生外寒宜用新氣藥治目痛者或發熱而憎寒者必有外感宜從元陽治而發散之

附于此之謂不知本者

起生生花

此證眼而前其氣不疼不痛無發微視蓋是腎肝虛寒氣不充周以致視有如無視腎者有氣血不足水不榮此皆不宜點藥如服補腎藥及羊肝丸益腎丸之屬

南板七十二種石考有之茲錄之以成全書至於論治則又不可執於是而非法之大綱也夫大綱者標本也氣血也風火也知此三者目病其庶幾乎

行血爲治目之綱

經曰目得血而能視故血爲目之主血病則目病血凝則目眩血小則目暈血熱則目腫所以古人治目惟取神庭上星兩處而百會血故醫者可使立退痛者可使立已眩者可使立明腫者可使立消今人亦有去血之法惟可施於熱熱舉腫又不宜以爲法之常也何則人多是上焦之熱火氣血之耗損故去血太多而目愈痛所患舉病公微矣所以彌年不愈終入失明卒致不治也爲今治者只以活血涼血爲上策而滋陰降火以收功此蓋治目之大綱固無所損而必收十全之功醫者不可以不審也

散熱爲治目之要

按河間云目病屬火故其理也病之始起可以峻用寒涼政寒上情鬱滯血停凝以致熱甚而爲目病者則當於苦利中而加之以辛通之藥而散熱之導滯開鬱而氣血風火並平從而發散者乎故曰散熱爲要亦表裏之意也

腫痛皆眼

目病發腫痛而微如桃合而爲一痛不可忍若宜用

防風通聖散下之立愈

血氣虛寒四物湯加龍腦草防已防風羌活之屬

實熱上衝而痛甚連瀉火當歸補血心煩加梔子使

秘加大黃

久病目昏當用八珍湯加羌活防風甘菊佐之不可

服寒涼之藥

王肯堂海治準繩

五輪

金之精結而爲氣輪木之精結而爲風輪火之

精結而爲血輪土之精結而爲肉輪水之精結

結而爲水輪氣輪者目之白睛是也肉輪於睛西方

庚辛申酉之金肺主氣故曰氣輪金爲五應於肝西方

故曰珠輪堅於四輪肺爲華蓋部位至高主氣之升

降少有情鬱滯病生焉血輪氣行氣若佛雲則火磨

而血滯火磨而血滯則病變不測火熾金在木外

故氣輪先赤金剋木而後病及風輪也金色白故

白澤者順也風輪者目內青睛是也內應於肝東方

甲乙寅卯風陰風木故曰風輪目紫肝肝在時爲春

春生萬物色蒼黃目惟目能變故風輪於肝也此輪

清胞內包膏汁有滋養精神之功其色青故青室者

順也世人多黃濁者乃濕熱之害惟小兒之目最正

至長食味則其氣而色亦易風輪者目兩角正

小者是也內應於心南方丙丁巳午火主血故曰

血輪夫火在目爲神光火衰則有昏朦之患火炎則

有焚燎之候雖有兩心而無正輪心君主也通於大

皆散大皆赤者實火也心色赤爲小心小心相火也

代君行令通於小者故小者赤者虛火也若君主換

散則相火自然浮散矣火谷赤赤結法爲脈也肉輪

者目睛是也中央土巳辰戌未之土脾主肉故曰

肉輪脾有兩葉運動磨化不致外亦有兩葉動靜相

應則萬用即筋動之發生用則筋動即筋動之收

敏土藏萬物而主靜故脾合則萬有寂然而思聰此

藏精靜靜之應也土爲五行之主故四輪亦爲精所

包涵其色黃得居而謂知日月之麗東南而觀西北

也內有大絡六間心肺脾肝腎命門各主其一中絡

八謂屬目小絡二惟脾脈各主其一外有旁支細

絡其其數皆實於風火不通諸痛通爲血氣往來

以滋於目故凡病於目有赤有絲絡紅見血輪內

而爲淚有神經水神光氣興元氣精此皆目

之津液也神膏者目內包膏者或如眼前黑翳木出

是也此膏由脾中濃潤精液所結成者能滋養神

衰則有損神水者由二焦而發源先天具一之氣所

化在目之內雖不可見然使物損則則見風膏之

外有似蠟者者是在目之外則曰潤澤之本是

也水素則有外無神變之患外無則有目輪大小之

疾耗潤澤則有危動者多者少者是也神光發於心

神之火神光者謂目之目之精華也神光發於心

源於腦火之用神火在人也大矣在足能行在手

能握在舌能言在鼻能嗅在耳能聽在目能視神舍

心故腎於心爲真者即肝中升運滋目經絡之血

也此血非比肌肉間易行之血因其脈絡深遠滋得故謂之真也真氣者諸目之經絡中往來生用之氣乃先天真一發生之源也大宜和暢少有鬱滯滋病生焉真氣乃先天之元氣所化精汁起於腎氣於腰而後及脾神也凡此數者一有所損則病與矣大槩自面而外有堅致數重中有清麗內包黑稠神膏一面膏外則白稠神水以滋養水外則皆血血以滋養神中一點黑點是脾所聚之精華唯此一點燭照靈明空闊無礙者是曰本輪內應於腎北方壬癸之子也妙在二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

此相為陰陽主木之源原以輪津液故曰津液原良位東北絡通上焦之脾臟配命門火命門上焦相為陰陽會合諸陰分絡百脈故曰會陰府蓋此東方絡通脾臟屬於肝肝脾相為陰陽會合清淨不受腐穢故曰清淨脾與位東南絡通中焦之脾臟屬肝肝與中焦相為陰陽肝脾通血以滋養中焦分氣以化生故曰養化脾能正南方絡通下焦之脾臟屬於心與小腸相為陰陽為陽受盛之胞故曰胞陽脾坤位西南絡通胃之脾臟屬於脾脾胃相為陰陽主納水穀以養生故曰水穀脾兌正西方絡通下焦之腎臟配腎絡腎與下焦相為陰陽主陰精化生之源故曰開果和脾臟相配內經已有定法而三焦分配肝腎者此目之精法也蓋目專察於肝而主於腎故有三焦之分別焉左目屬陽道運行故邪之經位法象亦以運行繫乎二目兩腎之分別昭然可見陰陽順逆之道矣

十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

大目之有血為養目之源充和則發生長養之功全而目不病虧則病生矣猶物之有水為生物之源時中則滋潤滋生之得宜而物秀華湧則物壞矣皆一氣使之然也是故天之六氣不和則陰陽傷暑旱沸水之氣為病不物之六氣不和則陰陽傷暑旱為物害也譬之山崩水湧湧沙打石不循河道而流任其所之不利已而風流決決以泄其淫使無滯滯皆惡之患人之六氣不和水氣違背元水之風之好壞不一氣之升降不齊衝衝失調而為八害也蓋

由陰虛火盛火盛後錯亂不運結格而來鬱滯不能通暢不得已而開通導導以泄其餘使無積滯損珠之患與義理同其所有六雷通會內障上星耳聾左右太陽穴內障正脈之衝鋒也其功雖速而收而平顯兩穴通其左右翼也其功之速上星穴經其衝道也迎音振眩之與火也其功之速上星穴經其衝擊其逆耳耳道通功卑智者不取此實探危之良術探危之要機其閉門捕賊不若開門逐寇為良法也蓋病後而邪不勝正者因內治而邪自退矣倘或六陽受擾不若開導之縱使其虛邪有所傷以藥內治之功而補其所虧庶幾安寧至極而有潰爛枯凸之患惜乎因導之注利表有傷有大功於目而人不知有隱禍於目而人亦不知其損精耗銳大敵而探禍亂此其功之大也耗流傷實銷其華而之滋生此其禍之隱也惟能識者之經重目之虛實而伐之無過不及之弊庶可為醫之良者

十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

病有內外治各不同內疾已成外證若無點之何益外有紅絲赤脈若初發乃微邪道後乃強盛點亦可消服之猶愈內病始發而不內治只況外點者不惟非點無功且有激發之患內病既成外病已見必須內外夾攻點服並進行之何人有愚過不同有喜服而畏點者有喜點而畏服者不知內疾既非服不除外疾既成非點不退滯其流不若案此舉伐其枝不若斷其根楊湯止湧不如釜底抽薪此謂治本也內病既發不服而除者吾未之見也物垢須濯鏡垢須磨脂膏之多不經洗滌焉能清淨此謂治標也若

病有內外治各不同內疾已成外證若無點之何益外有紅絲赤脈若初發乃微邪道後乃強盛點亦可消服之猶愈內病始發而不內治只況外點者不惟非點無功且有激發之患內病既成外病已見必須內外夾攻點服並進行之何人有愚過不同有喜服而畏點者有喜點而畏服者不知內疾既非服不除外疾既成非點不退滯其流不若案此舉伐其枝不若斷其根楊湯止湧不如釜底抽薪此謂治本也內病既發不服而除者吾未之見也物垢須濯鏡垢須磨脂膏之多不經洗滌焉能清淨此謂治標也若

之而痛者思其已之精光弱而不能勝彼之光是以虛邪之所刺清矣熱無不足之證蓋明有不足之證者目不赤痛而畏明者乃不足之證蓋血不足而痛而目赤痛不能勝明者乃不足之證今人皆謂怕日者明者俗傳音近之誤蓋日熱之音近習俗呼誤已久不察其理遂失其正只以怕熱蓋明論之其理灼然可見夫明字所包已廣何用再申日字若以日字專主陽光言之則怕熱一證無所歸矣

喉硬難痊

不論有聲無聲但喉乾硬而喘急頭或疼者尤急乃風熱在肝肝盛風少不能受運於目絡水無所滋火反乘虛而入會成燥熱或風熱夾搏故血滯於喉肉腫因火擊而疼暫則內生積毒重則為腫脹如杯熱血腫導滯法當俾退其熱散其毒之方若堅硬之甚且漸漸腫起而痛者此頭風欲成毒也宜其服日高難傳法不退者此頭風欲成毒也宜服通肝散二大散若有陰虛用春生膏貼之

赤痛如邪

每日痛則頭痛赤痛乘熱交作如瘧疾凡兩發則目痛目痛則赤發瘧則一年數發重則一月數發蓋肝腎俱虛之故熱者內之陰虛火動邪熱也來者營衛虛外之脈理不實而營氣也若作風寒症病或用峻劑之治則血愈虛而病愈深矣宜小柴胡合四物湯主之不放則活血氣氣滯

總忌氣則目赤宜酒調復元通氣散

痛如針刺

目珠痛如針刺病在心經實火有餘之證若痛然一二處如針刺目雖不赤亦是心經流火然其痛在何部分以見病病起之經矣宜服流心散天服連勝散及乳香九補肝散等按此證多有體勞日勞營氣不上潤於目而如針刺之痛者宜養其營若降火則涼矣

熱結膀胱

目痛則小便不通利而頭寒寒熱者方是若小便清利者非也乃熱聚於膀胱先清利其水後治其目則愈矣若太陽經脈循目絡上行顛頂故頭疼火極則水化又血虛者去疎故發寒熱熱甚則水氣閉滯而神水被寒之渴安得不渴

大小雷頭風

此證不論偏正但頭痛條疾而來疼至極而不可忍身熱目痛便秘結者曰大雷頭風若痛從小至大者便先調後緩小者先清後澀曰小雷頭風大者害速小者稍遲輕有大小之說而治則同若一失緩禍變不測目必損壞輕則凹凸重則結毒宜早為之救免於禍成世人每遇此患甚速故疑於方犯惑於鬼祟深冀祝而藥醫治遂致禍成悔無及矣

左右偏頭風

左邊頭痛右不痛曰左偏風右邊頭痛左不痛曰右偏風世人往往不以為意久則左發損右右發損右右有左損反攻右右損反攻左而二日俱損者若外有赤痛濕熱等病則外證生若內有唇舌唇運等病則內證生矣凡頭風痛左攻左痛右攻右此常病易知者若難知者左攻右右攻左痛從內起止於腦

則改言也連痛從腦起止於內則改言也連痛從中間發及腦內上至中發者皆目俱痛亦各因其人之痛感受受方右偏起受不同遲速輕重不等然風之害人尤慘若能早察調護亦可免患愚者痛經不知惡念而反觸之以致患成而始悔良可痛哉

陰邪風

額板骨眉後骨痛也發則多於六陽用事之時元虛精弱者則有內證之患若氣火者則有外證之病

陽邪風

腦後枕骨痛也多發於六陰用事之月發則有虛運耳鳴之患久而不治內障成矣

辛風

太陽內如椎似鑽一團而痛也若痛及目珠珠外有赤脈紅貫及紫滯者必有外之惡證來矣若赤不赤痛以目為脫如赤惡證漸漸者皆內證成矣急早治之以免後患

顛頂風

天靈骨內痛極如椎如鑽也陽分痛尤甚陰分痛稍可矣風濕者每痛多步運若痛連及珠下而脈急紫赤者外證之惡候若步步則內證成矣內證者尤多於外者

遊風

頭風痛無常位一飯之頃忽易數痛而不能度其何所起止也若痛緩而赤赤有障起者必髮外障痛甚而腫脹緊者必有赤滯之患久而失治不赤痛而昏者內證成外證者多感風寒遲如各風耳

邪風

人素有頭風因面目拘攣者曰痞因而頭風一邪並
立搏突而深入腦致致傷肝膽諸絡故成此患頭痛
則目病目病則頭痛輕則一年數發重則一月數發
頭風目病常並行而不相悖也非若雷頭風風火搏
激而聚滯之邪者又非若天行赤熱傳染之邪客風
暴熱之風火寄旅無定及諸火聚頭痛之比此專爲
自家本病久成者非若彼之標病新來之輕者若赤
痛脹急則有外證之候若無赤痛而只內脹及赤痛
不甚無赤痛之證而只昏眊者內證成矣

第一百六十二卷目錄

醫部彙考 百四十一

日門五

王肯堂證治準繩

風成有能興起

自願 珠又出 論目并 荷若機行
等津 黃腹上動 外候下垂 雙胎腎

曾台陷 復晴 在臨賢 黃浦隊 我如飛
王叔分經 最厚蜀兒 聚開陣 擊

[illegible]

肉 肺 魚 肝 中 一 也 以 爲 早 五 疔 癰

[illegible]

內障 翳星內障 新星內障 烏風內障
匣月內障 翳月內障 翳星內障 翳星內障

脾經 肺經 肝經 心經 腎經 大腸經 小腸經 膀胱經 胃經 脾經 肺經 肝經 心經 腎經 大腸經 小腸經 膀胱經 胃經

障 浮雲內障 派醫內障 恆月長賜 庫起
白雲真心 黑花醫

100

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of α -methylstyrene in the presence of SnCl_4 at 25°C . The concentration of SnCl_4 was 1.0×10^{-2} mole/l. and the concentration of α -methylstyrene was 0.5 mole/l. The concentration of the inhibitor was 0.001 mole/l. (O), 0.002 mole/l. ($\square$), 0.005 mole/l. (Δ), 0.01 mole/l. ($\circ$).

醫術典第一百六十二卷

醫部彙考 一百四十二

王青臺登台華通

三十一 河内土庫	1	10	10
三十二 河内土庫	1	10	10
三十三 河内土庫	1	10	10
三十四 河内土庫	1	10	10
三十五 河内土庫	1	10	10
三十六 河内土庫	1	10	10
三十七 河内土庫	1	10	10
三十八 河内土庫	1	10	10
三十九 河内土庫	1	10	10
四十 河内土庫	1	10	10
四十一 河内土庫	1	10	10
四十二 河内土庫	1	10	10
四十三 河内土庫	1	10	10
四十四 河内土庫	1	10	10
四十五 河内土庫	1	10	10
四十六 河内土庫	1	10	10
四十七 河内土庫	1	10	10
四十八 河内土庫	1	10	10
四十九 河内土庫	1	10	10
五十 河内土庫	1	10	10
五十一 河内土庫	1	10	10
五十二 河内土庫	1	10	10
五十三 河内土庫	1	10	10
五十四 河内土庫	1	10	10
五十五 河内土庫	1	10	10
五十六 河内土庫	1	10	10
五十七 河内土庫	1	10	10
五十八 河内土庫	1	10	10
五十九 河内土庫	1	10	10
六十 河内土庫	1	10	10
六十一 河内土庫	1	10	10
六十二 河内土庫	1	10	10
六十三 河内土庫	1	10	10
六十四 河内土庫	1	10	10
六十五 河内土庫	1	10	10
六十六 河内土庫	1	10	10
六十七 河内土庫	1	10	10
六十八 河内土庫	1	10	10
六十九 河内土庫	1	10	10
七十 河内土庫	1	10	10
七十一 河内土庫	1	10	10
七十二 河内土庫	1	10	10
七十三 河内土庫	1	10	10
七十四 河内土庫	1	10	10
七十五 河内土庫	1	10	10
七十六 河内土庫	1	10	10
七十七 河内土庫	1	10	10
七十八 河内土庫	1	10	10
七十九 河内土庫	1	10	10
八十 河内土庫	1	10	10
八十一 河内土庫	1	10	10
八十二 河内土庫	1	10	10
八十三 河内土庫	1	10	10
八十四 河内土庫	1	10	10
八十五 河内土庫	1	10	10
八十六 河内土庫	1	10	10
八十七 河内土庫	1	10	10
八十八 河内土庫	1	10	10
八十九 河内土庫	1	10	10
九十 河内土庫	1	10	10
九十一 河内土庫	1	10	10
九十二 河内土庫	1	10	10
九十三 河内土庫	1	10	10
九十四 河内土庫	1	10	10
九十五 河内土庫	1	10	10
九十六 河内土庫	1	10	10
九十七 河内土庫	1	10	10
九十八 河内土庫	1	10	10
九十九 河内土庫	1	10	10
一百 河内土庫	1	10	10

經目赤有二曰風助火鬱於上經云少陰司天

之政二之氣陽氣布風乃行寒氣時至民病目瞑目

氣鬱於上而熱又云少陽司天之政初之氣風勝

乃淫熒乃大溫其病氣佛於上目赤是也二曰火盛

100

經曰心火上升爲熾熱之起其病目赤又云火鬱
之發民病亦赤心熱又白少陽之目赤是二之類矣
暑至民病然則目赤又云少陽之目赤也又云
燥邪傷肝輕則成金木太過燥氣流行民病目赤又云
陽明司於燥氣下陷肝氣上從右脅目赤亦是也
目赤兼作昏瞶不可必宜四物能順陽
眼赤暴發散熱飲子瀉青丸

肝臟爲目赤主痛濁涕淚皆能噴決明目湯寒門
冬湯清散肝火肝風乘涼太過目赤而不痛內
服助陽和補氣湯用時須於凡九注之
目赤痛如刺者必用特選潤滑其凡汗許亦漲虛屬
何疑矣一單附泣瀉胃等穴立愈

染血癰腫

染血癰腫爲最毒苦人偏軀已見不用開鍊者其
日必痛楚起不過紅赤次後紫脹及微黑目珠若
起甚畏風形如蝦蟇蓋其病乃血灌睛中瘀塞不通
在傳別初起似椒殼之患在珠則白輪涌起凝翳
醫黃犀牛膝乳柏楸實白降臨風洗睛等惡證
山也久不治必有青黃爛出口之禍凡見目赤赤
紫將腫且痛者張傳點不起必有瘀滯在內可翻
內視之右內色紫黃浮散像皮或果瘡者皆用導之
之法則不然而將有變證生焉宜服宣明九分殊欲
奪門入急通血九及膝橋橫前散等劑

血灌瞳神

謂瞳人暗不見其黑堂但見一點鮮紅甚則黃
色也至此其赤甚危且急矣初起一二日尚可救逆
則必死不止不愈不但不愈恐其人亦不久蓋腎之真一

有傷脾中精土皆損故一點元陽神氣靈光其血之英色而顯於腎絡十患九不治者今人見足疾血灌腳便呼爲血灌風痺謬矣

血似磨脂

不論上下左右但見一片或一點紅血微似磨脂者即是此血不循經絡而來偶然遊於皮膚內滯者或患此者欲速愈者略略於相近處內開導治之或就於所滯之處開之亦好若畏開者內外共治亦退只是稍遲獨於內治亦退其效尤速亦有暴欲撲火者不治自愈若犯寒而變則疹潰轉甚因而感風熱者治治生毒

赤脈貫膚

或一赤脈或二赤脈不論粗細多少但在通達氣絡上起貫到風輪通達風輪連那風輪有紫下者易治且難退而尋來通者稍輕粗者尤重從下者從上而下者稍輕貫過者有變紫絲粗及有條絲紅札者有變薄凡各陣外有此等脈者雖易退遇之證亦退速而傷未速而傷人之故也此證多發已挂復風輪之重非比赤絲亂脈止在氣輪之輕者今人但見絲脈便呼爲赤脈貫膚非也大抵紫在風輪氣輪上下相連連斷爲病各有樣樣常變不同既不能明其上下又能施療乎

赤絲亂脈

謂氣輪有絲脈赤亂入久常如是者然各各不同或因目痛火難退不下禁成致血滯於絲網赤者因風目風火爛瘻現久向熱氣致心念消嗜睡喘喘勞

證而致有所覺痛而赤者有痛不痛有度無誤有差
明不蓋明為病不平等者病生在氣輪白珠上有絲狀
縱橫或秘密細網不等但常常如是久而不愈者是
也非若天行客風等患之暴赤赤脈貫睛之難逆者
比若凡赤脈或昏脈滯聚不聚或有微微赤者輕
因而犯戒者變事者脈多赤脈兼以枯澀而脈痛淚
濕而爛者實驗之常門大脈為主從何部分而來
或穿過某位則別其所患在何經絡或常或變自病
治之治外者細脈易退大脈難者退遲難細弱而
脈大者必須耐去盡方已庶無再來之患不然他
日犯禁其病復發若有別證亦循此而至凡絲脈
沿到風輪上者病尤重而必變若因其滯而日積月
累一旦觸發脈紫紫及脾腫者用開導之凡見絲脈
此紫內服外點點時細縮不點即脈久入亦然及因
而激動滑病變者珠雖不紫雖不腫亦有積滯在
內深處乃種滯而輕而在絡中幽深之所故未脈出
耳揭開上專深處看少其內必有不平之者在焉因
其滯而擊其輕重略略導之不可通過則有傷其血
水動者謂日中昏弱少患

目珠俱赤

目珠俱赤乃目之白珠變青藍色也病在至急蓋
氣脈本白凝滯而蓋無光珠中黃汁溢出在氣輪
之內故變青藍色蓋無光珠中黃汁溢出在氣輪
損而致終身盲疾矣然當各因其病而治其本去厥
風者風邪也傷寒者寒火熱邪也因毒者毒氣所
攻也條條此

論目腫脹

肝經實熱眼赤腫痛或門赤湯瀉肝散散飲風熱
上攻目赤腫痛金絲翳障頭顱脹散白睛腫脹痛
地黃丸桑白皮散洗眼青皮湯元參丸瀉肺湯朱砂
煎

腫脹如杯

謂目亦稱脾眼如杯覆狀是邪在本火之有餘蓋木
冠土火生土今肝邪乘虛而侮脾土土受木剋而火
能生火邪反乘虛而為炎燥之病其珠必疼尤重而
脾亦急變者暴風客熱作腫者必熱淚多而珠疼稍
緩然風熱自外客感易退治亦易愈若木火自內攻
擊則病亦迫近重則夜涕閉塞血灌睛中而變隆不
測矣須用開導之江經則敷治而退重則必須開導
此大意也若敷治不退及退而復來併開導不消消
而復發痛連頭腦而腫愈高脾愈實者此風熱欲成
毒之候也

形如蝦蟇

因瘀滯已甚血脈無所從出遂致腫起氣輪狀如蝦
蟇其則吐出脾外者病尤急非比飽泡氣分之可緩
者瘀血滯睛與此證病雖一種濕睛則聚言而未
至於極此則極矣有半邊腫起者有連珠俱被脹起
蓋定為珠者又有大皆內近鼻處脹出一片如皮
如肉狀似蟹背乃血脈從睛中落來故脹起於大
皆象白上寬皮也不可割為之藥華在此處誤割
者為漏為瘻不可不辨認仔細只用開導血漸去而
皮漸縮小皆脹出如蟹者亦然其病大意是血氣而
盛之患宜以開導為先大有餘證位而治之在脾部

最重久則移傳於肝而風輪有害也

狀如蟹泡

氣輪膨脹不紫不赤或水紅或白如蟹狀如飽泡乃氣
分之滯金火相搏所致不用絲導唯以清涼劑自清
復若有微紅及赤脈者略略於上脾開之不可過此
亦是微氣之說雖不適亦可若頭痛淚熱及內障而
赤脈多者防有變證宜早導之庶無後患

鰓眼凝睛

有項瘻頭瘻面腫赤癰之患其狀目如火赤綻大兼
於睛間不能微運轉動若鰓對因神之目鰓鰓為之
珠赤而凝結者疑定也乃三焦開格陽邪實盛元陽
之者風熱滯滯將導清目欲舉出矣大宜於內迎
香太陽兩脾上星等處要緊之所並舉而治治之

因風成毒

初發時乃項風濕熱熱血濕諸般腫痛症毒病失於
早治雖治不得其法遂致邪盛得來成毒腫與珠週
行脈出如拳似碗連珠常痛痛不可當先從易珠痛
起後爛氣輪有爛於上下驗并腫及額上內邊空而
孔若飲食少腫甚腫甚者死尤速若能飲食而微調
者死遲入至中年患此者百無一二可生若患頭疼
腫脹珠凸等證治復發難治再治再發難治如前者即
成此也若已成者雖治之難少退痛少止決又發難
時再治至於救急一發不救則死既成此證必
不可生之理未成者十分用心謹慎療治得宜確實
可生凡目病但見諸腫痛珠珠及脾腫而致致發難
難救雖亦不難開時略吹少項如故者皆此病來
也宜內導其毒而救之庶無噬臍之悔

旋風之起

氣輪自平水輪自明惟風輪之起也或只半邊之起者或四半邊大者或乃打氣獨盛滿而木道濕火雷風輪故大風起或在下或在上或在兩旁各隨其火之所來從上者多矣比旋風之起已成證而俱起頂上不可斷者乃止言風輪起者耳

旋風之起

乃氣輪以裏為珠人聚而旋起如蠅蟻之形圓而尾尖視風珠亦圓而中大而故曰旋風起因凡滑之害五氣聚暴故風起為珠在所觸處內必有積血凸起可以平治大於內之法治則旋風起而氣定青凝不復生矣病者傷者珠外亦有病如癰腫上醫冰醫沉滑等症在馬蓋初起時本珠微凸之候因服寒涼之劑收止但失於散伏不氣散血凝而路疑氣定不復平也

神珠自眼

目珠感也有內外輕重不同特醫則自覺目內眼感不爽治亦易退重則自覺眼痛甚則人視其珠亦覺漸漸眼起者病亦發見於外已甚大凡目珠覺眼熱而不赤者火尚微在氣分之間痛者重則變赤痛感惡者有眼塞之患珠清甚而眼急珠覺起者防睛眼之禍若目不止覺目中或脹或不覺時作時止不一者為火無定位遊客無常之故有風邪溫熱氣無佛者皆有自覺之患但經血部至於痛者皆重而有變矣

珠突出眶

為珠忽然突出眶也與睛眼因滯而慢慢眼出者不同其故不一有因元元將散精華未散致移脈俱損猝極將而出者其人不久必死有因酒醉怒甚及嘔吐極而排出者有因患火盛熱極而關格九極而眼出者有因怒其吼喊而排出者此皆因水液衰少轉血耗損放脈溫熱氣火極火無所從出出而散泄之不及故滿脈而珠出亦有因打撲而出者凡出遲速兩驗而脈皮未斷者乘熱捺入難入脈絡損動終是光損若突出猶合在眼中者易入尤不損若離脈脈絡皮俱斷而出者難華化復生不能救矣

論目弄

因風而弄者瞋風一字散因火而弄者類於赤痛求降火之劑因血虛而弄者四物湯

弄若幾行

非若常時小弄之輕乃如蟲行而弄不可忍也為病不一須驗目上有無形澄決其病之進退至如有障無障皆有弄機之患病源非一有風邪之弄有血虛氣動之弄有虛火入絡行氣行動之弄有邪退火息氣血得行脈絡通暢之弄大凡有病之目常時又不醫治而自作弄者弄一番則病重一番若醫治後而弄作病必去速若弄幾難當時時作目覺低陷者亦不止久有癰瘡而目覺者旋時至矣痛而復多者血虛夾火大抵癰瘡實屬虛腫有火亦是邪火乘虛而入非其本病也

論外障

在睛外遮睛如內經診目痛亦脈從上下者太陽病

從下者陽明病從外走內者少陽病按此言表裏之醫明表用以治病如鼓應桴也凡赤脈翳從上而下者屬太陽未其病必遲後發而支脈頂痛或半邊頭痛是也治法宜運之散之通則脈平翳川兩等分煎服立愈藥立愈常以此當用附錄一錢細辛川芎防風羌活荆芥兩芽茶一大塊白芷一錢細辛川芎防風羌活荆芥相兼服東垣黃芩湯羌活湯治之是也赤脈翳從上而下者或從內醫出外者折屬陽明以陽明主裏其逆氣熱或實是也治法宜下之寒之下則方流氣散錢氏黃芩丸附白僵白丸加黃連黃藥之類累用藥驗則一味黃連平肝凡之類是也

赤脈翳初從外者內者為少陽以少陽主表裏治法宜和解之神仙退赤丸羌活湯退赤湯清散之類是也

醫眼者風熱重則有之或從入眼此肝氣壅而發在表也醫眼已生在表明矣宜發散而去之若反視和則邪氣內蓄為醫深邪氣未定謂之無醫而浮邪氣已定謂之冰醫而沉邪氣平而深者謂之陷醫當以煖發之物使其邪氣再動醫眼浮位以溫醫之藥而能自去也若病人者不能速效以以歲月除之

新醫所生表散方東垣羌活湯治之有者退赤丸之類發陷醫保命丹角散之類用之在人消導否陰

虛有熱者兼服神仙退火丸

醫陰囊至其年月日期復發者或開一月或二月一發爲癰瘡如膿滑者宜溫白丸如黃連草龍蛇如東垣五積散服之

黃連上衝

在風輪下際位間神膏之內有腎生而色黃如年少人指甲內際白最相似與此脂腎同一氣脈但此脂腎在輪外生點黃可去者此則在膏內熱蒸起點藥所不能除若漫及離神其珠必損不可誤認爲滿波可緩者之證此是經絡阻滯極甚三焦開格火上邪之盛實者故大便結小便澀而熱者從膏內作膿潰起之禍也失治者目有凹凸之患宜速神清胃湯神清散皂角丸兩角飲選用

赤腹下重

初起甚薄次後甚大大者病急其患有障色赤多赤脹黃白輪而下也烏珠上牛邊近白際起障一片仍有赤絲牽針連大絲根赤甚深濕珠疹頭痛者病急而有變絲細少色微赤珠不疼痛者緩而末變亦有珠雖不疼頭亦不痛若無他證或只濕赤而生薄障障上仍有細絲牽連或赤眼或邊絲下仍起星數點此星亦是凝脂之微病也此等皆是火在內滯之患其尚高形壯亦當善無形之火潛入膏內故作是疾非比有形形之重也若障上有絲及是生於絲結皆能退星之病爲得絲眼中生氣故易生而難退然若遇退星細細赤不甚者已用善法之足矣甚者不得已而開導之大抵白珠上牛邊有赤脈生起垂下到黑赤脈不黃多寡但有疼痛眼赤便

是因陰來了若是絲少亦微但促上而落者退亦速

治當耐心若其退轉神者不開細細斷斷退避此密是濕熱在輪間隱之火深潛在終故有此脈之赤四圍雖無赤脈其深處亦有積滯注滯而深而火尚伏成未耳一旦陽發則其患速發矣赤炎火內無滯滯外無此病輕者治數車者同導此定法也內服聚肝散外用紫金膏點之天照通肝散神清散是角九

凝脂管

此證爲病最急起一端百難者十有七八在風輪上有點初起是星色白中有凹如針刺傷後漸長大變爲黃色凹亦漸大爲陷者有初起是星色白無凹後漸大而變色黃始變出凹者有初起便帶點黃色或有凹或無凹後漸漸變大者或初起便成一片如障大而厚色白而嫩或色淡黃或有凹或無凹而變者或有障又於障內變出地如黃脂者或先有痕凹後變出凝脂片者所變不一視則一障大法不問星障但見起時肥壯胞微形人而色黃者退而速長者凹此證也初起時似小夫後漸大甚則爲陷爲滿爲整積內清指背外爲凹凸或氣腫有聲發出稠水而破者此皆驚風之極悉錄肝膽一絡清氣受傷是以漫及神膏潰壞難痊不通旬日損及離神若四圍見有赤滑者因血阻而路滯汗不得升運之故若四圍不見赤赤之甚者其內絡深處必有阻滯之故凡見此證當作急候脫胎治若遲得長大散滿烏珠難救得珠先亦帶病失去後珠上必有白障如黑點外圍皆赤狀終身不能脫苦結在當中則視昏朦凡

日而有此證起但是頭夜珠痛一便燥即最惡之極甚若一便通轉小稍緩有一於斯爲可畏也

花寶白陷

因火燥結內膏液凝滯凝脂後四圍起而漫神珠故風輪色白或微黃視之與濕障相似而微者大法其病白輪之際四圍生漫而漸漸厚潤中間尚青未滿者雖神尚見只是四圍高下中間低了些此金結木之禍也或有就於胎內下邊起一片黃膜此一證夾攻尤急亦有上下生起各處連障內變爲此證者此火十鬱之禍也亦有不從治際起只是凝脂腎包黃或不黃初小後大其細條如管或細顆如星這邊起一箇那邊起一箇四散生將起來後縱長大牽連混合而害目此火禍也以上三者必有神滯治當尋其源清其流則清涼之重則開導之苦病漫及離神不其厚者速救亦有挽回之理但終不得如舊之好耳疾已甚難離神隱隱在內亦不能救其無疾止可救其凹凸而已如母飲子桑白皮湯

蟹脂

謂黃脂膏出凝脂破壞風輪神膏現出黑點小則如蟹脂大則如黑豆甚則填及離神內風輪神亦如杏仁凝結狀者極甚則細小如無者至癰則黃脂出若此證與蟹脂如珠狀類而治大同小異蟹脂如珠者皆膏內生起非若此因滅而放故不同然有虛實虛者虛而不來來速去速實者實而不痛痛速速去速其治則一雖有妙手難免癰瘡之患

痘脂

魚鱗瘡

色雖白而面不充狀帶斜斜故號魚鱗乃氣結青癰不能除者如癰疽腐爛及大片病已甚不得已大用寒涼及冰片等點者往往結毒此也

馬癰瘡

與癰肉大同小異蓋殺伐內外寒治皆同但癰肉有不用割而治者曰小與也亦有是等肉先起後變為重其狀兩頭尖薄中間高厚內紅倍若馬癰狀橫臥於中四壁有薄薄肉演紫赤筋脈顯露乃重分之人久入方最難治且難去而傷風病人每多患此治之必先刀割割去五六方用殺伐之藥則有刃不割則藥力不敷病勢甚費其力然則須用烙其根處不關則割去極生任受痛楚多則有殺邪之禍要出傷外疑劫治內須平治不然外雖平而內必發後勢漸切此狀乃極慘非若尋常溫瘡之謂也

努肉

多起上輪有障如肉或如黃油至愛漸漸厚而長積亦發勢如肉肉亦如珠凡屬惡瘡皆惡瘡幸驗之人患此者多矣則浸洗瘡肉視亦不見治宜殺伐久入目愈損而無於惡惡及珠向露者宜不必用鉤割之治一日努肉發露或赤亦癰多年肝癰為風所衝而或用力者有肝癰而得或毒或瘡自兩齒頭等出心氣不寧者連不已遂乃舉暗或起筋股宜服洗刀散及一萬散定心丸

肺癰

由膏而起黃氣輪如皮似魚鱗帶至於風輪光亦不損甚則掩及肺神方礙暗視大抵十之八九皆由

大管而起有赤白一證赤者血分白者氣分其原在心肺一經初起如薄薄黃脂或赤脈數條後漸漸大而厚赤者少白者多雖赤者亦是白者所致蓋先有白而不忌火毒幸熱故傷血而赤非血分之本病也治赤雖過其實不退必損殺伐殺伐之治雖不見形勢之惡入而且痛功亦遲緩若不若一割即去烙之免其再於大抵眼科一法唯此最為得效

羅冠眼

二證形色相類羅路相同治亦一法故總而言之非一病同生之謂也其狀色紫如肉形類羅冠眼肉者即是多生脾腎之間然後害及氣輪而遮掩於目治者須用割治七八後用殺伐不發藥徒費功若割亦用烙定方好其目大皆內有紅肉一塊如羅冠眼肉者乃心經血部之英華若誤割者輕則損目重則喪命慎之抽風湯決明散

魚子石癆

二證羅路同治法亦同故總而言之亦非二病同生也子障非聚星之比又非玉粒之比其狀生肉一片外面疊疊如魚子生於目或淡紅色或淡黃色或肉色狀如石槽子起蓋於房其病紅肉類或四或六或八四角生來障滿神珠亦不見已上二證俱是血部滋養之病目疾惡證治用割後見三光者方可伐治三光惡者則必瞶神有損不必治也

輪上一類如赤豆

氣輪有赤脈淋注直落風輪風輪上有顆粒起色紅初如赤小豆大後擴大專為內有瘀血之故急宜開導血漸起類亦漸治病到此十有九損若白珠上痛

自有顆粒紅者亦是赤帶上下無絲脈接實者只用點藥自消若有接實者必結中有血脈來宜向所來之處尋有連其輕重而尋之若白輪有紅顆而重急濕痛者有變而急痛連內而根深接內者火灼也又非此比若白珠雖有紅顆而不疼腫疼不甚者輕治亦易退速消可矣

睛中一點似星

白點一顆如星光常睛中蓋定雖久不大不小旁觀眼神在內只是小點正視光華亦損乃目痛路不忌房事及服燥熱下焦家資少藥過多火難退而腎絡氣滯實凝結為此病輕者不超點亦不除終身之患也

五花障

生於神珠之上斑斑雜雜蓋五臟結聚間之氣俱傷結為此疾其色白或如幾米色或肉色中帶焦黃微紅藍等色或淡或深不一若中有一點黑者乃腎陰虧損治不能棄去此狀與痘暗眼馬眼內傷乃小而障未掩障之輕有此則則障顯大生在背外可退故不同耳

混障

混障者治之於白者赤者也患之者最多有赤白二障赤者易治於白者赤者亦難治而白者長其清濁者有此二樣牽帶者必難退而易退者先因內障而成混障則障去而原有兒矣若無別證則治白是一色者若混障因而生病發者則障退出九中變障後治本病二云混障治白障先非而後障也風有淚