

戎集五卷

|    |    |    |     |     |     |
|----|----|----|-----|-----|-----|
| 眩暈 | 痲木 | 癲狂 | 痼疾  | 健忘  | 驚悸  |
| 怔忡 | 虛煩 | 不寐 | 厥疔  | 心胃痛 | 腹痛  |
| 腰疼 | 脇痛 | 臂痛 | 肩背痛 | 痛風  | 脚氣  |
| 癰疽 | 瘰癧 | 消渴 | 瘰癧  | 濁疔  | 遺精  |
| 淋疔 | 關格 | 遺溺 | 小便閉 | 大便閉 | 二便閉 |
| 痔漏 | 休氣 | 脫肛 | 諸虫  |     |     |

新刊醫林狀元壽世保元戊集卷之五

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

男龔安國校

眩暈

脉風寒暑濕氣鬱生涎下虛上實皆暈而眩風浮寒緊濕細暑虛涎弦而滑虛脉則無治眩暈法尤當審諦先理痰氣次隨證治

眩者言其黑暈言其轉言其昏眩暈之與冒眩其義一也其狀目閉眼眩身轉耳聾如立舟車之上起則欲倒蓋虛極乘寒得之亦不可一途而取軌也風則有汗寒則掣痛暑則執悶濕則重滯此四氣乘虛而眩暈也喜怒哀樂悲恐憂思鬱而生痰隨氣上厥七情致虛而眩暈也淫慾過度腎家不能繼氣歸原使氣逆奔而止此眩暈之出於氣虛也明矣吐衄漏崩肝家諸不能收攝榮氣使諸血失道妄行此眩暈之生於血虛也又明矣以致新產之後血海虛損或瘀不行皆能眩暈是不推尋致病之因乎治法隨機應敵其

間以升降鎮墜行焉最不可妄施汗下然而眩暈欲解自汗則有之若諸逆發汗劇者言亂目眩與夫少陰病下利止而頭眩時時自汗者此虛極而脫也識者將有採薪之憂

清暈化痰湯 主方治眩暈之總司也

陳皮去白 半夏姜汁炒 白茯苓去皮各一錢半 枳實麸炒一錢 川芎

白芷 細辛 南星姜汁炒 防風 羌活各七分

黃苓酒炒各八分 甘草三分

右剉一劑生羌三片水煎服以此作丸亦可○氣虛加人參七分白朮去蘆一錢○血虛加當歸倍川芎○有熱加黃連薑炒七分

○一論頭旋眼黑惡心煩悶氣短促上喘無力言語心神顛倒目不敢開如在風雲中頭若裂身重如山四肢厥冷不得安睡此乃胃氣虛損停痰而致也半夏白朮天麻湯方見頭疼

○一論勞役之人饑寒眩暈者脉虛弱也

補中益氣湯方見內傷 依本方加半夏天麻白芍熟地黃○一眩暈屬氣虛有

濕痰者依本方去柴升加白茯苓川芎半夏天麻桔梗白芷

○一論陰虛火動眩暈者脉必數也

清離滋坎湯

方見勞瘵

依本方加川芎天麻山梔竹瀝少許

○一論真陽不足上氣喘急氣短自汗虛極欲倒如坐舟車眩暈手足冷脉沉細也

參附湯

人參 五錢

大附子 炮三錢

右剉一劑生薑十片水煎熟服

○一論眩暈之症因氣虛痰火炎上故也

清陽除眩湯

人參 六分

白朮 去蘆一錢

白茯苓 一錢

陳皮 一錢

半夏 湯泡一錢

天麻 八分

檳榔 八分

旋復花 八分

甘草 四分

右剉一劑生薑三片水煎服

○一論肥白人日常頭眩眼花卒時暈倒者名曰痰暈

清痰祛眩湯

南星 薑泡

半夏 羌汁

天麻

蒼朮 米泔

川芎

陳皮

茯苓 去皮

桔梗

枳殼

去穢

烏藥

酒苓

羌活

各八分

甘草

三分

右剉生薑水煎臨服入竹瀝薑汁全服

○一論體虛之人一時為寒所中口不能言眩暈欲倒手足厥冷

薑附湯

乾薑一兩

大附子

主去皮

右剉每五錢水煎溫服

○一論一切失血過多眩暈不醒者

芎歸湯

川芎

當歸各等分

右剉水煎溫服○虛甚加炮過大附子

○一論氣血兩虛而挾寒作頭目眩暈

十全大補湯

方見補虛

按本方如有痰喘

○一治一人形體虛弱不頓顏色因勞傷過度手足麻痺口乾

引飲六脉洪數而虛以爲腎經虛火上升

而爲痰陽氣虛弱而麻痺虛火上炎而作渴以補中益氣湯合地黃丸料治之而已

○一人氣短痰壅服辛香之劑痰盛遺尿兩尺浮大按之如無予以爲腎家不能納氣歸元香燥致甚耳用八味丸料三劑而愈八味丸見補益

○一人形體豐厚勞神喜怒面帶陽色口渴吐痰或頭目眩暈或熱從眼起左三脉洪而有力弓爲足三陽虧損用補中益氣湯加麥門五味及加減八味丸而愈

○一大方痰壅湯

半夏法製橘紅一錢 赤茯苓一錢 黃芩酒洗白朮一錢 川芎五分  
黃連五分 黃柏酒炒知母七分 石膏一錢 薄荷五分 甘草炙五分

右剉一劑生薑三片水煎臨臥服

一生員形體魁梧不慎酒色因勞怒頭暈仆地痰涎上湧手足麻痺口乾引飲六脉洪數而虛余以爲腎經虧損不能納氣歸源而頭暈不能攝水歸源而爲痰陽氣虛熱而麻痺虛火上炎而作渴補中益氣合六味丸料治之而

言世...  
愈其後或勞役或入房其病卽作用前藥而愈

○一孟都憲氣短痰暈服辛香之劑痰盛遺尿兩尺浮大按之如無余以爲腎家不能納氣歸元香燥致甚耳用八味丸料三劑而愈

○一孫都憲形體豐厚勞神善怒面帶陽色口渴吐痰或頭目眩暈或熱從腹起左三脉洪而有力右三脉洪而無力余謂是三陰虧損用補中益氣加麥門五味及加減八味丸而愈

十全大補湯

見補益

補中益氣湯

見內傷

八味丸

見補益

# 麻木

脉浮而濡屬氣虛關前得之麻在上體關後得之麻在下體也脉浮而緩屬濕爲麻痺脉緊而浮屬寒爲痛痺脉澁而芤屬死血爲木不知痛癢內經曰風寒濕三氣合而爲痺故寒氣盛者爲痛痺濕氣勝者著痺河間曰留着不去四肢麻木拘攣也經又曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者病久入深榮衛之行澁經終時疎故不痛皮膚不榮故爲不仁夫所謂不仁者或

周身或四肢唧唧然麻木不知痛癢如蠅扎縛初解之狀古方名爲麻痺者是也丹溪曰麻是氣虛木是濕痰死血然則曰麻曰木者以不仁申而分爲二也雖然亦有氣血俱虛但麻而不木者亦有虛而感濕麻木兼作者又有因虛而風寒濕三氣乘之故周身掣痛兼麻木併作者古方謂之周痺治法宜先汗而後補也醫者宜各以類推而治之不可執一見也

加味八仙湯

當歸酒洗 川芎 熟地黃各七分 白芍酒炒八分 人參六分 白朮去蘆二錢  
陳皮八分 半夏曲七分 白茯苓去皮一錢 桂枝三分 柴胡四分 川羌活五八分  
防風五分 秦艽六分 牛膝六分 甘草炙三分

右剉一劑生薑一片棗一枚水煎食遠服○氣虛加黃芪蜜炒八分  
一論麻是渾身氣虛也

加減益氣湯

黃芪蜜炒 人參 白朮去蘆 陳皮 當歸錢 升麻 柴胡

木香各五香附

青皮去穢川芎各八分桂枝

甘草各三

右剉一劑生薑棗煎服

○一論十指盡麻并面目皆麻此亦氣虛也

補中益氣湯 依前方去青皮川芎桂枝加麥門冬羌活防風烏藥其十四味

○一論本是濕痰死血也

雙合湯

當歸

川芎

白芍

生地黄

陳皮

半夏

羌炒各一錢

桃仁去皮

白茯苓去皮

紅花三分

白芥子一錢

甘草三分

右剉一劑薑十片水煎熟入竹瀝薑汁同服

○一論手足麻痺因濕所致也

香蘇散方見感冒 依本方加蒼朮麻黃桂枝白芷羌活木瓜

○一論感風濕手腫或痛或木或遍身麻木

五積散方見中寒

一論婦人七情六鬱氣滯經絡手足麻痺宜

開結舒經湯

紫蘇

陳皮

香附

白烏

川芎

蒼木 米泔湯

羌活

南星

半夏

當歸 八分

桂枝 四分

甘草 三分

右剉生薑三片入薑汁竹瀝服

○一論口角麻木涎及嘴角頭面亦麻或嘔吐痰涎或頭眩眼花惡心遍止渴消痰飲

黃連

半夏

瓜蒌仁

黃芩

白茯苓

桔梗

枳殼 剉炒 陳皮

天麻

細辛

南星

甘草

右剉生薑三片水煎服○血虛加當歸○氣虛加人參○亦有十指麻木胃

中有濕痰死血加蒼朮白朮少佐熟附子行經中死血者四物湯加紅花桃

仁韭葉忌生冷魚腥發風發熱之物

○一論十指疼痛麻木不仁

大附子木香各等分每服三錢薑三片水一碗煎七分服

一論婦人遍身麻痺謂之不仁皆因血分受風濕所致用祛風散送下五補

祛風散

生川烏

白朮土蘆

白芷各二錢

甘草二錢

右為細末酒調吞下五補丸

五補丸

黃芪密炒

八參五錢

附子一个

當歸三錢

白芍酒炒五錢

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服五七十九丸祛風散送下

一論不仁者謂不凝和也痛痒不知知寒不知是也經曰諸乘虛寒而鬱冒不仁蓋其血氣虛弱不能周流於一身於是正氣為邪氣所伏故肢體頑麻不知痛癢寒過厥如死屍而鬱且冒也用桂麻各半湯不愈者補中益氣湯入薑汁設或汗如油喘不休喘而直視水漿不入者此為命絕也

○一論風熱血燥皮膚瘙癢頭面手足麻

清涼潤燥湯

當歸酒洗

生地黃各一

黃連

芩芩

白芍煨

川芎各一

羌活

天麻

防風

羌活

細辛各八分

甘草五分

黃連

黃連

右劉水煎食遠服麻甚加川烏炮三分

一論而上木處可將桂枝爲末用生皮膠和少水花開調敷之厚一二分若腳底硬木處可將牛皮鎔化入生薑汁調和仍入南星末五錢和勻膠用厚紙攤貼二三分乘半熟裏貼腳底用溫火烘之此外治也

一治兩手指麻木四肢困倦怠惰嗜臥乃熱傷元氣也

黃芪八錢人參五錢白芍二錢柴胡二錢升麻二錢五味子一百四十個生甘草五錢

炙甘草二錢右劉水煎稍熱空心服

一治兩腿麻木沉重無力多汗喜笑口中涎下身重如山語聲不出右寸脉洪大

黃芪三錢當歸二錢蒼朮四錢陳皮五錢藜蘆三錢黃柏酒炒一錢

柴胡三錢升麻一錢知母酒炒一錢五味子一錢生甘草一錢半

右每劉一錢水煎空心服少待以早飯壓之

一治皮膚間有麻木乃肝氣不行故也

黃芪一兩白芍一兩橘皮一兩半澤瀉五錢炙甘草一兩

右劉水煎溫服

# 癲狂

癲脈搏大滑者生沉小緊急不治○狂脈實大生沉小死○癲脈虛可治實  
內經曰巨陽之厥則腫首頭重足不能行發為胸仆胸其目也是蓋陽氣逆亂  
故令人卒然暴仆而不知人氣復則甦此則癲之類也又曰陽明之厥則癲  
疾欲走呼腹滿不得卧面赤面熱喜見妄言又曰甚則棄衣而走登高而歌  
踰垣上屋罵詈不避親疎是蓋得之於陽氣太盛胃與大腸實熱燥火鬱結  
于中而為之耳此則癲狂之候也曰癲曰狂分而言之亦有異乎難經謂重  
陰者癲重陽者狂素問註云多喜為癲多怒為狂然則喜傷於心而怒傷於  
肝乃二臟相火有餘之症難經陰陽之說恐非理也夫抵狂為痰火實盛癲  
為心血不足多為求望高遠不得志者有之癲病獨主乎痰因火動之所作  
也治法癲者宜吐狂宜下癲則宜安神養血兼降痰火雖然此三証者若神  
脫耳目眩如愚癡者縱有千金我亦善未如之何也已矣○癲者喜笑不常

顛倒錯亂之謂也。狂者大開目與人語所未嘗見之事為狂也。又云狂者狂亂而無正定也。○譫語者合目自言日用常行之事為譫也。又蓄血症則重復語矣。○鄭聲顛無力不相接續連言出於喉中為鄭聲也。○陰附陽則狂陽附陰則癲脫陰者目盲脫陽者見鬼。一論癲者心血不足也。此方主癲狂喜笑不常養血清心湯。

人參

白朮

去芦

白茯苓

去皮

遠志

去心

酸棗仁

炒

川芎

各一錢

生地黃

錢二

石菖蒲

錢二

當歸

一錢半

甘草

五分

麥門冬

錢半

右剉一劑水煎服

○一論狂者痰火實盛也。宜後清心滾痰丸主之。若風熱盛者宜

防風通聖散

方見中風

依本方加牡丹皮生地黃桃仁主之。一切大風

癲狂之疾

○一論喜笑不休者心火之盛也

以海鹽二兩火燒令紅研細以河水一大碗煎三五沸待溫三次服之以似

探吐熱痰次服

黃連解毒湯

方見感冒

依本方加半夏竹葉竹瀝姜汁少許

○一論婦人癲疾歌唱無時踰垣上屋者乃營血迷於心包所致也  
加味逍遙散

當歸

白芍 炒

白朮

去萎

白茯苓

去皮

柴胡

生地黃

遠志

去心

桃仁

去皮

蘇木

紅花

甘草

右剉一劑煨薑一片水煎服有熱加小柴胡湯生地辰砂水煎服

○一論發狂無時披頭大叫欲殺人不避水火古人治狂謂之失心人參主心  
腹結氣故足以治時熱狂言

苦參丸

苦參為末煉蜜為丸如梧子大每服二三十丸薄湯送下

○一論一切癲癇風狂或因驚恐怖畏所致及婦人產後血虛驚氣入心并室  
女經脉通行驚邪蘊結頓服此此經効

抱膽丸

水銀

二兩一錢

硃砂

一兩研

鉛

一兩半

乳香

一兩研

右將銚入銚內水銀結成砂子次下朱砂滴乳乘熱用柳木棍研勻丸如芡實大每一丸空心井花水吞下病者得睡切莫驚動覺來卽安再服一丸除根○一方薄荷湯化下亦可

○一論癲狂失心不寐此方用朱砂能鎮心安神酸可使收引故棗仁能飲神歸心香可使利竅故乳香能豁達心志許學士加入參亦謂人參能寧心耳  
寧志膏

辰砂一兩

酸棗仁炒五錢

乳香五錢

加入參一兩

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸薄荷湯化下

○一論癲狂失心此病因憂鬱得之痰涎包絡心竅此藥能開鬱痰

白金丸

白礬二兩

鬱金七兩

右爲末米糊丸每服五十丸溫水送下

一論癲狂五癰驚悸切怪症此皆痰火實盛也

清心滾痰丸

大黃

酒蒸四兩

黃芩

兩錢

青蒙石

煨五錢

沉香

二錢半

牙皂

錢五

犀角

錢五

麝香

五分

朱砂

五錢

右為細末水為丸每服四五十九滾水送下

一論心風者何蓋君火在心因怒發之相火助盛痰動于中腸氣上攻迷其心竅則為癲為狂所怒之事膠固於心輒自談失其條序謂言之心風與風何干也若痰不盛者則有感亦輕

○一論人患心風癲狂健忘怔忡失志及恍惚驚怖入心神不安舍多言不定此藥大能安神養血宜心定志

紫河車一具長流水洗淨慢火焙乾為末煉蜜為丸空心酒送下

○一入癲狂亂打走叫上房用瓜蒂散吐出其痰數升又以承氣湯下之即愈

○一人氣心風即痰迷心竅發狂作用直花藥石煨黃酒淬一次為細末每服

一錢黃酒送下

○一論癲狂五癰眩暈時作時止痰涎庫盛心神昏憤此屬氣血虛而挾風痰

鬱火也

驅風化痰湯