

痘後餘毒證治

凡痘瘡輕者其本疎其毒微其證順自然易靨無餘毒也重者其本密其毒盛其證險自難出難靨有餘毒也逆者或伏或倒陷或倒靨幸脾胃素強調治又早不至大困亦作餘毒錢氏云其病有三一者疥二者癰三者目赤以證求之尚不止此亦有出已盡發已透靨已齊者復作餘毒此由溫補之過飲食之失而得之故治痘後餘毒或補或發散或解利要在分表裏論虛實不可一槩妄投湯劑也

海癰瘡餘毒或肝虛入眼目或肺虛爲癰疥或爲癰

癰發在骨節腎之虛也發在肌肉脾之虛也或在筋
或在頭或在面或牙齒疳蝕或咽喉腫痛各隨經而
見皆毒不散蘊積而成或病人始不早治或醫者失
治遺於經絡其所由來蓋有自矣宜服解毒等劑
世痘毒攻脾則泄瀉身浮攻肝則眼生翳膜攻心則
煩躁啼哭攻腎則耳疼膿聚攻肺則咳嗽痰涎
潔若已發後有餘毒未散復有身熱瘡腫之類當茶
粉下解毒丸

并治小兒痘瘡餘毒未散食穀太早補住毒氣

鼠粘子

六分

甘草

伍分

犀角

白朮 各三

荆芥

防風

枳殼 各一

水煎溫服

活血解毒湯 治餘毒

防風

荆芥

生地黄

赤芍藥

當歸

連翹

牛蒡子

黃連

紫草

甘草

蒼朮

薄荷

川芎

木通

各等分水煎服

瘡癰此由毒氣留藏經絡故於肌肉虛處或關節動搖處紅腫而成瘡又或既平之後失於解利餘毒大盛外不得洩於皮膚內不得入於臟腑聚而不去遂爲之瘡如毒氣淺者止生結核腫毒瘡癰而已甚者至頭項臂手足肢節盡焮腫作痛但發一二處或根淺者可治若流注起伏根深蔓引者小則潰筋脫骨必爲殘廢之疾甚則綿延日久而死 疔疽瘡多是實毒血熱成瘡分上下用藥一日不可緩成膿必用清熱涼血爲主赤芍藥甘草節連翹桔梗之類上引用升麻葛根下引用檳榔牛膝更助以貝母忍冬

草白芷瓜蒌大便秘用大黃寒熱用芩蘖此法累効

醒前證初起未成膿者用活命飲隔蒜灸治而消

之欲成膿者用活命飲解而潰之氣血虛者八珍湯

虛羸

實而潰之虛而不能斂者托裏散補而斂之大

凡發熱腫痛大便不結用仙方活命飲及隔蒜灸法

六便秘結用仙方活命飲加大黃大便已通腫痛未

退再用活命飲一服用托裏散補其元氣若發熱倦

怠大便調和用補中益氣湯

虛熱

未應亦用隔蒜灸

若潰而發熱口乾肢體倦怠用東垣聖愈湯膿水淋

漓不時發熱用四君參耆若因乳母肝經血虛發熱

用加味小柴胡湯

發熱

肝脾鬱怒發熱用加味歸脾

湯

驚悸

高粱厚味積熱用加味清胃散

齒

如專與

涼血用敗毒等藥復傷元氣必致成者不能潰潰者

不能斂矣

凡治痘瘡先看何經絡分氣血多

少用引經藥如太陽經羌活防風陽明經升麻白芷

少陽經柴胡少陰經獨活太陰經防風厥陰柴胡若

初紅腫硬痛者以鍼刺之口吮去惡血以拔毒膏敷

貼氣實能食大便堅者用排毒散疎利之氣虛食少

者用十宣散或流氣飲毒淺而小者只內服小柴胡

湯外用地黃湯外用地黃湯外用地黃湯外用地黃湯

若已成膿而未潰者以銀針尖去其膿勿使內潰
潰者用十全大補湯并主之此治潰瘍之法也

仙方活命飲 治痘片痘毒及一切瘡毒未成即消

已成即潰此消毒敗膿止痛之聖藥

金銀花

陳皮

各三

皂角刺

炒

穿山甲

用蛤粉炒

乳香

沒藥

白芷

防風

當歸

各一

貝母

天花粉

甘草節

各七分

右每服五小酒煎嬰兒母同服為末酒調服亦可
若勢甚而邪在表者加麻黃散之而毒在內者加

大黃下之當臨證制宜此解回生起死之劑但三

氣脫者不治

人參敗毒散 治餘毒癰腫

人參

赤茯苓

羌活

獨活

前胡

薄荷

柴胡

枳殼

川芎

桔梗各等分

甘草減半

牛蒡子

防風

荆芥

連翹

金銀花即荆防敗毒散

頭上加白芷升麻

上身倍加桔梗

手加薄荷

腰加杜仲 腿足加牛膝木瓜

禪皮散 治痘瘡及乳癰并一切腫毒

樺皮木剉煎溫服此藥味苦平無毒 若治乳癰

取禪皮燒存性爲末酒調服之立消

十三味敗毒散 治癰毒

當歸 白芷

穿山甲土炒

金銀花 防風

乳香製

甘草 陳皮

赤芍藥

皂角刺 貝母

沒藥製

天花粉 芍藥

疳積

公和

百

各等分酒水各半煎服

排毒散

見校醫

保命集木香散

治小兒癰後生瘡如神

地骨皮 一兩

木瓜 半兩

穿山甲

炙黃三

麝香 一字

右為末米飲下二小

沉氣飲

川芎

當歸稍

白芍藥

防風

人參

紫蘇葉

桂心

枳殼

雞心檳榔

白芷

厚朴

烏藥

枳殼各四分

右剉細水一盞煎七分服氣血虛而目利者加乾

附子大便實加大黃

小柴胡加生地黃湯

柴胡

人參

黃芩各三

甘草

生地黃

半夏各二兩湯包七次

右為麤末每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎

至半盞去渣溫服

六味活血散

治癰疽瘰癧初起紅腫不散

當歸

川芎

赤芍藥

生地黃

紅花

蘇木各等分

右水煎量服之

五福化毒丹

治痘毒實熱腫痛

生地黃

熟地黃

天門冬去心

麥門冬去心

玄參各二兩

甘草

甜硝各三兩

青黛一兩

右為末蜜丸芡實大每服一九白湯化下

犀角消毒丸

治痘疹餘毒一切瘡毒

地黃

荊芥

當歸

犀角屑

防風

牛蒡子黃炒

赤芍藥

連翹

桔梗各七

薄荷

黃芩

甘草

右爲末蜜丸芡實大每服一九白湯化下

按化毒丹降火涼血解毒寒中之劑消毒丸清熱解毒破血之劑蓋小兒臟腑脆嫩元氣易傷況痘後氣血皆虛豈能勝當此劑若胃氣一傷則未成者不能消散已成者不能腐潰已潰者不能生肌殊不知痘瘡乃臟腑所發遍身之血皆化爲膿况

此方愈而患此乃脾胃虛怯肌肉消弱榮衛短澁所致治者審之

十宣散

見形

托裏散

治痘毒元氣虛弱不

散未成用之白

消已成用之白潰

人參

黃耆

炒各二錢

當歸

酒洗

白朮

陳皮

熟地黃

茯苓

芍藥

炒各一錢五分

甘草

炙五分

右三五錢水煎服

裏消毒散

治痘毒氣血虛弱不發腐潰收斂

或發寒熱肌肉不生

人參

黃耆

當歸

酒洗

川芎

芍藥

炒

白朮

陳皮

茯苓

各一升

金銀花

連翹

白芷

各七

甘草

伍分

右每服三五錢水煎

東垣聖愈湯

治膿潰心煩無寐體倦少食

熟地黃

自製
首佳

生地黃

各二

人參

川芎

各三

當歸

黃耆

各伍

右水煎服

濟生歸脾湯

治脾血虛損健忘驚悸或心氣虛不

能攝血歸源以致妄行或吐血下血或因乳母心

脾二經有熱瘡不結痂或瘡痕赤色加柴胡山楂

即加味歸脾湯

人參

白茯苓

黃耆

白朮

龍眼肉

當歸

遠志

酸棗仁

炒各二錢

木香

一錢

甘草

伍分

當歸身

一錢

右薑棗水煎母子同服

丹溪痘瘡敷藥用貝母南星礬蠶天花粉寒水石白