

春集

外科古方

卷六十四下

收口摻藥 百五十

李氏云龍游有患背疽者大潰五臟僅隔膜耳自謂必死用
鯽魚去腸實以羯羊糞烘燥爲末乾摻之瘡口自收此出洪
氏方屢用有效故附於此須候膿少欲生肌肉時用之

桔梗湯 一五一

治欬嗽吐膿痰中有血胸膈兩脇作痛煩悶

作湯或出臭濁已成肺癰證

桔梗 炒

貝母

當歸 酒浸

瓜蒌仁

枳殼 麸炒

薏仁

桑白皮 炒

百合 蒸各一錢五分

五味子 炒

知母 炒

地骨皮

甜葶藶 炒

甘草節

防已

黃芪

杏仁各五分

水二鍾煎服

濟生桔梗湯 一五二

治肺癰欬嗽膿血咽乾多渴大小便赤澀

方如前但少五味葶藶知母地骨皮四味

用水二鍾薑五片煎八分食遠服大便秘者加大黃

人參五味子湯 一五三

治氣血勞傷欬膿咯血寒熱往來夜

出盜汗羸瘦困乏一切虛損肺痿之證並治

人參

五味子

炒搗

熟地黃

當歸

酒炒

白朮炒

白茯苓

炙甘草

陳皮

桔梗炒

前胡各一錢

黃芪炙

地骨皮

桑白皮炒

枳殼炒

柴胡各七分

水一鍾半生薑三片煎八分食後服

四順散一五四

治肺癰吐膿五心煩熱壅悶欬嗽

貝母去心

紫苑去苗

桔梗炒各一錢半

甘草七分

水一鍾半煎七分食遠服如欬嗽加杏仁亦可為末白湯調

服

合歡飲一五五

治肺癰久不飲口

用合歡皮

白欬

二味同煎服

合歡皮即槿樹皮也

亦各夜合

紫苑茸湯 一五六

治飲食過度或煎燂傷肺欬嗽咽乾吐痰

唾血喘急脇痛不得安臥肺痿等證

紫苑茸 去苗

桑葉 經霜者

款冬花

百合 蒸焙

杏仁 去皮尖

阿膠 蛤粉炒

貝母 去心

半夏 製

蒲黃 炒各一錢

人參

犀角 鎊末

甘草 炙各五分

水一鍾半生薑三片煎七分入犀角末食後服

升麻湯 一五七

治肺癰胸乳間皆痛吐膿腥臭

川升麻

桔梗 炒

薏苡仁

地榆

黃芩炒

赤芍藥炒

牡丹皮

生甘草各錢

水二鍾煎八分食遠服

如金解毒散 一五八

治肺癰

桔梗 一錢

甘草 一錢

黃連炒

黃芩炒

黃栢炒

山梔炒各七分

水二鍾煎八分徐徐陸續飲之不可急服○按此方乃降火

解毒之劑也凡發熱煩渴脉洪大者用之即效若脉數欬痰

腥臭或唾膿痰者宜用桔梗湯

如聖柘黃丸 一五九

治肺癰欬而腥臭或唾膿痰不問膿之

成否並效肺家之病雖有方惟此方功效甚捷不可忽之

柘黃 一兩 爲末
百齒霜 卽梳垢 二錢

用糊爲丸如桐子大每服三五十丸米飲下○柘黃乃柘樹所生者其色黃狀如靈芝江南最多北方鮮有

葶藶散 百六十
治過食煎燂或飲酒過度致肺壅喘不能臥

及肺癰濁唾腥臭

甜葶藶
桔梗 炒
瓜蒌仁
川升麻

薏苡仁
桑白皮 炒
葛根 各一錢
甘草 炙五分

水一鍾半生薑三片煎八分食後服

知母茯苓湯 一六一

治肺痿

不已往來寒熱自汗

知母 炒

茯苓

炙甘草

人參

白朮

五味子 炒

麥門冬 搗

半夏 製

薄荷

桔梗

柴胡

款冬花

各一錢

阿膠 炒

蛤粉

黃芩 炒

各二錢

川芎

五分

水三鍾薑三片煎一鍾食遠服

四味排膿散 一六三

治肺癰吐膿五心煩熱壅悶欬嗽

嫩黃芪 炒

鹽水

白芷

五味子 炒

研

人參

等分

右為細末每服三錢食後蜜湯調下

人味排膿散 二六三

治腸癰少腹脹痛裏急後重脉滑數或

時時下膿

黃芪炒

當歸 酒拌

金銀花

川山甲 略粉炒

白芷

防風

連翹

瓜蒌 各三錢

水二鍾煎八分食前服或為末每服三錢食後蜜湯調下如

膿將盡去川山甲連翹倍當歸加川芎

薏苡仁湯 一六四

一名瓜子仁湯○治腸癰腹中疔痛或脹

滿不食小便短澀婦人產後多有此證縱非癰服之九效

薏苡仁 炒五錢

瓜蒌仁 三錢

牡丹皮

桃仁 去皮尖 各二錢

右水煎空心服

牡丹皮散 一六五

治腸癰腰濡而痛時時下膿

牡丹皮

人參

黃芪 炒

白茯苓

天麻

白芷

桃仁 去皮

薏苡仁

當歸

川芎 各錢

官桂

甘草 各五分

木香

三分

右水煎服

梅仁湯 一六六

治腸癰壅痛大便秘澀

梅仁

九個去

大黃 炒

牡丹皮

芒硝

犀角

錢各一

冬瓜仁

錢三

右水煎八犀角末服

大黃湯

一六七

一名牡丹皮湯○專治腸癰小腹堅腫而熱

按之則痛凶色如故或厥赤微腫小便頻數汗出憎寒其脉沉緊膿未成者急服之

牡丹皮

瓜蒌仁

錢各三

桃仁

去皮

大黃

煨

芒硝

錢各二

水二鍾煎一鍾食前服○本方去瓜蒌即名大黃牡丹湯○

立齋曰此方乃行血破血之劑也如發熱自汗惡寒小腹作

痛小便如淋脉未數者有效丹溪曰小腹腫痞按之痛小便如淋或自調發熱身無汗復惡寒其脉遲緊者膿未成宜下之當有血此結熱所成也故金匱用大黃利之卽此方也若無前證恐不宜用其有脉滑數腹內脹痛或時時後重而膿已下宜用八味排膿散蠟礬丸及托裏之藥

射干湯 一六八

治胃脘癰吐膿血

射干 去毛

山梔仁

赤茯苓

升麻 各一錢

白朮 五分

赤芍藥 一錢

右水煎服

槐花散 二六九

治腸風臍毒下血

槐花 炒

熟地黃

青皮

白朮 炒

荆芥穗

當歸身

酒拌

升麻

各一錢

川芎

四分

右爲末每服三錢空心米飲調下水煎服亦可

除濕和血湯 百七十

方在和陣二一九

治陽明虛陷濕熱便血腹痛

夏枯草湯 一七一

治瘰癧馬刀已潰未潰或日久漏者

夏枯草 六兩

水二鍾煎七分去粗食遠服○此生血治瘰癧之聖藥虛甚

老當煎濃膏服並塗患處多服益善兼十全大補湯加香附
貝母遠志尤善

必效散 一七二 治瘰癧氣血尚無虧損瘰核不愈內服此藥

外以鉞頭散腐之若氣血虛者先服益氣養營湯數劑後服
此藥服後癰毒盡下再服前湯數劑

南礪砂 二錢 輕粉 一錢 麝香 五分 巴豆 五個
半 去膜

白蟻柳 一個 斑猫 四十個去頭
翅同糯米炒

右同爲極細末取鷄子二個去黃用清調藥仍入殼內以濕
紙數重糊口入飯甑蒸熟取出曝乾研末虛者每服半錢實

者一錢用炒生薑酒或滾湯於五更調服如覺小腹痛用益
元散一服其毒俱從小便出胎婦勿餌瘡毒去後多服益氣
養營湯瘡口自合○此藥班猫巴豆似爲峻利然巴豆能解
班猫之毒用者勿畏予於京師遇一富商頭有癰痕一片頗
大詢其由彼云因怒而致因苦二年百法不應忽有方士與
藥一服卽退二三再服頓退四服而平旬日而痊以重禮求
之乃是必效散因修合濟人無有不效丹溪亦云必效散與
神效瓜蒌散相兼服之自有神效常以二劑兼補劑用之甚
效故錄之但此藥雖云峻利然癰毒之深者非此不能解故

宜用之惟血氣虛者不可用此其有誤也○又一道人治此證用鷄子七個每個入斑蝥一枚飯上蒸熟每日空心食一箇求者甚多考之各書療癰門及本草亦有之然氣血虛者恐不能治也

射干連翹散 一七三

治寒熱癰癰

射干

連翹

玄參

赤芍藥

木香

升麻

前胡

梔子仁

當歸

甘草 各一錢

大黃 二錢

水煎食後服

如神散 一七四

治瘰癧已潰瘻肉不去瘡口不合

松香末 一兩
白礬 三錢

爲末麻油調搽乾滲亦可

遇仙無比丸 一七五

治瘰癧未成膿其人氣體如常宜服此

丸形氣覺虛者宜先服益氣養營湯待血氣少充方服此丸

核消後仍服前湯如潰後有瘻肉者宜用針頭散更不飲亦

宜服此丸飲後再服前湯

白朮 炒

檳榔

防風

黑丑

半生半炒
取頭末

蚤陀僧

郁李仁

炮去
皮

斑貓

去足翅用糯米
同炒去米不用