

欽定四庫全書

子部

外科理例卷六



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣吳尊變

編修臣倉聖脈覆勘

外科理例卷下

脫疽

或足潰而自脫故名
手指者名蛙節丁重

問

痛者
不痛
藥若色黑急割去速

色赤焮痛者托裡消毒更煎灸

作渴者滋陰降火色黑者不治

一人足指患此焮痛色赤發熱隔蒜灸之更以人參敗

毒散去桔梗加金銀花白芷大黃二劑痛止又十宣

散去桔梗官桂加天花粉金銀花數劑而平

此憑症也

一人年逾四十左足大指赤腫焮痛此脾經積毒下注

而然名曰脫疽喜色赤而腫以人參敗毒散去人參

桔梗加金銀花白芷大黃二劑更以瓜蒌金銀花甘

草節四劑頓退再以十宣散去桔梗桂加金銀花防已數劑愈

一人患此色紫赤不痛隔蒜灸五十餘壯尚不痛又明灸百壯方知乃以敗毒散加金銀花白芷數劑而愈一膏梁年逾五十亦患此色紫黑脚煖痛孫真人曰脫疽之症急斬之去毒延腹必不治色黑不痛者亦不治喜其飲食如故動息自寧為瘡善症遂以連翹敗毒散服六劑更以金銀花瓜蒌甘草節二十餘劑患

指潰脫更以芎歸生地連翹金銀花白芷二十餘劑而愈

次年忽發渴服生津等藥愈盛用八味丸而止

大抵此症皆由膏粱厚味或房勞太過丹石補藥所致其發於指微赤而痛可治治之不愈急斬去之庶可保否則不治色紫黑或發於腳背亦不治或先渴而後發或先發而後渴色紫赤不痛此精氣已竭決不可治

一芻蕘左足指患一泡麻木色赤次日指黑五日連足
黑冷不知疼痛脈沉細此脾胃受毒所致進飛龍奪
命丹一服翌日令割去足上死黑肉割後骨始痛可
救治以十全大補湯而愈

此因症肉黑知為
毒盛不在於脈也

蓋死肉乃毒氣盛拒截榮氣所致況至陰之下血氣
難達經曰風淫末疾是也向若攻伐之則邪氣乘虛
上侵必不救矣

一人足指患之大痛色赤而腫隔蒜灸之痛止以人參

敗毒散去桔梗加金銀花白芷大黃而潰更以仙方

活命飲而痊

此憑症也

此症形勢雖小其惡甚大須隔蒜灸之不痛者宜明
灸之庶得少殺其毒此症因膏粱厚味酒麪炙燻積
毒所致或不慎房勞腎水枯竭或服丹石補藥故有
先渴而後患者有先患而後渴者皆腎水涸不能制
火故也初發而色黑者不治赤者水未涸尚可若失
解其毒以致肉死色黑者急斬去之緩則黑延上足

必死而患不問腫潰惟隔蒜灸有效亦有色赤作痛而自潰者元氣未脫易治夫至陰之下血氣難到毒易腐肉藥力又不易到況所用皆攻毒之藥未免先肝腸胃又不能攻敵其毒不若隔蒜灸并割去最為良法孫真人云在指則截在肉則割去即此意也一人足指患之色黑不痛令明灸三十餘狀而痛喜飲食如常予謂急割去之速服補劑彼不信果延上遂致不救

一人脚背患之色黯而不腫痛煩躁大渴尺脈大而濇此精氣已絕不治後歿

又有手指患此色黑不痛其指已死予欲斬去速服補藥恐黑上臂不治彼不信另服敗毒藥手竟黑遂不救

一人足指患之色紫不痛隔蒜灸五十餘狀尚不知痛又明灸百壯始痛更投仙方活命飲四劑乃以托裡

藥潰脫而愈

此惡症也

一人脚背患此赤腫作痛隔蒜灸三十餘壯痛止以仙

方活命飲四劑而潰更以托裡消毒藥而愈

此憑症也

一人足指患之色赤焮痛作渴隔蒜灸數壯以仙方活命飲三劑而潰更服托裏藥及加減八味丸潰脫而愈

一婦修傷次指成膿不潰焮痛至手悞敷冷藥以致通潰飲食少思彼為毒氣內攻胗脈沉細此痛傷胃氣而然遂刺之服六君子加藿香當歸食進更以八珍

湯加黃耆白芷桔梗月餘而愈

此憑症脈也

一人傷拇指色紫不痛服托裏藥及灸五十餘壯作痛

潰膿而愈

此憑症也

一幼女因凍傷兩足至春發潰指俱壞令取之服大補

藥而愈

此憑症也

一女患嵌甲傷指年逾不愈日出膿數滴予謂足大指乃脾經發源之所宜灸患處使瘀肉去陽氣至瘡口自合否則不治彼惑之不早治後變勞症而歿

蓋至陰之下血氣難到女人患此多因繫縛致血脈
不通或被風邪所襲則無血氣榮養遂成死肉惟當
壯脾胃行經絡生血氣則愈有成破傷風以致牙
關緊急口眼喎邪者先玉真散一百一二服然後投
以生血通經則可

面瘡一百二十附願毒

一人年逾三十夏月熱病後患願毒積日不潰氣息奄
奄飲食少思大便不禁脰脈如無經曰脈息如無似

有細而微者陽氣衰也齊氏曰飲食不入大便滑利

腸胃虛也以六君子加炮姜肉豆寇破故紙數劑泄

稍止食稍進更加黃栢當歸肉桂漬而膿水清稀前

藥每服加熟附一錢數劑泄止食進膿漸稠再以十

全大補湯加酒炒芍藥白欵月餘而愈

此憑脈症也

一人年踰四十胃氣素弱面常生瘡盜汗發熱用黃耆

建中湯少愈更用補中益氣湯而平

此憑症也

東垣云氣虛則腠理不密邪氣從之逆於肉理故多生

瘡若以甘溫之劑實其根本則腠理自固即無他疾
一人年三十面患瘡潰已作渴自服托裡及降火藥不
應脈浮而弱丹溪曰潰瘍作渴屬氣血俱虛遂以參
耆各三錢歸朮木各二錢數服渴止又以八珍湯加
黃耆數劑脈斂而愈

此憑脈
症也

一人年四十頭面生瘡數枚焮痛飲冷積日不潰服清
熱消毒不應脈數按之即實用防風通聖散十二劑

頓退又以荊防敗毒散

七而愈

此憑脈
症也

一人年逾六十素食厚味頰頤患毒未潰而肉先死脈數無力此胃經積毒所致然頰頤正屬胃經未潰肉死則胃氣虛極老人豈宜患此果歿經曰膏粱之變足生大丁受如持虛此之謂也

口齒一百二十一

一人齒痛脈數實便秘用防風通聖散即愈

此憑脈症也

一人齒痛甚胃脈數實以丞氣一劑即止

此憑脈症也

一老齒痛午後則發至晚尤甚胃脈數而實以涼隔散

加荊芥防風石膏一劑而瘳

此憑脈症也

一人齒痛胃脈數而有力以清胃散加石膏荊芥防風

二劑而痊

此憑脈症也

一人齒痛脈浮無力以補中益氣湯加黃連生地黃石

膏治之不復作

憑脈症也

一人齒痛脈數無力用補中益氣加生地牡丹皮而愈

一人齒腫痛熅至頰頤素善飲治以清胃散數劑而愈

一人齒痛服清胃散不應服涼隔散愈盛予用補腎丸