

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百三十一



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷一百三十一

明

周王朱橚撰

傷寒門

傷寒九日已上候論

夫傷寒九日已上病不除者或初一經受病即不能相傳或已傳三陽訖而不能傳於陰至停滯累日病症不變或三陰三陽傳病已畢又重感於寒名為兩感傷寒則臟腑俱病故曰數多而病候改變也

方

前胡湯

出聖惠方

治傷寒九日不解心腹堅滿身體疼痛內

外有熱煩嘔不安

前胡

去蘆頭

半夏

湯浸七遍去滑

白朮

枳實

麩炒微黃

赤芍藥

黃芩

各一兩

甘草

半兩炙微赤剉

厚朴

一兩去麁皮塗生薑汁炙令香熟

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候溫服

石膏湯

出聖惠方

治傷寒病九日曾經發汗吐下未解三焦

生熱其脈滑數昏憤沉重欲入百合狀症

石膏

三兩

黃蘗

黃芩

各一兩

麻黃

一兩

去根節

豉

二兩

黃連

去

川大黃

二兩

剉碎微炒

甘草

一兩

炙微赤剉

梔子仁

一兩

右細剉和勻每服半兩以水一大盞入生薑半分煎

至五分去滓不計時候溫服如人行十里再服以

微利為度

茯苓湯

出聖惠方

治傷寒九日下之後胃膈煩滿小便不利

譫語一身不可轉側

赤茯苓

柴胡

去苗

龍骨

各二兩

川大黃

二兩剉碎微炒

黃芩

人參

去蘆頭

牡蠣

燒為粉

桂心

半夏

湯浸七遍

陳橘皮

湯浸

去白

甘草

炙微赤剉各一兩

穰焙

右為散每服四錢水一大盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候溫服

犀角散

出聖惠方

治傷寒九日心肺熱氣急喉中有膿血

犀角屑

柴胡

去苗

青竹茹

各一兩

桔梗

去蘆頭

川大黃

剉碎

麥門冬

去心各一兩半

微炒

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓下芒硝

末一錢攪令和勻不計時候溫服

檳榔散

出聖惠方

治傷寒九日心中滿悶腹脹喘急

檳榔

訶梨勒皮

陳橘皮

湯浸去白穢焙

甘草

炙微赤剉各半

兩

桑根白皮

三分剉

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分葱白一莖

煎至五分去滓不計時候溫服

半夏散

治傷寒九日不解往來寒熱狀如瘟疫胃膈

滿悶時有痰逆不止

半夏

湯浸七遍去滑

柴胡

去苗各二兩

葛根

剉

白朮

人參

去蘆

頭

陳橘皮

湯洗去白穢焙

黃芩

厚朴

去麁皮塗生姜汁炙令香熟

甘

草

炙微赤剉各一兩

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候溫服

芒硝散 治傷寒九日不解胃脇滿逆日晚即潮熱此

由失下內實故也

川芒硝

二兩

前胡

一兩去蘆頭

枇杷葉

半兩去毛炙微黃

葛根

一兩

判

川大黃

二兩判碎微炒

半夏

一兩湯浸七遍去滑

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候溫服以利為度

大前胡湯 治傷寒八九日不解心腹堅滿身體疼痛

內外有熱煩嘔不安

半夏

半升洗

生薑

五兩

枳實

八片炙

前胡

半升

黃芩

三兩

乾棗

十二枚芍藥

四兩

右切以水一斗煮取三升分四服日三夜一服忌羊
肉飴等物張仲景用柴胡不用前胡本云加大黃
二兩不知大黃恐不名大柴胡湯

石膏湯 治傷寒病已八九日三焦熱其脈滑數昏憤
身體壯熱沉重拘攣或呼呻而已內攻體猶沉重拘
攣由表未解今直用解毒湯則攣急不瘥直用汗藥
則毒因加劇而方無表裏療者意思以三黃湯以救
其內有所增加有解其外是故名石膏

石膏 黃連 黃蘗 黃芩 香豉 梔子

各三兩

一升綿裹

十枚 麻黃 三兩

去節

右切以水一斗煮取三升分為三服一日併服出汗
初服一劑小汗其後更合一劑分兩日服常令微
汗出拘攣煩憤即差得數行利心開令諸毒折也
忌猪肉冷水

桂附湯 治傷寒八九日風濕相搏身體疼痛煩不能
自轉側不嘔不渴脈浮虛而濇者此主之若其人大

便小便自利者去桂加白朮湯主之

一名桂附散屬太陽方見本訓

中風

類

朮附湯 治傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自

轉側不嘔不渴脈浮虛而澀者桂枝附子湯主之若

其人大便自利者此主之

屬太陽

白朮

二兩

甘草

一兩炙

附子

一個半炮去皮

右剉如麻豆大每服五錢生薑五片大棗一枚水一

盞半煎至七分去滓溫服一服覺身痺半日許再

服三服都盡其人如胃壯忽快也即是附子與朮
並走皮中逐水氣未得除故使之耳法當加桂一
兩其大便堅小便自利故不加桂也

療傷寒八九日至十日餘大煩渴熱盛而三焦有瘡墜
者多下或張口吐舌呵欠目爛口鼻生瘡譫語不識
人除熱毒止利以龍骨半斤碎以水一斗煮取四升
沈之井底令冷服五合漸進之隨意飲尤宜老少
治傷寒八九日間發熱如狂不解小腹滿痛有瘀血

桃仁

三十个去皮尖
麤炒赤色别石

蜜虫

三十枚
去翅

水蛭

二十枚
各炒

川

大黃

一兩

右為末再與桃仁同搗令勻煉蜜丸如小豆大每服

二十九桃仁湯下旋下瘀血惡物便愈未利再服

傷寒可汗

附論

夫傷寒病汗之而愈者以初得病一日至三日陽經受邪未傳諸陰其邪在表故當發汗此大約也然病數日脉浮太陽症不罷者亦可汗之當以脉症為準凡頭疼

發熱惡風憎寒是為可汗之症其脈浮者是為可汗之脈陽虛則惡寒脈浮為在表或浮而弱或浮而緊或浮大而數皆宜汗之衄家脈雖得之不可汗故內經曰其在脾者汗而發之若變汗發陽明與太陽合病有惡寒症屬表可汗用升麻湯又太陽陽明合病胃滿而喘麻黃湯陽明本多汗若脈浮無汗而喘可發汗亦用麻黃湯又陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可與桂枝湯又陽明煩熱汗出如瘧或日晡發潮熱而脈浮虛

者並與桂枝湯若脈實者當用承氣湯太陰腹滿脈浮桂枝湯凡太陽症有用五積散者非謂發汗蓋去積耳少陰初得病脈沉反熱者溫之而微取其汗用麻黃細辛附子湯下利手足冷而身熱者非屬通脈四逆湯又少陰病二三日常見少陰而無陽熱中滿之症者用麻黃附子甘草湯微汗之二藥皆陰症傷寒解表之劑陰症初病便屬少陰不待傳次

方

葱豉湯 治傷寒初覺一二日頭項腰脊痛惡寒

葱白

十二莖

豉

半合炒

乾薑

炮製一分

麻黃

去根節

桂

去皮

芍

藥

各半兩

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服良久

投葱豉熟粥蓋覆出汗

葱粥方 治傷寒服葱豉湯後未得汗再服

葱白

十一莖

豉

三合炒

生薑

半兩拍碎

右用水五盞入前三味煎至二盞半去滓入白米依

常法煮粥入少鹽攪勻任意食之衣蓋出汗未汗

再服

葛根湯 治傷寒服葱豉湯不得汗可服

葱白

十四根

豉

一升綿裹

葛根

三兩切

右咬咀以水五升煮取二升分為再服溫服取汗不

出更服余時用此一服輒汗畧不再服救數十人

甚效

麻黃葛根湯 治傷寒初得一二日出汗