

醫統元脈全書



金匱要畧方論卷中

漢

張仲景述

晉

王叔和集

宋尙書司封郎中充秘閣校理臣林億等詮次

五臟風寒積聚病脉證治第十一

論二首
十七條

脉證
方二

首

肺中風者口燥而喘身運而重冒而腫脹 肺中寒吐

濁涕 肺死藏浮之虛按之弱如葱葉下無根者死

肝中風者頭目暈兩脇痛行常偃令人嗜甘 肝中寒

者兩臂不舉舌本燥喜太息胸中痛不得轉側食則吐

而汗出也

脉經千金云時盜汗欬食已吐其汁

肝死藏浮之弱按之如

索不來或曲如蛇行者死

肝着其人常欲蹈其胸上

先未苦時但欲飲熱旋覆花湯主之

臣億等校者本旋復花湯皆同

心中風者翕翕發熱不能起心中飢食卽嘔吐 心中

寒者其人若病心如噉蒜狀劇者心痛徹背背痛徹心

譬如蠱注其脉浮者自吐乃愈 心傷者其人勞倦卽

頭面赤而下重心中痛而自煩發熱當臍跳其脉弦此

爲心藏傷所致也 心死藏浮之實如丸豆按之益躁

疾者死 邪哭使魂魄不安者血氣少也血氣少者屬

於心心氣虛者其人則畏合目欲眠夢遠行而精神離散魂魄妄行陰氣衰者爲癰陽氣衰者爲狂

脾中風者翕翕發熱形如醉人腹中煩重皮目瞤瞤而

短氣 脾死藏浮之大堅按之如覆盂潔潔狀如搖者

死

臣億等計五藏各有中風中寒今脾只載中風腎中風中寒俱不載者以古文簡亂極多去古既遠無文

可以補綴也

趺陽脉浮而濇浮則胃氣强濇則小便數浮濇相搏大便則堅其脾爲約麻子圓主之

麻子仁丸方

麻子仁二升

芍藥半斤

枳實一斤

大黃一斤

厚朴一尺

杏仁一升

右六味末之煉蜜和丸梧子大飲服十丸日三以知爲度

腎著之病其人身體重腰中冷如坐水中形如水狀反不渴小便自利飲食如故病屬下焦身勞汗出衣裏冷濕久久得之腰以下冷痛腹重如帶五千錢甘薑苓朮湯主之

甘草乾姜茯苓白朮湯方

甘草

白朮

各二兩

乾姜

茯苓

各四兩

右四味以水五升煮取三升分溫三服腰中即溫

腎死藏浮之堅按之亂如轉丸益下入尺中者死

問曰三焦竭部上焦竭善噫何謂也師曰上焦受中焦

氣未和不能消穀故能噫耳下焦竭即遺溺失便其氣

不和不能自禁制不須治久則愈

師曰熱在上焦者因欬爲肺痿熱在中焦者則爲堅熱

在下焦者則尿血亦令淋秘不通大腸有寒者多驚澹

有熱者便腸垢小腸有寒者其人下重便血有熱者必痔

問曰病有積有聚有繫氣何謂也師曰積者藏病也終不移聚者府病也發作有時展轉痛移爲可治繫氣者脇下痛按之則愈復發爲繫氣諸積大法脉來細而附骨者乃積也寸口積在胸中微出寸口積在喉中關上積在臍傍上關上積在心下微下關積在少腹尺中積在氣衝脉出左積在左脉出右積在右脉兩出積在中央各以其部處之

痰飲欬嗽病脉證并治第十二

論一首
十一條

脉證二
方十九

首

問曰夫飲有四何謂也師曰有痰飲有懸飲有溢飲有
支飲 問曰四飲何以爲異師曰其人素盛今瘦水走
腸間漑漑有聲謂之痰飲飲後水流在脇下欬唾引痛
謂之懸飲飲水流行歸於四肢當汗出而不汗出身體
疼重謂之溢飲欬逆倚息氣短不得卧其形如腫謂之
支飲 水在心心下堅築短氣惡水不欲飲 水在肺
吐涎沫欲飲水 水在脾少氣身重 水在肝脇下支

滿噫而痛 水在腎心下悸 夫心下有留飲其人背

寒冷如掌大 留飲者脇下痛引缺盆欬則輒已一作

甚轉胸中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛脉沉者

有留飲 膈上病痰滿喘欬吐發則寒熱背痛腰疼目

泣自出其人振振身瞤劇必有伏飲 夫病人飲水多

必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣

脈雙弦者寒也皆大下後裏虛脉偏弦者飲也 肺飲

不弦但苦喘短氣 支飲亦喘而不能臥加短氣其脉

平也 病痰飲者當以溫藥和之

心下有痰飲胸脇支滿目眩苓桂朮甘湯主之

茯苓桂枝白朮甘草方

茯苓

四兩

桂枝

白朮

各三兩

甘草

二兩

右四味以水六升煮取三升分溫三服小便則利

夫短氣有微飲當從小便去之苓桂朮甘湯主之

方見

腎氣丸亦主之

方見婦人雜病中

病者脉伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此爲留飲欲去故也甘遂半夏湯主之

甘遂半夏湯方

甘遂

大者三枚

半夏

十二枚以水一升煮取半升去滓

芍藥

五枚

甘草

如指大一枚炙一本作无

右四味以水二升煮取半升去滓以蜜半升和藥汁

煎取八合頓服之

脉浮而細滑傷飲

脉弦數有寒飲冬夏難治

脉沉

而弦者懸飲內痛

病懸飲者十棗湯主之

十棗湯方

芫花

熬

甘遂

大戟

各等分

右三味搗篩以水一升五合先煮肥大棗十枚取八合去滓內藥末強人服一錢七贏人服半錢平旦溫服之不下者明日更加半錢得快之後糜粥自養病溢飲者當發其汗大青龍湯主之小青龍湯亦主

之

大青龍湯方

麻黃

六兩
去節

桂枝

二兩
去皮

甘草

二兩
炙

杏仁

四十箇
去皮尖

生姜

三兩

大棗

十二枚

石膏

如雞子
大碎

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥
煮取三升去滓溫服一升取微似汗汗多者溫粉粉
之

小青龍湯方

麻黃去節 三兩

芍藥三兩

五味子半升

乾姜三兩

甘草炙 三兩

細辛三兩

桂枝三兩 去皮

半夏半升 湯洗

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥
煮取三升去滓溫服一升

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脉沉緊得之數十日醫吐下之不愈木防己湯主之虛者即愈實者三日復發復與不愈者宜木防己湯去石膏加茯苓芒硝湯主之

木防己湯方

木防己

三兩

石膏

十二枚
雞子大

桂枝

二兩

人參

四兩

右四味以水六升煮取二升分溫再服

木防己加茯苓芒硝湯方

木防己

桂枝

各二兩

人參

芒硝

三合

茯苓

各四兩

右五味以水六升煮取二升去滓內芒硝再微煎分

溫再服微利則愈

心下有支飲其人苦冒眩澤瀉湯主之

澤瀉湯方

澤瀉

五兩

白朮

二兩

右二味以水二升煮取一升分溫再服

支飲胸滿者厚朴大黃湯主之

厚朴大黃湯方

厚朴 一尺

大黃 六兩

枳實 四枚

右三味以水五升煮取二升分溫再服

支飲不得息葶藶大棗瀉肺湯主之

方見肺癰中

嘔家本渴渴者爲欲解今反不渴心下有支飲故也小

半夏湯主之

千金云小半夏加茯苓湯

小半夏湯方

半夏 一升

生姜 半斤

右二味以水七升煮取一升半分溫再服

全圖要略 卷中
腹滿口舌乾燥此腸間有水氣已椒歷黃圓主之

防已椒目葶藶大黃圓方

防已

椒目

葶藶
熬

大黃
各一兩

右四味末之蜜丸如梧子大先食飲服一九日三服
稍增口中有津液渴者加芒硝半兩

卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者半夏加茯苓湯主之

小半夏加茯苓湯方

半夏
一升

生姜
半斤

茯苓
三兩一法四兩