

寒溫條辨

卷五

傷寒溫病條辨卷五

醫方目錄

吳茱萸湯

小建中湯

附黃耆建中湯

當歸四逆湯

附加吳茱萸生薑湯

乾薑附子湯

桂枝新加湯

黃連阿膠湯

桂枝去芍藥加

蜀漆龍骨牡蠣

救逆湯

附桂枝甘草龍骨牡蠣湯

加味溫膽湯

竹葉石膏湯

附人參竹葉湯

疏表湯

桂枝附子湯

附去桂加朮湯

人參固本湯

當歸六黃湯

黃耆湯

柴胡桂枝乾薑湯

厚樸生薑甘草半夏人參湯

大陷胸湯

附大陷胸丸

小陷胸湯

小半夏加茯苓湯

附小半夏生薑湯

枳實理中丸

海蛤散

枳殼桔梗湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

半夏瀉心湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

桂枝人參湯

旋覆花代赭石湯

桂枝加芍藥湯附桂枝加大黃湯黃連湯

柴胡加桂枝湯

柴胡養榮湯附柴胡清燥湯

五福飲附七福飲

四君子湯附香砂六君子湯

四物湯附八珍湯十全大補湯

二陳湯

犀角大青湯

大建中湯

麻黃芍藥人參湯

四逆湯

桂苓甘朮湯

甘草桔梗湯

黃芩加半夏生薑湯 乾薑黃連黃芩人參湯

麻黃杏仁甘草石膏湯 葛根黃連黃芩湯

五味子湯

蘇陳九寶湯

十棗湯

附控涎丹

茯苓甘草湯

橘皮竹茹湯

橘皮乾薑湯

丁香柿蒂散

滌痰湯

理中安蛔散

烏梅丸

麻黃升麻湯

赤石脂禹餘糧湯

桂枝去桂加

茯苓白朮湯

玉泉散

六一散

桂枝甘草湯

桂枝加附桂湯

附陽旦陰旦湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

附芍藥甘草附子湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

生地黄連湯

茯苓四逆湯

附六味回陽飲

導赤散

導赤瀉心各半湯

知母麻黃湯

黃連犀角湯

雄黃銳丸

百合地黃湯

三甲散

桂枝加附子紅花湯

黑龍丹

麻仁丸

枳實梔子豉湯

牡蠣澤瀉散

大營煎

五苓散

豬苓湯

解毒承氣湯

附陷胸承氣湯

桂枝加厚樸杏仁湯

梔子柏皮湯

麻黃連軀赤小豆湯

金沸草散

地榆散

桃花湯

桂枝加桂湯

麻黃附子甘草湯

白通加人尿豬膽汁湯

去人尿豬膽汁即白通湯

桂枝二越婢一湯

八正散

太平圓酒

升麻鼈甲湯

玉樞丹

撥正散

半夏散及湯

苦酒湯

豬膚湯

當歸導滯湯

芳香飲

三合湯

滾痰丸

文蛤散

白散

加味茵陳蒿湯

正方一百零十
附方二十

傷寒溫病條辨卷五

醫方辨

吳茱萸湯 厥陰頭痛。嘔而吐沫。少陰犯真寒。吐利。手足厥。煩燥。欲死。及寒邪入陽明。食穀欲嘔者。並此方主之。

吳茱萸揀淨生薑三錢大棗三枚人參一錢水煎溫服。

厥陰肝也。寒邪內格。故嘔而吐沫。厥陰與督脈會於巔。故頭痛。少陰腎也。腎藏中寒。則上格乎陽而為嘔吐。經云腎主二便。腎寒則大便不禁而為利下。手足

得陽氣而溫。內有真寒。故令手足厥冷。煩燥者。陰盛格陽。故令陽煩陰燥。其證多危。故曰欲死。吳茱萸。辛熱而氣厚。專司開豁胸中逆氣。經曰氣為陽。氣厚為陽中之陽。故能走下焦而溫厥陰。少陰也。臣以生薑散其寒也。佐以參棗補中虛也。

小建中湯

傷寒人三四日。心悸而煩。及少陰惡寒。腹

中急痛。此方主之。加黃耆。蜜炙三錢名黃耆建中湯。

白芍

酒炒四錢

桂枝

甘草

炙各二錢

生薑

二錢

大棗

二枚

飴糖

三錢

水煎去渣入飴糖溶化服。

醫方考曰。小建中湯。宜用肉桂。枝則味薄。故用之以解肌。桂則味厚。故用之以建中也。愚按開後人補中益氣無窮之法門

此方是也。

續論曰。桂枝湯中。白芍桂枝等分。用白芍佐桂枝以治衛氣。小建中湯中。白芍四錢。桂枝二錢。用桂枝佐白芍以治榮氣。更加飴糖以緩其脾。故名之曰建中。則其功用大有不同耳。

當歸四逆湯

手足厥寒。

陽邪陷內。四肢逆冷。脈細欲絕。陰盛陽衰。

此方主之。

當歸 白芍

桂枝 錢各二

細辛

通草

甘草

各一

錢四分

大棗

二枚

水煎溫服

加吳茱萸

錢二生薑

錢二

酒煎。名當歸四逆加吳茱萸生薑湯。治前證內

有久寒者。

手足厥寒。脈細欲絕。似乎陰證之極。蓋緣陽邪傳入

厥陰。榮分。以本虛不能作熱。故厥而脈細欲絕也。此

為陰

陰是指厥陰經也。

鬱陽邪。故用桂枝細辛以解表。白芍

甘草以瀉熱。當歸以和厥陰之榮血。通草以通太陽

之本府。使陽邪得從外解。原非治陰寒四逆之藥也。

故藥宜歸芍以濟陰。不宜薑附以劫其陰也。是證也。自表入裏。雖曰傳至厥陰。始終只是陽證。與陰寒直中三陰不同。故不用四逆湯。而用桂枝湯加當歸細辛通草耳。明者自知之。

按昔人云。人有陰血虧於陽分。不能勝辛熱者。更宜此湯主之。殊不知此惟有陽邪者宜之。若無陽邪而見此證。則是陰血大虧矣。投之禍不旋踵。蓋細辛為少陰中表藥。隨桂枝湯以解肌。加當歸以和榮血。至於通草甘淡微寒。能瀉丙丁。能通水道。為虛寒者禁。

用此湯治法本是和榮血以緩脈。使陽邪得從肌表而散。或從膀胱而泄也。若循其名。以治陰虧寒中之四逆。則謬甚矣。觀於傷寒論曰。若其人素有久寒者。宜當歸四逆湯。加茱萸生薑主之。正如四逆散。本以散傳經之熱邪。腹中痛者。方加附子。則當歸四逆湯。非治陰寒四逆之藥也。明矣。更有一等固守王道之醫。辨證不明。遇有厥逆脈細之證。不敢用四逆湯。但曰用當歸四逆湯。極為穩當。不知此湯乃桂枝湯加當歸細辛通草耳。細辛隨桂枝湯止能解表。通草又

為疏通最有力之藥。當歸一味。果足以治陰寒四逆耶。藥不對證。果可謂之穩當耶。甚矣其不明於製方之理。而以舛錯誤病也。予前所云。用方貴明其所以然者。正謂此也。

乾薑附子湯 少陰誤下復發汗。晝日煩燥。夜而安靜。不嘔不渴。無表證。脈沈微。身無大熱者。此方主之。又陰盛格陽。目赤面赤。煩渴引飲。脈來七八至。按之則散。為無根之脈。以此方加人參主之。

乾薑

二錢附子

三錢

水煎溫服。或云冷服。

此即四逆減去甘緩之甘草。為回陽重劑。若加增藥味。反牽制其雄悍之力。必致迂緩無功矣。乾薑者以潤燥散煩。和表裏之誤傷。附子熱以溫中固表。調陰陽於既濟。陽回即可用平補之藥。蓋陽既安堵。即官休養其陰。切勿過用辛熱。轉生他患也。審之慎之。

桂枝新加湯 汗後身痛。脈沈遲者。此方主之。以桂

枝湯解汗後之風邪。加參芍益不足之血脈。亦兩解表裏。安內攘外之一法。曰新加者。因發汗

新虛明非桂枝湯中之舊法也。

桂枝

錢三

白芍

錢四

甘草

錢二

人參

錢一

生薑

錢三

大棗

錢二

水煎溫服。

黃連阿膠湯

少陰病二三日以上。心中煩不得臥。

此方主之。

少陰本欲寐。今反煩不得寐者。以風邪客於裏。裏熱甚而不和也。此扶陰

散熱之良方也。並治邪火內攻。迫血下行者。用以扶陰

散熱之義。

黃連

清腸消

阿膠

祛風養腎

黃芩

疏風

白芍

利脾

錢各二

生雞子黃

逐風鎮

水煎成。

去渣。

入阿膠

烱

烱