

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷三十四



南京中醫藥大學圖書館版權所

欽定四庫全書

景岳全書

和氣

癰疽疾

經義
明五篇曰
邪入於陽利
為膏

明
張介賓 撰

邪入於陰則痺搏陽則

脈流薄疾并乃狂○陽

欽定四庫全書

景岳全書

不勝其陰則五臟氣爭九竅不通

調經論曰血并於陰氣并於陽故為驚狂

通天篇曰太陽之人多陽而少陰必謹調之無脫其陰而瀉其陽陽重脫者易狂陰陽皆脫者暴死不知人也

本神篇曰肝悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄不精肺喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存也

脉解篇曰太陽所謂甚則狂癲疾者陽盡在上而陰氣

從下下虛上實故狂癲疾也。陽明所謂病至則欲
乘高而歌棄衣而走者陰陽復爭而外并於陽故棄
衣而走也。

陽明脉解篇帝曰足陽明之脉病甚則棄衣而走登高
而歌或至不食數日踰垣上屋所上之處皆非其素
所能也病反能者何也岐伯曰四肢者諸陽之本也
陽盛則四肢實實則能登高也熱盛於身故棄衣欲
走也陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲食故

妄走也

病能論帝曰有病怒狂者此病安在岐伯曰生於陽也
陽氣者因暴折而難決故善怒也病名曰陽厥帝曰
何以知之岐伯曰陽明者常動巨陽少陽不動不動
而動大疾此其候也帝曰治之奈何曰奪其食即已
夫食入於陰長氣於陽故奪其食即已使之服以生
鐵落為飲夫生鐵落者下氣疾也

通評虛實論帝曰癰疾何如岐伯曰脉搏大滑久自已

脉小堅急死不治帝曰癰疾之脉虛實何如岐伯曰
虛則可治實則死

大奇論曰心脉滿大癰癥筋攣○肝脉小急癰癥筋攣
二陰急為癰厥

邪氣臟腑病形篇曰心脉緩甚為狂笑微瀼為癰疾
肺脉急甚為癰疾○腎脉急甚為骨癰疾

奇病論帝曰人生而有病癰疾者病名曰何安所得之
岐伯曰病名為胎病此得之在母腹中時其母有所

大驚氣上而不下精氣并居故令子發為癲疾也

寒熱病篇曰暴攣癰眩足不任身取天柱

癲狂篇曰癲疾始生先不樂頭重痛視舉目赤甚作極
已而煩心候之於顏取手太陽陽明太陰血變而止
○癲疾始作先反僵因而脊痛候之足太陽陽明太
陰手太陽血變而止○癲疾始作而引口啼呼喘悸
者候之手陽明太陽左强者攻其右右强者攻其左
血變而止○治癲疾者常與之居察其所當取之處

病至視之有過者瀉之置其血於瓠壺之中至其發
時血獨動矣不動灸窮骨二十壯窮骨者骹骨也○
骨癰疾者頤齒諸腠分肉皆滿而骨居汗出煩悵嘔
多沃沫氣下泄不治○筋癰疾者身倦攣急大刺項
大經之大杼脉嘔多沃沫氣下泄者不治○脉癰疾
者暴仆四肢之脉皆脹而縱脉滿盡刺之出血不滿
灸之挾項太陽灸帶脉於腰相去三寸諸分肉本輸
嘔多沃沫氣下泄者不治○癰疾者疾發如狂者死

不治○以上俱言癲疾

狂始生先自悲也喜忘苦怒善恐者得之憂饑治之
取手太陰陽明血變而止及取足太陰陽明○狂始
生少卧不饑自高賢也自辯智也自尊貴也善罵詈
日夜不休治之取手陽明太陽太陰舌下少陰視之
盛者皆取之不盛釋之也○狂言驚善笑好歌樂妄
行不休者得之大恐治之取手陽明太陽太陰○狂
目妄見耳妄聞善呼者少氣之所生也治之取手太

陽太陰陽明足太陰頭兩顙○狂者多食善見鬼神
善笑而不發於外者得之有所大害治之取足太陰
太陽陽明後取手太陰太陽陽明○狂而新發未應
如此者先取曲泉左右動脈及盛者見血有頃已不
已以法取之灸骨骹二十壯○以上俱言狂證

長刺節論曰病在諸陽脉且寒且熱諸分且寒且熱名
曰狂刺之虛脉視分盡熱病已止病初發歲一發不
治月一發不治月四五發名曰癲病刺諸分諸脉其

無寒者以鍼調之病已止

二十難曰重陽者狂重陰者癲脫陽者見鬼脫陰者目

盲

五十九難曰狂癲之病何以別之然狂疾之始發少卧

而不饑自高賢也自辯智也自倨貴也妄笑好歌樂

妄行不休是也○癲疾始發意不樂僵仆直視其脉

三部俱盛是也

論證 共二條

癲狂之病病本不同狂病之來狂妄以漸而經久難已
癲病之至忽然僵仆而時作時止狂病常醒多怒而
暴癲病常昏多倦而靜由此觀之則其陰陽寒熱自
有冰炭之異故難經曰重陽者狂重陰者癲義可知
也後世諸家有謂癲狂之病大概是熱此則未必然
也此其形氣脉氣自亦有據不可不辨察陰陽分而
治之

一癲即癇也觀內經所言癲證甚詳而癇則無辨即此

可知後世有癩癇風癇風癩等名所指不一則徒滋
惑亂不必然也又如別錄所載五癇曰馬癇牛癇猪
癇羊癇雞癇者即今人之謂羊癩猪癩也此不過因
其聲之相似遂立此名可見癩癇無二而諸家於癩
證之外又有癇證誠屬牽強無足憑也又千金方有
風癇驚癇食癇及陰癇陽癇之說皆所當辨并列後
條

論治 共五條

凡狂病多因於火此或以謀為失志或以思慮鬱結屈
無所伸怒無所洩以致肝胆氣逆木火合邪是誠東
方實證也此其邪乘於心則為神魂不守邪乘於胃
則為暴橫剛強故治此者當以治火為先而或痰或
氣察其甚而兼治之○若止因火邪而無脹閉熱結
者但當清火宜抽薪飲黃連解毒湯三補丸之類主
之○若水不制火而兼心腎微虛者宜硃砂安神丸
或服蠻煎二陰煎主之○若陽明火盛者宜白虎湯

玉泉散之類主之○若心脾受熱叫罵失常而微兼
閉結者宜清心湯涼膈散三黃丸當歸龍薈丸之類
主之○若因火致痰者宜清膈飲抱龍丸生鐵落飲
主之甚者宜滾痰丸○若三焦邪實熱甚者宜大承
氣湯下之○若痰飲壅閉氣道不通者必須先用吐
法并當清其飲食此治狂之要也

一癲病多由痰氣凡氣有所逆痰有所滯皆能壅閉經
絡格塞心竅故發則旋暈僵仆口眼相引目睛上視

手足搐搦腰脊強直食頃乃甦此其僂病僂已者正
由氣之僂逆僂順也故治此者當察痰察氣因其甚
者而先之至若火之有無又當審其脉證而兼為之
治也○氣滯者宜排氣飲大和中飲四磨飲或牛黃
丸蘓合丸集成潤下丸之類主之○痰盛者宜清膈
飲六安煎二陳湯橘皮半夏湯或抱龍丸硃砂滾涎
丸之類主之○兼痰兼火者宜清膈飲硃砂安神丸
丹溪潤下丸之類主之○痰逆氣滯之甚者必用吐

法吐後隨證調理之

一癰癰證無火者多若無火邪不得妄用涼藥恐傷脾氣以致變生他證且復有陰盛陽衰及氣血暴脫而絕無痰火氣逆等病者則凡四君四物八珍十全大補等湯或乾薑桂附之類皆所必用不得謂癰癰盡屬實邪而概禁補劑也若真陰大損氣不歸根而時作時止昏沉難愈者必用紫河車丸方可奏效○其有虛中挾實微兼痰火不清而病久不愈者集驗龍