

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷四十六



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

欽定四庫全書
醫部全錄
卷之六
傷寒
陽明
經
病
治
法
論
第
六
十
一
條

陽明
經
病
治
法
論
第
六
十
一
條
陽
明
經
病
治
法
論
第
六
十
一
條

明
王肯堂
撰

病
合病必自下利葛根湯

主之不一
和但唯者
葛根湯
夏湯主之
太陽與少

欽定四庫全書

謹治準繩

一

陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑

湯主之 陽明與少陽合病必下利脉滑而數者有宿

食也當下之宜大承氣湯

俱詳下利

併病二陽併病太陽出汗不徹因轉屬陽明自汗不惡

寒太陽證不罷面赤躁煩短氣者更發汗則愈 二陽

併病太陽證罷潮熱譫語者下之即愈

論詳譫語

太陽與

少陽併病項強眩冒心下鞭如結胸者刺胸膺肝膺

見論

項強

合併病

合病兩經俱病併則一經證罷而併歸於一經也太陽與陽明合病有三證其邪湊有淺深之殊故用藥有汗下和解之異治見各條三陽合病有二證其一證用白虎湯其一證無治法後人用小柴胡白虎之類蓋此二證俱有三陽之候故不可汗下二陽併病有二證表未解者汗之表已解有裏證者下之太陽與少陽併病有三證其一由誤下以致心下鞭成結胸其一項強如柔

瘕狀心下鞭如結胸刺肺俞肝俞慎勿發汗汗則譫語
不止宜刺期門其一心下鞭項強而眩者刺大椎肺俞
不宜下也

合病太陽與陽明合病胸滿而喘者不可下麻黃湯

太陽與陽明合病自下利葛根湯不下利但嘔者葛根

加半夏

或曰由太陽表未罷而陽明裏又至兩陽合病熱甚於表乘虛漸攻於裏故下也其不下利而

嘔者邪氣雖攻裏未入於胃但氣逆而嘔故加半夏以止嘔逆龐氏曰外證必頭痛腰疼肌熱目疼鼻乾也脈浮大太陽受病也長者陽明也頭腰太陽也肌目鼻陽明也

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加

半夏湯

或曰此表實裏虛熱入攻裏故自下利若無痰飲則嘔也

陽明少陽合病必下利脈長者為順脈弦者為負負者

剋賊也脈滑而數者有宿食大承氣湯

或曰陽明土少陽木其脈弦者

木乘土也不弦者不負也負者必死若滑而數者有宿食非負也故宜下

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢譫語遺尿

不可汗下若自汗者白虎湯 三陽合病脈浮大見關

上但欲眠目合則汗小柴胡白虎湯

或曰此二證俱有三陽之證此不可

汗下

併病二陽併病太陽初得時汗之不徹轉屬陽明續自
微汗不惡寒大柴胡湯 若太陽證不罷不可下可小
發汗設面色緣緣正赤陽氣怫鬱在表汗之不徹其人
煩躁短氣不知痛處宜更發汗則愈葛根湯 二陽併
病太陽證罷潮熱手足汗大便難譫語者大承氣湯太
陽少陽併病反下之成結胸心下鞭下利不止水漿不
下心煩生薑瀉心湯小陷胸湯 太陽與少陽併項強

痛或眩冒時如結胸心下痞鞭刺大椎第一間肺俞肝
俞不可汗汗則譫語不止刺期門 太陽少陽併病心
下鞭項強而眩者刺大椎肺俞慎勿下

趙愚嘗疑合病併病之難明也久矣姑釋之蓋合病
者二陽經或三經同受病病之不傳者也併病者一
陽經先受病又過一經病之傳者也且如太陽陽明
併病一證若併而未盡是傳未過尚有表證仲景所
謂太陽證不罷面色赤陽氣怫鬱在表不得越煩躁

氣短是也猶當汗之以各半湯若併之已盡是謂傳過仲景所謂太陽證罷潮熱手足汗出大便鞭而譫語者是也法當下之以承氣湯是知傳則入府不傳則不入府所以仲景論太陽陽明合病止出三證如前太陽陽明併病則言其有傳變如此也又如陽經互相合病皆自下利仲景於太陽陽明合病則主以葛根湯太陽少陽合病主以黃芩湯少陽陽明合病主以承氣湯至於太陽少陽併病其證頭項強痛眩

冒如結胸心下痞鞭當刺大椎肺俞肝俞不可汗下
太陽陽明併病已見上論但三陽合病仲景無背惡
寒語句雖別有口燥渴心煩背微惡寒者乃屬太陽
證而非三陽合病也活人言三陽合病背惡寒者非
也三陽若與三陰合病即是兩感所以三陰無合病
例也

張夫併者乃催併督併之義非吞併就之理然催併
係去聲吞併之併乃上聲史記曰始皇初併天下即

此理也夫併之理乃前病未解後病已至有逼相併之義故曰併病也經曰太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒云云如果併作一家則仲景不具兩經之證而言也其非併字明矣

又曰或云三陽合病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明似乎重出予曰各有所指不過表裏之分耳夫三陽合病在表三陽陽明病在裏事在兩途即非重出在表者宜解散以痊安在裏者非攻下則不可

然表裏證治迥各不同惟編目有似乎重出

發汗後不解

傷寒初感始以太陽故以發汗為首汗行如雨散雲收其病乃愈倘汗行不解者或表邪未盡或熱邪傳裏或邪氣乘虛內客故有汗後而不解者

發汗病不解反惡寒虛也芍藥甘草附子湯 太陽病

發熱汗不解仍發熱心下悸振振欲擗地真武湯 發

汗後身疼痛脈沉者桂枝加芍藥人參新加湯 太陽

發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢拘急難以屈伸
桂枝加附子湯 大汗出熱不去內拘急四肢疼下利
惡寒四逆湯 發汗過多冒心心下悸欲得按桂枝甘
草湯 汗後腹脹滿厚朴生薑人參湯 太陽病發汗
後大汗出胃中乾燥不得眠欲飲水者少少與之則愈
若脈浮小便不利微熱消渴者五苓散 發汗已脈浮
數煩渴五苓散 服桂枝湯脈洪大與桂枝湯如前法
若形如瘧日再發汗出必解麻黃湯 發熱汗出不解

心中痞鞭嘔吐不和大柴胡湯 服桂枝湯大汗出大
煩渴不解脈洪大白虎加人參湯 發汗後臍下悸欲
作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯 發汗後不惡寒但惡
熱蒸蒸發熱者實也調胃承氣湯 發汗後不可更行
桂枝汗出而喘無大熱者麻黃杏仁甘草湯

下後不解

去傷寒之邪不過汗吐下之三法也三法得當病勢易
衰則愈矣三法失宜病勢危惡傳變不已誠可慮也况

發汗吐下後邪氣乘虛而未散或壅窒而未盡則當量其虛實以治之先賢謂之邪氣之虛實發汗吐下之不瘥溫補針灸之適當則萬全之功可得矣若過經者以六日傳六經七日為一候若不愈十三日乃再傳經盡所以謂之過經也

傷寒五六日大下後身熱不去心中結痛未欲解也梔子豉湯下後心煩腹滿卧起不安梔子厚朴湯 陽明病下之心中懊憹而煩梔子豉湯若有燥屎者大承氣

湯 太陽病下後脈促胸滿桂枝去芍藥湯微惡寒者
去芍藥方中加附子醫以丸藥下之身熱不去微煩梔
子乾薑湯 太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脈促
者表未解喘而汗出者葛根黃連黃芩湯 服桂枝湯
或下之仍頭痛項強無汗翕翕發熱心下滿微痛小便
不利桂枝去桂加茯苓白朮湯 太陽病過經十餘日
二三下之嘔不止心中微煩大柴胡湯下之 六七日
大下後寸脈沉而遲手足厥逆下利脈不至咽喉不利

吐膿血瀉利不止為難治麻黃升麻湯

汗吐下後不解

五六日已發汗復下胸脇滿微結小便不利渴而不嘔
但頭汗出往來寒熱心煩為未解柴胡桂薑湯 太陽
汗吐下解後心下痞鞭噫氣不除者旋覆代赭石湯

太陽先發汗不解而復下之脈浮者則知病在外當須
解外桂枝湯 發汗若下之病仍不解煩躁不得眠茯
苓四逆湯 大汗若大利而厥者四逆湯 下後復發