


欽定四庫全書

子部

證治準繩卷六十三



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

證治準繩

卷之六

雜證門

胃氣

明 王肯堂 撰

胃氣乘之經云春傷於風
夏必發泄五臟傳脾土屬外因也若七

欽定四庫全書

證治準繩

一

情不平臟氣受傷屬內因也若飲食生冷傷脾屬不外
內因也大法寒者溫之熱者涼之滑者澀之溼者燥之
薛前證若生冷所傷用六君木香砂仁辛熱所傷用
二陳炒連山梔麵食所傷用六君神麴米食所傷用六
君穀蘖飲食不時而傷用四君子湯飲食過多而傷用
六君子湯飲食停滯人參養胃湯脾氣虛弱者六君升
麻柴胡脾氣虛寒六君木香炮薑肝木乘脾者六君柴
胡芍藥肝火尅脾者六君芍藥山梔中氣虛而下陷者

補中益氣湯鬱結傷脾者濟生歸脾湯腎氣虛者五味子散脾氣虛者二神丸脾腎虛者四神丸命門火衰者八味丸真陽虛敗者固真丸仍與滯下方參用 侍御沈東江之內停食腹痛作瀉以六君加木香炮薑而愈後復作傳為腎泄用四神丸而安 侍御徐南湖子室瀉屬腎經不信余言專主滲泄以致不起 一婦人年踰五十不食夜飯五更作瀉二十年矣後患痢午前用香連丸午後用二神丸各二服而痢止又以二神丸數

服而食夜飯不用而形體如故 吳江史玄年母素有
血疾殆將二紀平居泄瀉飲食少思面黃中滿夏月尤
甚治血之藥無慮數百劑未嘗少減余以為脾腎虛損
用補中益氣湯送二神丸復用十全大補湯煎送前丸
食進便實病勢頓退若泥中滿忌參朮痰痞忌熟地便
泄忌當歸皆致誤事

補遺治瀉風證則胃風湯不換金正氣散寒證則理中
湯四柱散大已寒丸暑則五苓散香薷散六和湯濕則

藿香正氣戊巳丸此大概而論至於通治則有諸方可
驗
檢隨證治療然男子婦人久瀉不止無逾固腸丸之效

香朴丸 治腸胃虛冷泄瀉注下無度脾虛氣閉不進

飲食

大厚朴

五兩

北懷香

白朮

陳皮

各三兩

訶子

赤

石脂

各一兩半

右為細末麵糊丸如梧桐子大空心米飲下五十丸

如常服暖脾胃

桂香丸 治臟腑虛為風濕寒所搏冷滑注下又禁老人虛人危篤累效

附子 肉豆蔻 炮並 白茯苓 各一兩 桂心 木香 炮白

薑 炮各半兩 丁香 二錢半

右為細末米糊丸如梧桐子大空心米飲下五十丸
豆蔻分氣飲 治臟腑虛寒泄瀉無度瘦極及婦人產後瀉洞泄危篤甚

藿香葉 草豆蔻仁炮 青橘皮各四兩 甘草 丁香

各半 烏梅五十個 肉豆蔻十箇

右㕮咀每服四錢水二盞糯米一撮煎七分去滓溫服

豆蔻丸 治臟寒泄瀉不止服諸藥不效亦可治男婦

肉豆蔻麵裹煨香

不以多少碾細入陳米白飯搗令得所丸如菜豆大空心煮粟米飲吞下百丸本家累以此藥救人有效

人參豆蔻散 治久泄不止服諸藥無效此藥屢效

人參 肉豆蔻 乾薑 厚朴 甘草 陳橘皮

各一兩 川芎 桂心 訶子 北懷香 各半兩

右為細末每服三錢水一小盞薑三片棗一枚煎至

六分服

木香散 治臟腑冷極及久冷傷脾口瘡下泄米穀不
化飲食無味肌肉瘦悴心多嗔恚婦人產後虛冷下
泄及一切水瀉冷痢

木香 破故紙炒各一兩 良薑 縮砂仁 厚朴製各七錢

半 赤芍藥 橘紅 桂心 白朮各半兩 吳茱萸湯泡

七次 胡椒各二錢半 肉豆蔻四枚 檳榔一箇

右為散每服三錢用不經水猪肝四兩許去筋膜批

為薄片重重摻藥置一鼎中入漿水一碗醋一茶脚

許蓋覆煮肝熟入鹽一錢蔥白三莖細切生薑彈子

許拍破同煮水欲盡空心為一服冷食之初服微瀉

不妨亦是逐下冷氣少時自止經年冷痢滑瀉只是

一服渴即飲粥湯忌生冷油膩物如不能食冷物即
添少漿暖服 嘉興謝醫得此方病其繁只用漿水
煮猪肝丸如梧桐子大粥飲下五十丸亦效若暴瀉
利只是一服唯熱痢熱瀉不宜服 趙府博宜人病
泄瀉不止用附子木香訶子肉豆蔻龍骨等藥及諸
丹服之皆無效召余診之肝腎脈虛弱此肝腎虛也
府博云其說見在何經余曰諸方論泄痢止是言脾
胃病不過講風冷濕毒之所侵入及飲食傷滯遇腸

虛則泄痢而不知肝腎氣虛亦能為洩痢古書所載甚明不可不辨經曰洩痢前後不止腎虛也又曰諸厥固泄皆屬於下下謂下焦肝腎之氣也門戶東要肝之氣也守司於下腎之氣也肝氣厥而上行故下焦不能禁固而泄痢腎為胃關門戶不要故倉廩不藏也若病泄利其源或出於此而專以脾胃藥治之則膠固千里矣遂用木香散數服而愈

香連丸 治痢疾并水瀉暑瀉腹痛不問赤白神效

黃連

淨二
十兩

吳茱萸

去枝梗
十兩

右先將二味用熱水拌和入磁器內置熱湯頓一日

同炒至黃連紫黃色去茱萸用連為末每末四兩入木香末一兩淡醋米飲為丸桐子大每服二三十丸滾湯下久痢中氣下陷者用補中益氣下中氣虛者用四君子下中氣虛寒者加薑桂

如金丸

好川黃連一斤分上中下三等揀開以生薑三斤先

刮下皮以皮存一處將薑搗汁如前分浸黃連一宿
先用乾壁土研細鋪鍋底又鋪厚綿紙一層上放黃
連炒燥再拌再炒如此九次方用薑皮同為細末滴
水丸

防風芍藥湯 治飧泄身熱脈弦腹痛及頭痛

防風 芍藥 炒 黃芩 炒 各
二錢

右用水煎服

滲濕湯 治寒熱所傷身重腰冷如坐水中或小便祕

澁大便溏泄此證多因坐卧濕地或陰雨所襲而致

蒼朮 白朮

炒各一兩

甘草

炒各一兩

乾薑

炮各二兩

茯苓 陳皮

一兩二錢
丁香

半兩

右每服四五錢棗水煎

茯苓湯 治濕熱泄瀉或飲食傷瀉

白朮

炒茯苓各五錢

右用水煎食前服一方有芍藥等分名白朮散

白朮芍藥湯 治脾經受濕水泄注下體重腹滿形體

倦怠不欲飲食或暴泄無數水穀不化

白朮

芍藥

各二錢

甘草

炒一錢

右水煎服

胃苓散

治夏秋之間脾胃傷冷水穀不分泄瀉不止

亦治男子

五苓散

平胃散

右和合薑棗煎空心服妙

五香散

治食魚傷泄瀉不止氣刺奔衝及婦人產前

產後腹痛血氣等疾用溫酒下產後敗血衝心用敗
蒲煎湯下安胎以糯米飲調下孕婦脾泄瀉痢煎陳
米飲調下食前

烏藥 白芷炒 枳殼 白朮炒 良薑炒 甘草 莪

朮孕者減半

右等分為細末每服二錢溫酒調下

二神丸加五味子二兩吳茱萸黃四兩名四神丸 治脾腎虛弱侵晨五更作

瀉或全不思食或食而不化大便不實神效