

瘡科類編新編

保真類編

疹科實案要

目錄

麻疹通論

麻疹流治大畧

麻疹潮熱症論

麻疹出沒傷風

麻疹汗渴飲水

麻疹出沒煩燥

麻疹出沒譫語

麻疹出沒喘嗽

麻疹喉痛失音

麻疹嘔吐腹痛

麻疹出沒泄瀉

麻疹出沒痢疾

麻疹飲食瘡毒

痘瘡後蓋痘疹

疫病發痧夾痧

麻疹出沒便血

傷寒發痧癰症

孕婦麻疹發痧

水痘症治

麻疹效方

疹科纂要

卽山馬之騏驎

孟都翟良定

麻疹通論

有罪並
備六明
之戶注

大嬰兜麻疹因與痘瘡大不相悖亦與痘疹痘疹並不相同蓋痘

宜宜親
悽用治

疹亦由胎毒乃係六腑經絡積熱發自脾肺二經或受風寒或傷

水滋燥
宋庭內

飲食時氣感觸灼動心火燔灼肺金肺主皮毛故其邪發於皮膚

明此使
致多致

之上出為緝疹遍身點點紅色甚則疊腫有小顆粒隨出隨沒

則又出俗名糠瘡又曰麩瘡其症初發熱時畧類風寒而實大異

亦與痘症相似但痘瘡白裏而出於五臟臟屬陰其病本深難出

難收故有形有漿麻疹自表而出於六腑腑屬陽其病本淺易出

易收故有形無癩然多實熱無寒又有戰慄似寒者乃熱極生陰反作寒耳切不可作寒症治之雖較痘瘡為易然倏忽變化其症急速日出初二三日以及愈後月餘虛者百日皆不可以其易而忽之經曰痘前疹後信哉

若初生嬰兒未及滿月或百日內外或未生痘瘡之先通身發出紅點如粟米壯滿月內外各為爛衣瘡百日內外未反生痘瘡之先各為癢疹蓋兜在母腹中為陰血之氣薰蒸胎已久生後忽遇陽風一通遂發此疹不治自愈

若痘瘡愈後起居不節飲食過度郊感感寒痘愈數日之後身忽累熱遍身即出紅點人小不一亦如粟朱之壯作癢愈抓愈盛如雲頭疹又名益痘疹非真疹也勿以為真疹而畏之

世類
係陽吐

之瘰注

常作瘰

採用於

發加入

上疔筋

其可如

列天列

地燥皆

黑而紅

若天行疫病大人小兒感之大便秘結熱氣流於胃中忽發紅疔開

皮膚之內有色點而無積粒如蚊蚤之迹錦文之壯者無頭且平名曰

發癩其症有陽主母陰主母之殊紙皆熱毒所致非真疹也不可與疹混

若感冒時氣頗類傷寒俗名紅眼汗病係心火燦平脉金紅點隱疹

皮膚之間發則多瘡或不仁者是有風濕之殊色紅者火也亦皆

熱毒所致其症多屬於脾壯隱隱然故名曰癩疹也非真疹也亦不

可與疹同治

痲疹症治大畧

痲疹為實熱之症屬在肺其發也多因感熱蒸痰而作浮於皮膚有小

顆粒隨出隨沒沒則又出故雖值寒天亦不可重加衣被而過放熱熱

毒人咽嚥令其聲啞痲疹不出致有變症為害不小治療之法宜滑

肺火降痰主平解散惟以發表出透為妙汗之即愈亦有可下者河忌
認作傷寒妄汗妄下汗之則增其熱為胃巽取為致血為口瘡咽痛為目赤
痛為燥煩為大小便不通下之則虛其裏為滑泄為泄下多致不救悼
之慎之改初熱時先宜發散次清利次清熱次補血蓋發散則風熱解
清利則肺金清清熱則火心瀉免致金受火剋則症自輕然麻疹屬陽
熱甚則陰分受損血多虛絕必宜滋養陰血比首尾所以當瀉心火消
清肺金散風熱滋陰血為主不可少動其氣宜通聖散中消息用之如
人參白朮半夏一切燥悍之藥皆不可用即升麻升動陽氣上冲亦不
可多用蓋麻疹標屬陰而本屬陽也苟麻疹未愈輕用溫熱燥悍之
劑多致牙齦腫爛雖氣血虛弱亦必待麻疹愈後方用補虛養血調
理脾胃之藥斯乃萬無一失不則毒氣壅遏頓生奇禍一可不慎此

治麻疹之大端也

麻疹潮熱症治

麻疹初發時畧類傷寒而迥異蓋其增寒壯熱頭痛臉赤目赤頰紅
身體疼痛此畧類也至其火熱太甚多咳嗽噴嚏鼻流清涕眼光如
水眼胞浮腫眼角生眵眼淚汪汪惡心乾嘔恒欲飲水或痰涎吐瀉不
思飲食大便急而小便澀則皆熱之所致為迥異耳然有熱一二日而
出者有發熱五六日而者老或有發熱七八日而出者皆無價未明疑似
之際但覺潮熱即宜升麻葛根湯紫菀葱白三椀同煎服或參蘇飲
去人參半夏陳皮腹痛用陳皮加砂仁煎服被蓋微表之得汗自頭
至足漸漸減去衣彼則皮膚通暢腠理開豁自無流毒而疹易出矣若
有未出亦不可再表既表之後即宜謹避風寒勿食生冷戒忌酒肉

俗名 鷄魚等一切腥葷等物如外犯風寒內傷腥冷輕則癰疔生痰咳成驚

忌此物 痛重則皮毛閉塞毒氣難出遂變紫黑而死矣

不戒

如食酒肉鱉魚鱉葷等物則毒入脾胃必至麻疹後生瘡癩疔下大

腸為泄瀉白痢等症流入小腸則小水赤溢為血痢等症俗謂白痢屬冷血痢屬熱者非也戒之戒之

麻疹未出時發熱吐瀉交作三日內出耳後頂上腰腿先出一日出三次二日再出六次見紅點活顯露形小明顯頂不長隨出隨沒三四日方收者順症也不治自愈

麻未出時發熱乾霍亂身體極熱欲出不出隱伏皮內發透不快者

險宜升麻葛根湯大寒加麻黃即出 麻未出時發熱喘促者險

宜三拗湯加煨過石膏茶葉各五虎湯治之 麻未出時發熱

面先青黑乃毒氣攻心者逆宜內托散消毒湯以解之然則必死

身體極熱隱伏不出或帶紫色不明或不突起與肉一平或一二日就

沒喘嗽利下者逆速宜解表急則用麻黃湯以發之胡蘆酒以擦之緞

則用升麻葛根湯加石膏黃芩以解之 麻疹正出時身猶大熱宜升

麻葛根湯加黃荃地骨皮治之若以手摹之疹色白起手即紅者血虛

宜養榮湯主之 正色紅者火盛宜化癍湯主之或人參白虎湯 色

紫赤乾灰燥暗大渴飲水不止乃火盛毒熾宜六一散解之或四物湯

玄地黃加紅花黃芩進之或荃麥門冬湯亦可大熱不退加柴胡昔參升

麻葛根牛蒡子玄參 色紫黑乃內外熱甚而血結者逆必須急速

解衣宜葛根湯麥門冬散生地黃散升麻葛根湯或制荃防敗毒散加

拖子仁或雙解散有痰加杏仁無汗加麻黃若其色紫黑者宜黃連

杏仁湯主之或山梔子湯化穢湯速解治之緩則不及矣 故曰初

發赤白者生紫黑者死蓋赤疹屬陽遇清冷而消白疹屬陰遇緩溫

而減故皆可生若所發黑紫者內熱甚而血結生機將絕速就前法解

治死中求活者也 麻疹已出時其疹色正而身猶大熱宜升麻葛根

湯白虎湯加牛蒡子元參 既出已過三口不能沒落乃內有虛熱

宜四物湯治之 又有失血之症加犀角汁之解 麻疹已沒落身猶

大熱宜升麻葛根湯加黃連地骨皮治之 麻疹已沒落別無他症

但餘熱不降除宜黃連解毒湯調益元散治之 麻疹收平數日

之後猶有餘熱未盡復再發熱日夜不退每夜煩燥譫譫狂亂失血

且多驚搐重出一番麻疹此前畧少此乃心血耗散餘毒熱甚先治

失血急用犀角地黄湯解毒湯一劑再用四物湯加遠志由三分且

草二分服一劑而血止若謔語狂亂驚搐再煎五苓散調服此益元散
一錢服之諸症自無凡遇此症血實者易治血虛者難治 總之麻疹
前後燒蕪不退飲食不進等症並屬血熱宜四物湯按症加減滋陰補
血渴加麥門冬犀角汁嗽加括萎杏仁痰加貝母摘紅 內多實熱宜四物
湯宜苓連 防風連翹涼其中以退其陽 凡汗出不透燒熱不退倍加
紫蘇葉苳 根白芷等藥助之當得大汗出去病如掃 蓋麻疹屬陽陰
血被其煎耗作熱故以滋補陰血為主其熱自除所謂養陰退陽也

麻疹出沒傷寒

當發表後麻疹正出之時偶遇大風大寒或內傷生冷令麻疹隱隱
於皮膚之內時有時無欲出不出如物影之搖動之謂影疹急宜升
麻葛根湯化癰湯或活血散治之其影疹不日即出如小便不通熱甚

宜四苓湯加枳子木通若不急治則皮膚閉塞毒氣壅滯或一片白
一片紅一二片紫喘滿腹脹腹痛反覆變亂危亡立至 如出一日而
沒乃為風寒所襲忽然沒落急宜消毒飲治之若不急治毒氣內
攻癢爛而死 既見三日退後若有被風之症亦宜消毒飲神效
麻疹退後不可當風苟見風太早一腫即消必體瘦肌黃恐防疔
致生麻疹瘡如有麻疹瘡宜大連翹飲加牛蒡子防風金銀花爛瘡
敷生肌散

麻疹 汗渴飲水

麻疹得汗為妙固不可無汗亦不可遇於汗過初熱時未曾用藥發表自
然多汗遍身流出如水此則腠理開泄內毒盡從汗出順症也不必再用
發表外不可驟止如汗出太多不止乃毒盛致液妄行宜用五倍子三錢

為末嚙津調為餅敷貼臍其汗即止 疢疹之症猶如傷寒熱病
未有不作 渴者傷寒發渴得水而生痲疹發渴亦可飲水但不可過
多如痲疹渴時只宜常服葱白湯或以穀麋糠用滾水淋候溫飲
之稍涼亦可使毛敷中常有微汗潤澤其疹自出自無發搐之症或
以烏梅一兩煎水二鍾入芥水中浸涼每用一盞挽涼水一盞徐徐
飲之如熱不退渴不止宜服化痲湯數劑亦不妨渴止熱減佳服或
人參白虎湯其渴即止大熱不退作渴人參白虎湯主之不可飲水
過多過熱生水瀉之病蓋熱極而渴者心也水既入心傳於脾為吐嘔
瀉痢脾傷水五苓散主之傳於脾肺為喘為癰肺傷水清肺飲加白
五朮少許 主之傳於腎為小便不利為陰囊浮腫傳於肝為脅痛為
筋軟為膨脹肝與腎傷水亦用五苓散加水通車前子以泄膀胱之

水則肝腎之病除矣

麻疹 出沒煩燥

出末煩燥 宜升麻葛根湯加紫蘇葱白一撮 已出煩燥宜黃連解毒湯加白虎湯 沒落煩燥宜黃連解毒湯加麥門冬地骨皮

麻疹 出沒譫語

初出實熱 火盛譫語 宜升麻葛根湯加調辰砂益元散 已出

譫語宜黃連解毒湯調辰砂益元散 譫語熱甚昏昧不省人事

宜黃連解毒湯 沒落譫語者凶宜燈心湯調辰砂益元散

麻疹 出沒喘嗽

未出咳嗽 宜升麻葛根湯加麻黃 若發熱咳嗽三五日不出

者以胡荽酒擦之或炒胡荽子以薄綿包裹乘熱擦身上亦即

中笑一已出咳嗽宜涼膈散加桔梗地骨皮若已出三四日之間發
熱咳嗽聲音不出乃火毒在肺與胃中急用涼水調兜茶散數次火退
聲音即出再服清金降火湯自愈心 若咳嗽吐痰不出發散後宜括萎
仁黃連極實甘草煎服之 沒落咳嗽宜涼膈散加桔梗地骨皮五倍
子 總之麻疹前後咳嗽皆係痧毒不可輕視宜服參蘇飲瀉白散
或防風通聖故皆可選用若久咳嗽或疹後風或令咽喉出血急宜服
麥門冬清肺飲若不急治傷乃如胃胸膈腹脹喘急滿悶唇面青白
紅紫枯黯顏色不正口鼻出血則難治矣故麻疹退後須謹避風寒
慎戒水濕忌食鷄魚鵝鴨不則終身咳嗽患風瘡傷眼目無着愈已
切宜戒之

麻疹喉痛失音

分作痛
症之

刺恐
候爭

本抵疹
其本也

麻疹咽喉腫痛宜桔梗甘湯加元參痛甚再加射干鼠栝子或桔梗

湯或以冷水磨山查之根服之 麻疹舌啞無音宜桔梗湯加荆芥防

風元參或兜茶散或以冷水訶子服之 麻疹沒後聲啞不出宜清金

降火湯 若沒落八九日舌啞無音宜而化余散服之即愈

麻疹嘔吐腹痛

麻疹嘔吐五苓散去桂加化癍湯主之夏月五苓散去桂加紫蘇香

附熱盛腹痛煎去桂五苓散調益元散或水磨山查子服之

麻疹出沒泄瀉

初出未出泄瀉宜升麻葛根湯加五苓散去桂 若夏月更將回苓散

煎湯調益元散服之 西苓散即五 已出泄瀉宜黃連解毒湯加五苓

散去桂或人參白虎湯最妙 沒落泄瀉宜黃連解毒湯加道赤散