

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百十



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷一百一

新傷

續筋附論

跌打損傷

跌打損傷論曰九肢體為物所傷致筋斷絕不相續須

養之

問答

補骨脂散
愈方
治傷骨損

周王朱楠撰

脘肭臍

酒炙

熟乾地黄

焙

芸薹子

研

桑根白

皮剉

沒藥

研

當歸

剉炒各一兩

桂

去麋皮半兩

右為散每服二錢溫酒下不拘時

桂附散

出聖惠方

治骨折筋斷傷損

桂

去粗皮

附子

炮裂去皮臍

白殭

微炙

蒲黃

根

剉

古銅

醋淬剉末

當歸

剉炒各一兩

右為散不拘時候以溫酒調下二錢

益母草煎

出聖惠方

治被傷折筋

益母草

汁二升

生地黄

汁半升

白蜜

生用二兩

右和勻以綿絹濾去滓入銀石器中慢火煎不住手攪候如稀飴以磁合盛每服一匙用溫酒化下不拘時

蟹髓方

出十便良方

治被傷筋絕

以蟹髓取甲中并足中者不拘多少畧熬內筋斷處帛繫縛即更搗葛根汁飲之一方生搗蟹炒啗良

治救急續斷筋法

以旋覆草根洗淨土搗量瘡大小傳之日一二易以
瘡為度

治被傷筋絕

出聖濟
總錄

用葛根汁飲之葛白屑熬令黃傳瘡止血

小香膠散

出鮑
氏方

治斷筋

用白膠香末傳之

治踈折續筋骨

出本
草

以牡鼠搗傳之三日一易

治療筋骨斷碎疼痛瘀血

出草部

用栗子生嚼塗瘡上

治續筋骨長肉止痛

出草部

以柳葉煎膏塗之

治被破筋斷者

以旋覆花根搗汁漚瘡中仍用滓封瘡上十日五易
即斷筋便續此方出蘇景仲家獠奴用旋覆花上等
田野人呼為金錢花葉如柳莖細六月開花如小錢

大又有近水生似紅藍

治折傷續筋骨除風癢

用接骨木煎湯浴之

接骨木高三丈許花葉都似陸英水芹輩故一名蒟藿其木輕

虛無心斫枝上便生人家亦用之

治傷折跌筋骨生肌破血止痛

用折傷木

味甘鹹平

以酒水濃煎汁飲之

折傷木生資州資山谷藤生繞

木生葉似茵草葉有尖圓八月九月採

傷損止痛生肌附論

凡肢節為物所傷皮肉破裂久而疼痛不止肌肉不生者以寒冷搏之榮衛不溫津液不養故也

方

黃耆散

出聖惠方

治傷折氣血凝滯瘡口不合肌肉不生

黃耆

剉

赤芍藥

熟乾地黄

切焙

當歸

切焙

桂

去粗皮各一兩

乾薑

一分炮

木通

剉

續斷

剉各半兩

附

子

一枚去臍炮裂

右為散每服二錢溫酒調下不拘時服

黃耆膏

出聖濟
總錄

治一切損傷止痛生肌

黃耆

剉

當歸

焙切

附子

炮裂去
皮臍

白芷

芎藭

續斷

細辛

去苗
葉

薤白

細切各
一兩

豬脂

切一
觔

右除豬脂外搗碎以酒半升拌一宿焙乾次日先煎

脂沸下諸藥候色變去滓以盒盛之不拘多少塗所

傷處

尋痛丸

出危
氏方

止痛清心行氣和血如神

草烏

去皮尖
生用

乳香

火
熨

沒藥

火
熨

五靈脂

各三
兩

生麝香少許

右為末酒糊丸如指頭大硃砂五錢研為衣每服一圓薄荷生薑研汁磨化止痛

黑神散

出聖惠方

乾瘡止痛生肌長肉

亂髮

二團如雞子大燒烟盡

露蜂房

三分燒煙盡

膩粉一分

突厥白

三分為末

臘月豬脂

一兩

右研細用豬脂和勻以柳木篦子塗於瘡上

長肉散

出聖惠方

治從高墜損有瘡口止痛乾瘡

黃連去鬚

檳榔

木香

蜜陀僧

細研各一兩

麒麟

竭兩半

右為末於瘡口撲之

紫檀香傳方

出聖惠方

治傷折肉破瘡口不合止痛生肌

紫檀香

剉

山芋

鉛丹

研各二兩

馬齒莧

十兩細切暴乾

右除鉛丹外為末再和研勻每用隨瘡大小傳之一

方有紫藤香

檳榔散

出聖惠方

治傷損瘡口不合止痛生肌

檳榔生剉 黃連去鬚 木香各一兩 龍骨煨過半兩一方無

右為散隨瘡大小敷之

麒麟竭出聖惠方 治傷損皮破成瘡肌肉不生疼痛

麒麟竭一兩 生人牙齒火煨過 蜜陀僧煨過半兩

右為細散隨瘡口大小傅之

止血散出聖惠方 乾瘡止痛生肌長肉及金瘡

麒麟竭三兩為末炒令紫色 雞子十枚取白和風化石灰為三團入炭火內燒令

紅色取出於地 風化石灰三十兩研細用小便浸上出火毒一宿 三夜後濾出曬

乾為末

右為極細末旋旋糝於瘡上

又方

出聖惠方

石灰

三兩

鹽

銅青

各一兩半

右搗細入砂餅內以泥固濟瓶四畔候乾以十觔炭火煨半日取出埋地內三日出火毒後為末敷瘡上生肌肉乾瘡口

療墮損骨肉苦痛不可忍

以故馬羶兩段其羶須故臠者於鍋中以酒五六觔
著一抄鹽煮令熱即納羶於當中看羶熱使用裹所
損處冷即易之勿令久熱傷肉如是三五遍痛定即
止仍服止痛藥即漸瘥

止血生肌方

用菰菜搗汁人及禽獸有傷折敷之良立愈

打撲傷損

附論

凡打撲損傷或為他物所擊或乘高墜下致傷手足腰

背等處輕者氣血凝滯隨處疼痛重則聚為焮腫痛甚不可忍當察其內外輕重以治之折傷者謂其有所傷於身體者也或為刀斧所刃或墜墮地打撲身體皆能使出血不止又恐瘀血停積于臟腑結而不散去之不止恐有入破攻心之患治療之法須外用敷貼之藥散其血止其痛內則用花藥石散之類化利其血然後徐徐調理生肌或因折傷而停鬱其氣又當順之

方

紫金皮丸

紫金皮醋炒

劉寄奴

川當歸煨鹽水炒

香白芷醋炒

加減

赤芍藥

白芍藥

米泔炒加減

黑牽牛 生地

黃鹽煨浸炒

川芎米水浸

川牛膝茶炒水

乳香可加減

沒藥

可加減

破故紙

錯炒

木通去節

木香

茶炒水

自然銅

骨不碎折不用臨好時用

藿香

木賊

官桂

可加

減

羌活

獨活

半夏

五錢水炒無痰不用

骨碎補

草烏

醋炒孕婦不用

川烏

火煨孕婦則不用各一兩

金刃傷剉出臼者去自然銅骨碎補折者用之然須於此方內且去自然銅臨欲好時却入用之服成他疾右先擇出自然銅官桂沒藥乳香不炒者其餘藥或炒或火焙或日晒乾皆可然後入不炒四味同研為末用蜜糊丸如彈子大以黃丹為衣或被擗撲損傷金刃箭鏃不問輕重每服一九如被金刃傷斷損內重者以薄荷湯或木瓜薑燈心諸湯吞下若擗碎用自然銅其他傷不用用之恐生他疾如骨折損賴