

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百九十三



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院恩糧臣朱天錫

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷三百九十三

周王朱橚撰

嬰孩疳積腹滿門

宿食不消

附論

夫小兒腸胃嫩弱飲食易傷若將養失宜乳哺不節致脾胃不能傳化水穀之氣故令乳食宿夕停滯不消其

候腹滿壯熱眠寢不安甚三部脉俱沉滑者乳不消

也經云以胃氣為根本而以飲食為命脾為中州乃

土也胃受土之氣滋味萬物玄機曰食入胃而脾為磨
化布五味以養五臟營養百骸潤澤四肢固其根本也
巢氏曰胃氣調和則乳哺消化脾胃虛冷則宿食不消
楊氏曰驚惕不食者心為脾母火能生土當用心藥入
脾胃藥中母能令子實古人進食方用益智等者此也
小兒宿食不消身體發熱或發吐瀉宜用水精丹利
之却下補藥調理如身上熱不退瀉不止仍發渴心躁
宜進玉珍散二三服如更不退須進銀澁散三服却將

調胃氣藥相間服若只瀉清水宜用白龍丸一二服錢氏論食不消脾胃冷故不能消化當補脾益黃散主之

方

金箔丸治小兒驚風妳食不化或外受風傷冷毒瀉血

一切諸疾悉治之

金箔

四十片

硃砂

水銀

牛黃

青黛

各研

白殭蠶

微炒 蟬殼

麻黃

白附子

天麻

麝香

研

犀角

末

乾蠍

天南星

一錢

右修事畢入乳鉢內研令勻細用生蜜和為錠子以油單子裏每服二九桐子大薄荷湯化下傷寒用生薑薄荷湯化下小兒諸疾無不效

胡黃連九治小兒驚疳化涎消食

胡黃連 牛黃 硃砂 麝香少許 蘆薈 青黛

鈎藤 管仲 膩粉少許 鶴虱各等分

右為末麪糊為丸如粟米大每服三九至五九如有驚食只取下食如無不動

牛黃鼈甲丸治少小癖食壯熱食不消化中惡忤氣並

宜治之

方見本門

代赭丸治小兒驚熱腹脹宿食不消積年瘦弱

代赭石

一兩

丹砂

別研

麝香

別研

犀角

一分

大黃

牛黃

各三

分當歸

鼈甲

巴豆

別研

枳殼

各半兩

右搗羅九味為散入巴豆再研勻煉蜜和搗一二百

杵丸如麻子大二三歲兒空腹熟水下四五歲已上

量大小加之

丁香丸治小兒宿食不消心腹虛脹

丁香

朮香

乳香

研細

雄黃

研細

青橘皮

各一分

肉豆蔻

去殼

檳榔

各二兩

巴豆霜

半分

硫黃

錢一

硃砂

兩半

右為末研令勻煉蜜和丸如黍米大每服以粥飲下

三丸量兒大小加減服之

九味當歸湯療小兒宿食不消發熱

當歸

甘草

芍藥

人參

桂心

黃芩

乾

薑

各一分

大棗

五枚

大黃

二分

真珠丸治小兒驚熱化聚滯妳食墜涎利攻腸

真珠

研細

天竺黃

為細末

硃砂

各一分

丁頭代赭

雄黃

各半
麝香

各半

杏仁

三十粒湯浸

巴豆

十粒去皮

右為細末研令勻煉蜜為丸如菉豆大每服以生薑

湯下一丸三歲以上加減服之

快膈消食丸

又名消乳丸

縮砂仁

橘皮

荊三稜

蓬莪茂

神麴

麥

藥

已上各半兩

香附子

甘草

炙各一兩

右為末麪糊丸如麻子大食後白湯送下大小加減

一方無甘草

三稜丹調冷熱消宿食

荆三稜 神麪

木香

各一兩

乾薑

半兩

半夏

一兩生薑汁製

丁香

陳橘皮

去白桂心

各半兩

右為末煉蜜丸鷄頭大每服一粒薑湯化下

消穀丸治小兒宿食不消體熱多眠嘔噦氣上

陳麪

木香

人參

乾薑

麝香

甘草

枳

殼麩炒
微黃

右各等分搗研為末煉蜜丸如黃米大每服二十九

溫米飲下

犀角九治小兒宿食不消心腹脹滿止痰逆利胸膈進

乳食

犀角 青橘皮 荊三稜 木香各半兩 黑牽牛炒二

兩巴豆去心 皂莢三挺半錢

右六味與巴豆研勻麪糊丸如麻子大每服七丸至

十丸食後生薑橘皮湯下量兒大小加減

平胃丸治丈夫小兒食實不消胃氣不調或溫壯熱結
大小便不利者有病冷者露宿丸熱藥後當進此丸
調胃

大黃

二兩

小草

甘草

芎藭

葶藶

各一兩

芍藥

一兩

杏仁

五十箇

右為末蜜丸如桐子大每服五丸日三服一歲兒二
丸漸加之千金翼有菖蒲當歸乾薑茯苓麥門冬細

辛無杏仁為十二味

訶梨勒散治小兒宿食不消化少飲食四肢消瘦腹脇
多脹

訶梨勒皮

分三

白朮

麥蘖

炒

陳橘皮

檳榔

各半兩

甘草

分一人參半兩

右搗粗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去
滓量兒大小分減溫服日進四五服

代赭丸治小兒宿食不消壯熱腹脹

代赭

細研

當歸

炒

硃砂

細研

枳殼

麩炒

木香

各半

麝香

一兩

巴豆霜

半兩

右搗為末入研藥更研令勻煉蜜丸如麻子大每服

以粥飲下二九更量兒大小以意加減

黃芩散治少小腹大短氣進食不安穀為之不化

黃芩

大黃

甘草

麥門冬

芒硝

各二兩

石膏

一兩桂心

八銖

右切以水三升煎取一升分為三服一歲以上為五

服

麝香安中丸治小兒飲食不化寬中止吐

甘松葉

三兩

益智

香皮

香附子

各三兩

蓬茂

一兩南

木香

半兩

麝香

一錢

右除麝別研外餘藥同為末白麪糊為丸更用生熟油少許一處和劑量兒大小丸如黍米大每服二十丸至三十丸薑湯下不計時候

木香丸治小兒氣弱開胃進食

木香 人參 白茯苓 青皮 陳皮各去瓢 肉豆

寇已上各一分

右為末麪糊丸如麻子大每服十九薑湯下

七味進食丸常服能進飲食方見本門

三稜散疎脾土消食化積

三稜炮 莪術 益智仁 甘草 神麪 麥蘖

橘紅各五分

右為末白湯下

香朴散治小兒脾胃氣弱乳食遲化宿昔成積久而不
消兼和氣止瀉及腹肋刺痛起止痛不思飲食

厚朴

一兩

木香

麥蘖

陳皮

青橘皮

各一分

右為細散每服半錢湯調下

陳橘皮散治小兒宿食不消心腹脹悶亦治嘔逆惡心

背寒脚冷

陳橘皮

高良薑

人參

檳榔

各一分

白茯苓

甘草

炙各半兩