

醫學實在
三年

存仁堂

醫學實在易卷之五

閩長樂陳念祖修園著

男元犀靈石參訂

孫男

心典徽菴
心蘭芝亭

全校字

表證諸方

傷寒

桂枝湯

治傷風自汗頭痛項強發熱惡寒等證

凡傷寒論金匱千金外臺

聖濟方俱改爲小劑以復時用下飲此

桂枝 白芍

生薑

各三錢

炙甘草

二錢

大棗

四枚

水煎服。啜熱粥。覆取微汗。未汗再服。一日夜可三服。此方薑桂甘草大棗之辛甘。以補陽。芍藥大棗甘草之苦甘。以補陰。是補劑非汗劑也。妙在服後溫覆啜粥。取穀氣勝邪。以爲汗。則汗不受傷。絕無變症之患。無論四時。南北老幼。強弱皆可服之。

麻黃湯

治傷寒中風發熱惡寒頭痛身疼痛項強無汗而喘等證

麻黃

去根節 三錢

桂枝

二錢

炙草

一錢

杏仁

二十粒

水三杯先煮麻黃至二杯去沫入諸藥同煮至八分

溫服覆取微汗不啜粥未汗再服一日夜可三服

此方麻杏從表以發表桂甘從肌以達表不啜粥者恐其逗留麻黃之性發汗太過也

升麻葛根湯

錢仲陽

治陽明傷寒中風頭疼身痛發熱惡寒無汗口渴目痛鼻乾不得臥及陽明發斑欲出不出寒暄不時人多疫疾

升麻 三錢

葛根

白芍 各二錢

炙草 一錢

加薑煎

愚以此方葛根可用三四錢升麻止用一錢許如川芎白芷紫蘇黃芩石膏之類俱可加入

此方非傷寒論陽明證之正方也但就表證而論陽明以肌肉爲表與太陽不同故取葛根以清肌肉之熱爲君亦不啻彈者恐胃得補而增熱也

按陽明證內經以身熱目痛鼻乾不得臥爲提綱仲景以胃家實爲提綱前聖後聖立說不同或從宋人

用珠麻葛根湯。是宗內經經氣之傳以爲治也。但葛根非陽明正藥。以其宣肌絡。除大熱。取陽明主肌肉而蒸蒸發熱之義也。傷寒論入手有用桂枝湯。麻黃湯法。却無用葛根法。而傳爲白虎證。以及承氣證。古今之治法一轍也。

小柴胡湯

方見下

治少陽病。脇痛目眩耳聾口苦寒熱往來嘔吐等症。此方傷寒論以太陽病邪氣欲從少陽而出。取之以助樞轉也。然正少陽症亦不外此方。蓋以少陽主樞

柴胡爲轉樞之神品切勿以發汗誣之

按頭爲諸陽之會傷寒中風陽證必有頭痛經云太陽之脈其直者從巔入絡腦還出列下項循肩膊由夾脊抵腰中故太陽頭痛腦痛而連項脊也陽明之脈起於鼻絡於目交額中故陽明頭痛額痛而連面目也少陽之脈起於目銳眥上抵頭角下耳後其支者從耳後入耳中出走耳前故少陽頭痛耳前後痛上連頭角也

感冒

加味香蘇飲

治四時感冒風寒

紫蘇葉

三錢

香附

二錢

陳皮

川芎

蔓荊子

防風

秦艽

荊芥

各一錢五分

甘草

一錢

加生薑五片葱白五根水二杯半煎八分溫服覆取

微汗

如傷風自汗去葱白荊芥加大棗二枚二日夜作兩服
此方代桂枝湯麻黃湯時人喜其平穩

瘧疾

三陳湯

見下痰飲

平胃散

見傷食

小柴胡湯

治脇痛口苦耳聾咽乾頭痛在側嘔逆寒熱往來等

症

柴胡

四錢

人參

黃芩

生薑

炙草

各一錢五分

大棗

二枚

半夏

洗二錢五分

水四杯煎一杯半去滓再煎至八分溫服日夜作三

服

六君子湯

治脾虛痰盛爲溫補之良藥

人參

白朮

茯苓

半夏

各二錢

陳皮

炙甘草

各一錢

生薑三片

棗二枚水煎溫服

補中益氣湯

黃芪

二錢

人參

白朮

當歸

陳皮

甘草

各一錢

川升麻

柴胡

各三分

加薑三片棗二枚水煎

腎氣丸

見下
痰飲

瘧疫

加味香蘇飲

見上
感冒

人參敗毒散

治瘟疫及四時感冒並治噤口惡痢

人參 柴胡 前胡 羌活 獨活 川芎

茯苓 桔梗 枳殼 各一錢 甘草 八分

加生薑三片水煎服

若體壯者止用加味香蘇飲去蔓荊子加玉竹三五

錢

齊齊正氣散

治外受邪氣內停飲食頭痛發熱或霍亂吐瀉或時行瘧疾

藿香 白芷

大腹皮

紫蘇

茯苓

各一錢五分

陳皮 半夏

厚朴

桔梗

甘草

各一錢

加薑棗水煎服

白虎湯

治大熱大渴自汗之症

石膏

生研

知母

三錢

甘草

一錢

粳水服

水煎服加人參一錢五分。各人參白虎湯日夜作三服。

三承氣湯

治一切裏實之症。

大黃 芒硝

厚朴

枳實

各二錢

甘草

一錢

水煎後入芒硝。○不如三承氣擇用爲當。

防風通聖散

見中風

六味湯

見厥症

四物湯

見婦人

陰虛盜汗症。

當歸六黃湯。

治陰虛發熱盜汗。

當歸

生地

熟地

黃芩

黃連

黃柏

甘草

各一錢

炙黃芪

三錢

水煎服。

參附湯。

治腎虛不足自汗等症。

人參

一兩

附子

五錢

水煎

芪附湯。

治衛陽虛而自汗。

即前方以炙黃芪一兩易人參

米附湯

治脾陽虛而挾濕自汗

即前方以白朮一兩易人參

盜汗自汗

自汗者汗自出屬陽虛宜玉屏風散加牡蠣浮小麥之類以寔表補陽盜汗者身睡而汗出醒而汗收屬陰虛宜當歸六黃湯以補陰清火然陰陽有互根之理有陽虛而治其陰者陰虛而治其陽者不可不知又汗爲心

液宜補其心。以人參養榮湯主之。液主於腎。宜補其腎。以左右歸飲。六八味丸主之。總之汗以元氣爲樞機。若大汗身冷。必以六味回陽飲。人參加至兩許。方可挽回。傷寒誤發其汗。上焦津液乾枯。必引腎水上泛外溢。如水湧出。名曰亡陽。必以真武湯救之。蓋以此湯茯苓爲鎮水。佐附子以回陽也。

汗出不治症

汗出而喘。○汗出而脈脫。○汗出而身痛。○汗出髮潤至巔。○汗出如油。汗出如珠。○凡見此類。皆不得妄藥。

脈息

宜陰脈若漸緩者吉。忌陽脈兼短濇促結代散革者。

難治。

玉屏風散。

白朮 炒二錢

黃芪 炙二錢

防風五錢

水煎服。愚按宜以黃芪為君，可加至五七錢。

蓮棗麥豆湯 種福堂

治盜汗方。

蓮子

黑棗 各七錢

馬料薑 各一合