

欽定四庫全書

子部

外臺秘要方卷九



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

外臺秘要方卷九

欬嗽方三首

唐 王燾 撰

病源欬嗽者由肺感於寒微者成欬嗽也肺主氣合於
皮毛邪之初傷先客皮毛故肺先受之五藏與六腑為
表裏皆稟氣於肺以四時更王五藏六腑皆有欬嗽各
以其時感於寒而受病故以欬嗽形證不同五藏之欬

者乘秋則肺先受之肺欬之狀欬而喘息有音聲甚則
唾血乘夏則心先受之心欬之狀欬則心痛喉中介介
如哽甚則咽腫喉痺乘春則肝先受之肝欬之狀欬則
兩^{一作左}脅下痛甚則不可轉側兩脇下滿乘季夏則脾
先受之脾欬之狀欬則右脅下痛陰引於肩背甚則不
可以動動則欬劇乘冬則腎先受之腎欬之狀欬則腰
背相引而痛甚則欬逆此五藏之欬也五藏欬久不已
傳與六腑脾欬不已則胃受之胃欬之狀欬而嘔嘔甚

則長蟲出肝欬不已則膽受之膽欬之狀欬而嘔膽汁
肺欬不已則大腸受之大腸欬之狀欬而遺糞心欬不
已則小腸受之小腸欬之狀欬而失氣氣與欬俱出腎
欬不已則膀胱受之膀胱欬之狀欬而遺溺久欬不已
則三焦受之三焦欬之狀欬而腹滿不欲食飲此皆聚
於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也又有十種
欬一曰風欬欲語因欬言不得終是也二曰寒欬飲冷
食寒注入於胃從肺脉上氣内外合因之而欬是也三

曰支欬心下硬滿欬則引四肢痛其脉反遲是也四曰
肝欬欬而引脅下痛是也五曰心欬欬而唾血引手少
陰是也六曰脾欬欬而涎出續續不止下引少腹是也
七曰肺欬欬引頸項而唾涎沫是也八曰腎欬欬則耳
聾無所聞引腰并臍中是也九曰膽欬欬而引頭痛口
苦是也十曰厥陰欬欬而引舌本是也診其右手寸口
氣口以前脉手陽明經也其脉浮則為陽實陽實者病
苦腹滿善喘欬脉微大為肝痺欬引少腹欬嗽脉浮大

者生沈小伏匿者死又云脉浮直者生沈硬者死欬且
嘔腹脹且泄其脉弦弦欲絕者死欬脫形發熱脉小硬
急者死欬且羸瘦絡脉大硬者死欬而尿血羸瘦脉大
者死

出第十
四卷中

小品療欬嗽紫苑七味湯方

紫苑 半兩

五味子 一兩

桂心 二兩

麻黃

四兩
去節

杏仁

七十枚去皮
尖兩仁碎

乾薑 四兩

甘草

二兩
炙

右藥切以水九升煎取二升半去滓溫服七合日三

服忌海藻松菜生葱蒜麪腥膩經心錄古今錄驗同出第二卷中

延年紫苑飲主欬嗽方

紫苑

貝母

茯苓

杏仁

去皮尖兩

仁者

生薑各三兩

人參二兩

橘皮

去一兩脉

右七味切以水五升煮取一升五合去滓分溫三服

如人行七里更進一服忌葱蒜麪酢張文仲處古今錄驗同出第五

卷中

古今錄驗天門冬煎療欬嗽方

天門冬

六兩 去心

杏仁

三升 去雙仁皮尖碎

椒

三升 熬令汗出

桂心

厚朴

炙

杜仲

苦參

各三兩

附子

六兩 炮

乾薑

六兩

烏頭

二枚 炮

人參

六兩

蜈蚣

一枚 去頭足炙

右十二味別擣杏仁其餘者合擣下篩以五斤膠飴

和擣千杵服如大棗一枚日三忌冷水豬肉生葱鯉

魚

出第九卷中

五噉方四首

深師療五嗽一曰上氣嗽二曰飲嗽三曰燥嗽四曰冷嗽五曰邪嗽四滿丸方

乾薑

桂心

躑躅花

芎藭

紫苑

芫花根皮

各二分

人參

細辛

甘草

炙

半夏

洗

鬼督郵

各一分

蜈蚣

一枚去頭足炙

右十二味擣篩蜜和服如大豆五丸米飲下日三不知加之至七八丸服此丸無不差方秘不傳忌羊肉

飭生葱生菜海藻松菜

又方

特生礬石

一兩泥包
燒半日

欬冬花

一兩豉三百枚
搗千杵

巴豆

十六枚去皮心
熬別搗如脂

右四味搗篩蜜和服如大豆米飲下二丸不知稍增

至四五丸忌野豬肉蘆筍

古今錄驗療三十年
欬並出第十八卷中

備急華佗五噉丸方

皂莢

炙

乾薑

桂心

右三味等分擣篩蜜和丸如梧子服三丸酒飲俱得

日三忌葱

出第三卷中

古今錄驗四滿丸療五嗽一為氣嗽二為痺嗽三為燥嗽四為邪嗽五為冷嗽悉療之方

蜈蚣

二枚炙

芫花根

五分熬

躑躅花

四分

乾薑

芎藭

桂心

各四分

人參

細辛

各二分

右八味擣篩蜜和為丸一服米飲下五丸如大豆許

日三稍加至十九忌生葱生菜

出第十卷中

新久欬方三首

深師療新久欬唾膿血連年不差晝夜肩息麻黃湯方

麻黃

去節四兩
一方二兩

桂心 二兩

甘草 二兩

大棗

十四枚擘

右四味切以水九升煮取三升去滓分溫三服日三數用有効忌海藻菰菜生葱等物

又療新久欬嗽前胡丸方

前胡 六分

烏頭 炮二枚

桔梗

乾薑 各二分

桂心 八分

蜀椒 八分汗

右六味搗篩蜜和如櫻桃大一丸含化稍稍嚥之日

三又療久欬晝夜不得卧咽中水雞聲欲死者療之

良忌豬肉冷水生葱 並出第十卷中

千金療新久欬嗽款冬花煎方

款冬花 乾薑為末

芫花根 熟熬為末各二兩

五味子 紫苑各三兩

右五味先以水一斗煮三味取三升半去滓內芫花
乾薑末加白蜜三升合投湯中令調於銅器中微火
煎令如飴可一升半服棗核大含之日三服曾數用

甚良忌蒜麪腥膩

深師同出第
十八卷中

卒欬嗽方八首

肘後療卒欬嗽方

釜月下土

一分豉七分
熬

右二味熬擣蜜丸如梧子大米飲服十四丸曾用有

驗

又方

飴糖

六分

乾薑

六分末

豉

一兩

右三味先以水二升煮豉三兩沸去滓內飴糖消後

內乾薑末分為三服

又方

生薑汁

百部根汁

右二味合煎服二合

並出第一卷中

張文仲卒欬方

百部根 四兩

右一味酒一斗煮之再宿火溫服一升日再服之効

肘後
同

又方

溫清酒 一升 驢膏 一升

右服之亦療上氣 並出第
三卷中

備急卒欬嗽方