

急救解毒附

凡自刎自縊凍死溺死及服毒等症事關人命人多畏懼不救不知律書未載洗冤錄一卷及他書方藥原示人救治之法今悉敘載入以便檢閱有定識者依此出力救之功莫大焉善莫比焉

救縊死法

凡縊從早至夜雖僵定猶可救從夜至早稍難若心口溫者一日以上大可救治不可割斷繩索緩緩抱解將屍安放平用處頭要扶正先將手足慢慢灣曲然後將大小便用棉軟物塞緊不令泄氣令一人坐於頭前以腳踏其肩以手提其髮不可使頭下垂直合喉頸通順再用二人將細筆管入耳內不住吹氣不住手揉按胸腹摩擦臂足再一人以己口對縊人之口輕輕呼吸其氣如此一飯間即氣從口出眼開甦醒後用官桂湯方煎湯及清粥湯灌之令潤咽喉無不活者但不可先將茶水灌之活雞冠血滴入喉鼻之中男左女右男用雄雞女用母雞頃刻甦醒

又方

又方

官桂湯方

真山羊血三分研末用好紹酒三盃溫灌下立活

製半夏壹錢厚樸壹錢官桂五分乾薑五分生甘草五分廣皮五分

八分

水煎服

通關散方

北細辛五分猪牙皂五分生半夏五分麝香一分共為極細末

救溺死法

將瓦瓶收貯噓鼻如前方救治再將其兩手大拇指並排平正以小帶縛定於兩指縫中離指甲角一分半之處名鬼哭穴用陳艾揉透火灸三七壯即活凡無故中邪而縊者以多灸為要凡溺即令人撈起急將口撬開橫啣筋一隻使可出水以竹管吹其兩耳研生半夏末吹入其鼻孔皂角末置管中吹入穀道如係夏月將溺人肚皮覆牛背上兩邊使人扶住牽牛緩緩行走腹中之水自然從口中并大小便流出再用生薑湯化蘇合丸灌下或生薑汁灌之若無牛則用大鍋覆寬橙上將溺人肚臍覆對鍋底兩人擡橙搖動亦可出水如係冬月急將濕衣解去為之更換一面炒鹽用布包熨臍一面厚鋪被褥取灶內初煨草灰多多鋪於被褥之上將溺人覆臥於上以棉枕一個墊臍

下再以草灰渾身厚蓋之灰上再加被褥不可使灰暍於眼內其撬口啣筋灌蘇合丸薑湯吹耳鼻穀道等事俱照夏天法甦醒後冬天宜少飲溫熱紹酒夏天宜少飲粥湯按灰性燥而能拔水凡蠅溺水死者以灰埋之少頃卽活此明驗也

又方

用通關散頻頻吹入鼻孔內有嚏可生

又方

用好陳醋灌鼻中綿裹石灰納下竅水卽出

又法

先打壁泥一堵置地上以溺人仰臥其上更以壁土覆之止露口眼自然水氣喻入泥間其人遂甦雖身僵氣絕用此法亦可救

又法

凡溺人倘或微笑必爲急掩其口鼻如不掩則笑而不止不可救矣切不可驟令見火但一近火則必大笑凍死者亦然以酒罈一個燒紙片一把放罈內急以罈口覆臍上冷卽再燒

又方

紙片入罈覆臍去水卽活以上俱見洗冤錄集解凡墮水凍死者尚有微氣勿以火炙用布袋盛熱草灰放在心頭冷卽換待眼開以溫熱紹酒灌之

救大寒凍死

又法

又方

救中惡猝死

又方

又法

以熱炭灰盛布袋溫其心口冷即換之候目開為度再以紹酒及溫粥湯灌之漸活再用生薑三錢水煎溫服

用鹽或草薦捲之以索繫定放平坦處令二人相對推踏令滾轉往來如打鹽法候四肢溫即活

用生半夏三錢研細末吹入耳鼻內凡腦死溺死壓死腫死心頭溫者皆可治

凡凍死溺死者飲湯酒切忌太熱恐傷齒盡落

凡中惡客忤猝死者或先病及睡臥間忽然而絕或猝然撲地及

一切痰壅手足搐扯皆是用莖菜心黃於男左女右鼻內刺

入六七寸令目開血出即活或蒜頭搗汁或莖菜搗汁灌鼻亦

可此症切忌以白湯水灌之蓋湯入則痰涎永繫心絡致生他

疾

用皂角末或生半夏末如豆大各吹兩鼻中或用生半夏五錢

生薑汁一椀調灌之即愈凡產婦發狂驚悸均可治

視上唇內沿有如粟米粒形者以銀針挑破取出血即活

令人尿其面即甦此扁鵲法也

又法

燒炭一爐以陳醋撥炭上使患者鼻中得聞醋氣卽活須捉其

救驚癇

兩手勿令驚或灌醋於鼻中亦可
以醇紹酒二杯溫灌之卽醒

救夜臥驚死

勿用火照急取樛塵納鼻中或用皂角末吹兩耳取嚏再用好

又法

紹酒調蘇合丸灌之卽醒鍋底黑水灌二錢并吹鼻
於黑中痛咬其足跟及足大指頻頻輕呼其名及唾其面再

又法

灌以生薑汁湯必活
凡驚死兩足大指指向上生毛處用陳艾揉棉如黃豆大以火炙

救卒中邪魔

三七壯卽活沈充錄註
用雄黃末吹鼻中卽愈

多於道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣沖心胸不卽治殺
人搗墨水和服二錢或用菖蒲汁含之立止

救客忤中惡

凡中忤中惡鬼氣其證或暮夜登廁或出郊外驀然倒地厥冷握

拳口鼻出清血須臾不救似乎尸厥但腹不鳴心腹暖勿移動
令人圍繞燒火打鼓或燒蘇合香安息香麝香之類候醒乃漸

移動用犀角

五錢

麝香

二錢五分

硃砂

二錢五分

研極細末以開水調服

一錢即效

救服鹽瀉

用活金魚二尾搗爛以熱開水沖調徐徐灌下取吐即生如勢重危急者以活雞或活鴨兩三隻斷去頭將頸塞於口中以熱血灌下可解多有得生者

又方

以雞蛋一二十個攪散入生大黃末五錢攪勻徐徐灌下能利瀉即愈或用肥皂搗極爛清水調灌一吐即愈

又方

將常用抹桌布搓出濁水灌之使吐吐出即安但切不可用熱水洗冤錄計或用生豆腐漿灌吐自安

救煤毒暈倒

急移於風涼處用鹽菜水灌之即愈如無菜水則以現汲井水灌之或蘿葡搗汁灌口鼻效

救烟火薰死

白蘿葡搗汁灌之立醒如無則用葉乾者水泡透搗汁亦治

救男婦尸厥

凡人奄奄死去脉動無氣氣閉不通名謂尸厥將菖蒲末納入耳鼻孔中再用真猪桂末四分放舌下或剗取本人左角髮方寸燒灰研末過細篩和熱酒灌之立愈

救蠱毒及金

蠱毒

救服砒毒

先以白礬末令嘗之不瀝反覺味甘次再食黑豆又不腥乃中毒也卽濃煎石榴皮根湯飲之吐出活蟲自愈

凡服砒未久者用雞蛋一二十個打入碗中攪勻入明礬末三錢徐徐灌下吐則再灌以吐盡爲止如服砒已久不能吐者急用黑鉛一塊約重四兩用井水於石上磨出黑汁隨磨隨灌候吐盡砒毒方無後患

又方

用熱豆腐漿灌之或熱鴨血亦解

又方

用栴樹根皮內蛀末井水調服三錢神效或生甘草汁同藍靛汁和勻調服或用生棗豆五合搗粉取新汲水打和絞汁飲之亦效

救中水銀毒

以炭末屑煎汁飲卽解

救中鉛粉毒

以麻油調蜂蜜如飴糖與食卽解或用沙糖調水服或搗蘿蔔

救誤吞鐵釘

用桴炭皮半碗研末乾粥三碗卽愈

救中一切藥

飲薑清立解取胸中宿糞布包濾汁最效食穉欲取亦便統解諸毒他藥不及若症勢危急最宜飲此惡死甚於

毒及飲食毒

惡穢也

救誤吞金銀

胸膈痛甚 用羊脰骨煨末每服三錢米湯調下立從大便出

中黃金毒者食鷓鴣肉解之 中白銀毒者以黃連三錢甘草

一兩解之洗冤錄詳註或用葱白煮汁飲之或輕者用真

金從大便出輕粉即效又吞金奇方用竹刀打白驢

血一茶杯乘熱灌下其金立出不可傷驢之命

又方

將陳年大麥去芒刺炒研成粉用黃糖少許拌食一日三次每

服一盞三四日即解下只可吃飯粥不可喫湯水或飲生鴨熱

救誤食銀硝

血或多食核桃俱化日懷吞五金以腸胃漸爛延日垂死以飴糖四兩熬作丸不時用好麻油送

又方

下服完再合須服至百日外無患

服黃泥水一二碗即愈

救誤吞銅器

多食葶薺核桃自化小兒易吞銅錢此方最妙

救誤吞鐵物

用燒透櫟炭帶紅研極細末以沙糖調服二三錢立愈或多用

砂仁煎濃汁服即從大便解出吞銅非治

救誤吞針

生取蝦蟆眼一枚不通數錢煎湯整吞下針尖自穿蝦蟆眼內

又方

救誤吞竹木

屑及芒刺

救鐵針入喉

救中巴豆毒

救中雄黃毒

救誤服木鱉

子

救誤服一

笑草毒

諸草藥毒

口漱毒

救誤吞鐵骨

易簡新編

從大便出

或用鹽蛋一個其菜一把客煮不切斷食之即與錢從大便下

用牛生半熟出芽蠶豆棉極爛用葑菜汁和丸吞之自下

搶喉不下 用鐵斧於石上磨水隨卽灌之卽下或取鵝涎飲

之亦效 或用芝麻炒研末滾水調服

剝新木炭皮研末和粥多食炭屑裊針自大便下

其症口乾兩臉赤五心熱下利不止 以菜豆濃煎湯冷服卽

愈 或芭蕉葉搗汁飲之利止卽安切忌熱湯

凡雄黃硃砂見安皆毒 以漢防已煎湯飲之

發抖欲死 急以肉桂二錢煎服立愈或用香油二兩白糖二

兩和勻灌之亦治

俱飲以地漿水立愈 其法於淨土地上掘三尺深以水傾注

攪成泥水謂之地漿取半清半濁者飲之所謂洗盡腹中毒全

憑地上漿愈後永戒食鱸魚 水銀毒亦解

腸中不能轉送覺重墜者 多食青菜猪油自出

鐵腳威靈仙沙糖和水煎一口吞下去鐵見軟如棉

救中悶香蒙

汗毒

救中麵毒

救中鈎吻毒

救中藥毒鳩

毒

救中諸藥毒

救中飲食毒

救中野薑靈

芝毒

又方

救中六畜毒

飲冷水即解 臥室內夜間貯清水一盆不受此患 或甘草水黃芩水飲

飲生蘿蔔汁立解或用生蒜搗爛和醋食亦解

即野葛其葉有毛生池旁形似芹菜誤食殺人 急用薺范 八

兩水六升煮至二升分兩次溫服即解 薺范一名空沙參即即結梗也本草謂之杏參

其人雖死心胸尚溫皆可治 用萊豆粉三合并水調灌即解

或扁豆為末溫水下或葛粉水調服或用犀角磨水飲之

煩悶欲死 俱用葛根煎濃汁服無患

飲饌中毒倉卒不知何物 急以生甘草八錢薺范八錢煎湯

飲之入口即活此症覺腹中不快以生黃豆試之口嚼不聞腥

氣者是 心煩悶者苦參煮汁飲之吐出即止

心疼胸脹腸瀉腹痛欲死 急取黃泥漿灌之或橄欖搗為泥

食之或生甘草汁磨紫金錠調服即解

用淨銀花藤葉煎濃汁飲之鮮者更妙

取伏龍肝 四錢 研末水調服得吐即解

救中各肉自死毒

救中牛馬肉

毒

救中瘟牛肉毒

救中瘟馬肉毒

救中瘟猪肉毒

救中河鮑魚

毒

又方

救中鱖魚毒

救中魚鱉毒

救中仙鶴血

毒

用黃柏末一匙入肉食之即解

用生甘草一兩煎湯飲一二大碗或煎紹酒服亦可取吐或瀉

即解倘口乾決不可飲水飲之即死

早稻草煎湯服之立醒

蘆根搗汁或紹酒煎服即解並煎洗浴

猪骨燒灰調服即愈

此魚毒在肝血脂子并眼其肝人口爛舌人腹爛腸脂令舌麻

子令腹脹眼令目花昏急以糞汁灌之或飲麻油吐之即愈

梅花腦子為末水調服五倍子白礬等分為末水調服

用橄欖汁煎湯服或用槐花炒黃與乾胭脂等分水調灌之亦

效

用生蠟食即解如無服地漿水亦解切忌服荆茶

以靛汁一碗陳皮二三錢煎湯候極冷服之即解

其鶴或傍樹枝或臥叢草將頭搔痒遺有頂血毒粘在樹草間

人以手摸腳踏登時赤腫疼痛異常急以青松毛和糯米飯

救中蟹毒

同搗敷之無不立愈

救中團魚毒

以生薑汁搗飲解之或紫蘇黑豆煎服亦解或靛青汁冬瓜汁藕汁均解乾蒜煮汁服之亦解

卽驚也驚腹下隱隱有蛇皮之狀其色大紅乃毒蛇化也誤食之必腹痛欲死手足發青而亡是毒氣攻腸也急用白茯苓五錢白芷三錢雄黃三錢丹砂一錢山查一錢枳實一錢水煎

救誤食馬蝗

服痛止再服二劑毒消自解或靛青水加食鹽飲之亦解或悶或脹且痒且痛者是也 用田中泥或山中黃泥水調飲之卽痒

救蝟螫毒

取井底泥敷之乾則再換或以明礬爲末水蘸擦

救中諸魚毒

冬瓜仁或橘皮煎湯服卽解 黑豆煮汁服之亦解

救食雞蛋_絕

飲醋卽解

救食鴨蛋_絕

飲糯米泔水一盞立消

救服斑蝥毒

腹痛吐逆不止用萊豆或黑豆煎水服

救白服諸毒

蘇油和雞蛋灌之

救中酒毒

經日不醒 用黑豆一升煮汁乘溫灌三盞即醒而愈取吐

救中燒酒醉死

急用生蝶滴水灌之或取井底泥罌心胸以新汲井水浸其髮

死

再以青布浸濕貼胸膈上溫則再換仍時時以清冷水少少灌

之自醒 或用菜豆粉盪皮多食即解

又方

用鍋蓋上氣流水半盞灌下即醒

救中生鴉片毒

南瓜脂漿灌之即解 夏月南瓜籐盛時肥梗中間剪斷有脂漿

毒

流出收貯磁瓶內隨時可以救此患也或用活金魚一個搗爛

效 又阿魏一兩水開灌盡吐即愈

救中白菓毒

凡中此毒者驟然一噦即量去儼若驚狀 用白鯊頭煎湯灌之

三四次即醒或用白菓殼煎水服亦解

劣馬咬傷方

絞馬糞汁服之并以洗瘡愈

狗狗咬傷

急於無風處以冷水洗淨即服茱汁一盃隔七日又一盃四十

九日共服七盃百日內忌食酸鹹一年內忌食腥終身忌食狗

肉方得保全否則十有九死凡遇惡犬咬傷擒碎無藥急以百

之牛糞蚊蚋蜚蠊糞敷之口嚼杏仁爛敷之

壁鏡毒人方

能殺人白礬塗良

蜈蚣咬毒

醋磨生鐵敷之

蜘蛛咬亦可治

刺雞冠血塗之

或頭髮燒燭燻之

或頭髮燒燭燻之

或頭髮燒燭燻之

或頭髮燒燭燻之

或頭髮燒燭燻之

或頭髮燒燭燻之

蝎刺螫人

醋磨附子敷之

或

地上磨生薑塗之

又

雞蛋輕敲小孔合

之立止

敗

梳篦一枚分爲二

段以一段燒研末一段用水五升煮取一

活蝨入腹

升調服卽下

又治

齒齲成癰

取

飴糖一觔

漸漸食

盡便出

誤吞竹木亦可治

舊象牙梳屑磨水服之可出

誤吞銅釵

刮舊象牙梳屑和水

敷之立愈

真雄黃研末冷酒服

凡以藥汁解毒皆不可熱飲冷服乃效

生甘草五錢

以水濃煎

燉服吐痰卽愈

小麥麩一合

冷水調分兩服半日當下

解中百毒

蝟皮燒灰細研熟水調服二錢

橫紋甘草截成小段

麻油煎過常嚙久而取効

淡竹葉濃煎服之

中百藥毒

中百藥毒

中百藥毒

中百藥毒

中百藥毒

解中百毒

蝟皮燒灰細研熟水調服二錢

橫紋甘草截成小段

麻油煎過常嚙久而取効

淡竹葉濃煎服之

中百藥毒

中百藥毒

中百藥毒

中百藥毒

中百藥毒

解中百毒

蝟皮燒灰細研熟水調服二錢

橫紋甘草截成小段

麻油煎過常嚙久而取効

淡竹葉濃煎服之

中百藥毒

中百藥毒

中百藥毒

中百藥毒

中百藥毒

解中百毒

蝟皮燒灰細研熟水調服二錢

橫紋甘草截成小段

麻油煎過常嚙久而取効

淡竹葉濃煎服之

中百藥毒

中百藥毒

中百藥毒

中百藥毒

中百藥毒

中諸菜毒

誤中瓜毒

中野菌毒

中柑毒

中梨毒

中馬肉毒

中馬肝毒

中狗肉毒

中猪肉毒

中鴨肉毒

解砒石毒

誤食桐油

中瘴氣

甘草胡粉貝母等分爲末水服

服瓜皮湯良

笑者防風剉碎水煎冷灌立愈

服柑皮湯愈

服梨葉湯愈

服蘆根汁良

狗糞調酒服

杏仁三兩連皮研熱湯調溫服三盞吐出愈

猪糞不拘多少燒末水調下三服愈

糯米泔溫服一中盞愈

麻油一盞灌之或用白芷末井水服二錢或用萊豆粉一

兩銀硃一錢雞蛋白一個麻油半鍾冷水二鍾服下卽連砒吐

出

服甘草汁愈或用乾柿餅食之卽解

犀角雄黃麝香羚羊角俱可治

中邪氣

入腹升麻犀角麝干等分爲末水調服

中飛絲毒

嚼蘇葉愈

生漆惹人

成毒生椒葉煎湯洗

尸疰中惡

近死尸惡氣入腹終身不愈用阿魏三兩每用二錢拌麪包作

餛飩十餘枚煮熟食之日三服至三七日永除忌五辛油物

惡疰腹痛

不可忍者阿魏末熱酒服三錢

暗風猝倒

不省人事細辛末吹鼻中

水溺猝死

一宿者尚可活紙裹皂莢末納下部須臾出水乃活

人落水死

裹石灰納下部中水出盡卽活

墮水凍死

只有微氣者勿以火炙用布袋盛熱灰放在心頭冷卽換待眼

中挑生毒

凡喫魚肉瓜果皆可挑生初中毒覺胸腹稍痛明日漸加攪刺滿

十日則物生能動躍騰上則胸痛沉下則腹痛脇下忽腫起如

癰癰狀頃刻間人如斃以藜豆嚼試苦否甜卽是搗小升麻

爲末取冷熱水調二大盞連服之洞下瀉出生葱數莖根鬚皆