

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷四十二



北京中醫藥大學圖書館版權所有

欽定四庫全書

景岳全書卷之四

癰疽

癰疽

明張介賓撰

雖疽之變態多證而疹
凶危亦不減於疽最為
古人重疽而忽疹多不

詳及使後人無所宗法余實悵之自得羅田萬氏之刻見其理透法精鄙念斯慰今悉從其訓備述於此雖其中稍有裁訂亦不過正其疑似詳其未詳耳使此後患疹者幸獲迷津之指南亦以見萬氏之功為不少矣

名義二

疹者痘之末疾惟二經受證脾與肺也內應於手足太陰外合於皮毛肌肉是皆天地間疹戾不正之氣故曰疹也然其名目有異在蘇松曰沙子在浙江曰醋子在

江右湖廣曰麻在山陝曰膚瘡曰糠瘡曰赤瘡在北直
曰疹子名雖不同其證則一但疹在痘前者痘後必復
疹惟痘後出疹者方為結局

疹逆順三

萬氏曰疹以春夏為順秋冬為逆以其出於脾肺二經
一遇風寒勢必難出且多變證故於秋冬為不宜耳夫
天行不正之氣致為人之瘍疹然古人於痘疹二字始
終歸重於痘並不分別疹為何物豈可以二證歸於一

證耶想當時重痘不重疹故爾略之致使後人不得心
法因而害事者往往有之今以吾家四代傳流以及今
日心得之法開載於後用此應痘定不差矣敢有毫釐
隱匿天其鑒之

疹脉四

凡出疹自熱起至收完但看右手一指脉洪大有力雖
有別證亦不為害此定存亡之要法也

景岳曰按此即陽證得陽脉之義若細軟無力則陽證

得陰脉矣元氣既弱安能勝此邪毒是即安危之基也
故凡診得陰脉者即當識為陰證而速救元神宜用傷
寒溫補托法參酌治之若執以麻疹為陽毒而槩用清
寒則必不免矣

疹證 五

疹雖非痘之比然亦由胎毒蘊於脾肺故發於皮毛肌
肉之間但一時傳染大小相似則未有不由天行癘氣
而發者此其源雖內發而證多屬表故其內為胎毒則

與痘證同外有表邪則與傷寒類其為毒也總由君相
二火燔灼太陰而脾肺受之故其為證則有欬嗽噴嚏
面腫腮赤目胞浮腫眼淚汪汪鼻流清涕呵欠悶頓乍
涼乍熱手足稍冷夜卧驚悸或惡心嘔噦或以手搥面
目唇鼻者是即出疹之候便宜用解毒散邪等藥不使
畱停於中庶無他患且凡是疹證必其面赤中指冷而
多嗽又必大熱五六日而後見紅點遍身此其所以與
痘與傷寒有異也

一痘欲盡發而不留疹欲盡出則無病邪氣鬱遏則留
而不去正氣損傷則困而不伸毒歸五臟變有四證歸
脾則泄瀉不止歸心則煩熱不退而發驚歸肺則欬嗽
血出歸腎則牙齦爛而疳蝕

程氏曰麻疹初出類傷風寒頭疼欬嗽熱甚目赤頰紅
一二日內即出者輕必須解表忌見風寒葷腥厚味如
犯之恐生痰涎變為驚搐必致危矣如初起吐瀉交作
者順乾嘔霍亂者逆欲出不出者危亡立至

徐氏曰痘自裏而出於臟故重疹自表而出於腑故輕
景岳曰痘疹之屬有四種曰痘曰疹曰麻曰班也痘則
陸續漸出自小而大或稀或密部位顆粒有解也疹則
一齊發出大者如蘇子次者如芥子小者如蚕子而成
粒成片者是也麻則最細而碎如蚊迹模糊者是也班
則無粒惟成片紅紫如雲如錦者是也大都疹與麻班
同類即發班傷寒之屬而痘則本非其類也蓋痘毒本
於肝腎出自中下二焦是以終始不妨於食而全賴水

穀為主所以能食則吉不能食則凶故治痘者不可不顧脾胃麻疹之毒則由表邪不解而內犯太陰陽明病在上中二焦所以多不能食故治麻疹者但宜解散火邪邪散則自能食矣是痘疹之治當各有所重者如此

疹期 六

出疹之候初熱一日至次日雞鳴時其熱即止止存五心微熱漸見欬嗽鼻流清涕或腹中作痛飲食漸減到申酉之間其熱復來如此者四日用手滿按髮際處甚

熱其面上熱少減二三分欬嗽連聲面燥腮赤眼中多
淚噴嚏頻發或忽然鼻中出血至五日其熱不分晝夜
六日早時其疹出在兩頰下細細紅點至午時兩手背
並腰下及渾身密密俱有紅點七日普徧掀發其鼻中
清涕不流噴嚏亦不行七日晚兩頰顏色漸淡此驗出
疹之要法

凡疹熱六日而出一定之規也若醫人無識用藥太早
耗散元氣及至出時變害多矣或嗽而變喘或出一二

日即隱或作大瀉或合目而喘此醫人用藥不當之害也吾家治法定不在五日內用藥必待見疹方用徐徐升表然用藥亦有次第凡一劑必作十餘次飲之況疹在皮膚之間若作一次服則藥性催之太急每致譫語煩躁故當慎之

景岳曰按此萬氏之法謂醫人用藥太早恐致耗散元氣故必待見點而後施治及作一次服恐藥性催之太急皆惟恐無益而反以致害此固其心得之法也然以

愚見則醫有高下藥有宜否但使見有確真發無不當則於未出之前或解或補必有得豫防之力以潛消其毒者既出之後亦必有善調之方而不致催急者此在善與不善或不嫌早與不早也嘗見庸流之誤治者多是誠不服藥為中醫也此萬民之說所以不可不遵凡疹熱五六日必出矣醫人用藥見不能散父母見藥不效醫人見熱嗽不能除或以別證治之主家又或更醫此世之所以誤者多矣

麻疹初熱^七

麻疹發熱之初與傷寒相似惟疹子則面頰赤欬嗽噴嚏
鼻流清涕目中有淚呵欠喜睡或吐瀉或手掐眉目
面赤為異耳但見此候即是疹子便宜謹避風寒戒葷
腥厚味古法用升麻葛根湯以表散毒邪余製透邪煎
代之更佳或柴歸飲亦妙但使皮膚通暢腠理開豁則
疹毒易出不可作傷寒妄加汗下也妄汗則增熱而為
衄血欬血為口瘡咽痛為目赤腫為煩燥乾渴為大小

便不通妄下則裏虛為滑泄為滯下經曰必先歲氣毋伐天和言不可妄汗妄下也

凡疹初熱疑似之間切不可輕易用藥縱有他證必待五日腮下見疹方可用升表之劑嗽多連打嚏噴鼻流清涕或流鼻血飲食減少好飲涼水只宜調理飲食戒麪食葷腥

一疹子初發熱時未見出現欬嗽百十餘聲不已上氣喘急而目胞腫時卧時起此火毒內蒸肺葉焦舉宜甘

桔湯合白虎湯加牛旁子薄荷主之○如疹出之時欬嗽口乾心煩者此毒在心肺發未盡也瀉白散加大花連翹玄參黃連主之

一疹子欲出未出之時宜早為發散以解其毒則無餘患若不預解使之盡出多致毒蓄於中或為壯熱日久枯痺或成驚癇或為瀉痢或為欬血喘促或作疳蝕而死此雖一時戾氣之染然未有不由於人事之未盡也

疹出沒八

一疹子出沒常以六時為準假如子後出午後即收午
後出子後即收乃陽生陰成陰生陽成造化自然之數
也凡此旋出旋收者輕若一出連綿三四日不收者乃
陽毒太甚宜大青湯或用荊芥牛旁子甘草玄參石膏
桔梗主之○若逡巡不出者乃風寒外束皮膚閉密也
宜荊防敗毒散主之

一疹已出而復沒者乃風寒所逼而然若不早治毒必
內攻以致痒癩而死急用升麻湯加荊芥牛旁子甘草