

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷四十二



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷四十二

編輯雜病心法要訣目錄

瘧疾

霍亂

嘔吐噦

翻胃噎膈

泄瀉

痢疾

黃疸

積聚

疝

御纂醫宗金鑑卷四十二目錄

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷之二十一

雜病心法要訣

虛度總括

夏秋暑熱

內秋感寒風

衛居此時或為外邪束

暑汗無生病

汗無生病

時病瘧未有不因風寒

外感風寒之氣不常也

此言此時病瘧者也又曰夏傷於暑秋爲痎瘧又
曰夏暑汗不出者秋成風瘧謂夏傷於暑其邪甚
者即病暑其邪微者則舍於榮復感秋氣寒風與
衛并居則暑與風寒合邪始成瘧病也其不即病
傷寒者亦以有暑邪預伏於榮中也蓋有風無暑
惟病風有暑無風惟病暑必風暑合邪始病瘧也

日作間作

瘧隨經絡循伏膂深入脊內注伏衝橫連膜原薄藏府

會衛之時正邪爭得陰內薄生寒慄得陽外出熱蒸蒸
邪淺日作日會衛邪深間作衛遲逢

注 瘧氣之邪伏藏於榮隨其經絡循脊膂之表而下

此初病邪淺傳舍之次也其邪深者則入脊膂之
內伏注於衝脈橫連諸經脂膜之原內及藏府此
邪漸深傳舍之次也衛氣者一日一夜周於身每
至明旦則出足太陽精明大會於風府腠理乃開
開則所客榮衛之邪入邪入得陰內薄則生寒得

陽外出則生熱內外相薄邪正交爭而病乃作也
病初邪淺者衛行未失常度其邪日與衛會故日
作也病久邪深者衛行遲失常度其邪不能日與
衛會故間日乃作也時有間二日間三日或至數
日作者亦衛氣行愈遲會愈遲故作愈遲也

瘧晝夜作

衛不循經行衄外陽會晝發陰夜發邪退自然歸陽分
病進每必入陰家

註榮氣循經而行脈中衛氣不循經而行脈外惟日
行於三陽夜行於三陰故邪在三陽之淺者則晝
發邪在三陰之深者則夜發病邪將退者夜發退
爲晝發此爲去陰就陽則病欲已也病邪漸進者
晝發退爲夜發此爲去陽入陰則病益甚也

瘧蚤晏作

衛氣平旦會風府邪傳日下一節間從頭循下故益晏
下極復上蚤之緣

註衛氣流行每日平旦會於風府而邪氣中人從頭
項歷風府下循背腰日下傳脊之一節邪與衛會
日晚故作日益晏也邪傳下極骭衝其氣復上行
邪與衛會日蚤故作日益蚤也

瘧疾治法

瘧初氣實汗吐下表裏俱清用解方清解不愈方可截
久瘧形虛補自當

註瘧初氣實均宜汗吐下有表裏證汗下之胸滿嘔

逆有飲者吐之表裏俱清宜用和解清解不愈表裏無證可用截藥止之久瘧形羸氣虛宜用補劑自當然也

桂麻各半湯

瘧初寒熱兩平者桂麻各半汗方療汗少寒多麻倍入汗多倍桂熱加膏

註瘧病初起寒熱不多不少兩平者宜桂麻各半湯汗之汗少寒多熱少者倍麻黃湯汗之汗多寒少

熱平者倍桂枝湯汗之熱多者更加石膏

麻黃羌活湯

桂枝羌活湯

麻黃羌活加半夏湯

白虎湯

白虎桂枝湯

柴胡白虎湯

柴胡桂枝湯

寒多寒瘧而無汗麻黃羌活草防尋熱多有汗爲風瘧
減麻添桂嘔半均先熱後寒名溫瘧白虎汗多合桂君
痺瘧但熱柴白虎牝瘧惟寒柴桂親

註此皆諸瘧初起之汗法也先傷於寒後傷於風先
寒後熱寒多熱少無汗謂之寒瘧宜用麻黃羌活
湯即麻黃羌活防風甘草也先傷於寒後傷於風
先寒後熱熱多寒少有汗謂之風瘧宜用桂枝羌
活湯即桂枝羌活防風甘草也二證嘔者均加半

夏先傷於風後傷於寒先熱後寒謂之溫瘧宜用
白虎湯汗多合桂枝湯陽氣盛陽獨發則但熱而
不寒謂之瘧瘧宜用柴胡白虎湯即小柴胡合白
虎湯也陰氣盛陰獨發則但寒而不熱謂之牝瘧
宜用柴胡桂枝湯即小柴胡合桂枝湯也

草果柴平湯

大柴胡湯

食瘧痞悶噫惡食草果小柴平胃宜瘧裏便鞭大柴下

消檳果朴量加之

註因食而病瘧者則痞悶噫氣惡食宜小柴胡合平
胃散加草果清之凡瘧有裏不清便鞭者宜大柴
胡湯加芒消厚朴草果檳榔下之

清脾飲

瘧疾已經汗吐下清解未盡寒熱方清脾白朮青朴果
小柴參去入苓薑氣虛加參痰橘半飲多宜逐倍薑榔
渴熱知膏天花粉食滯麥麴濕澤蒼

註瘧疾已經或汗或吐或下表裏無證法當清解宜
用清脾飲和之即白朮青皮厚朴草果柴胡黃芩
半夏甘草茯苓生薑也氣虛者加人參痰多者加
橘紅倍半夏飲多者倍生薑加檳榔渴熱者加知
母石膏天花粉食滯者加麥芽神麴濕盛者加澤
瀉蒼朮

久瘧虛瘧勞瘧

久瘧氣虛脾胃弱四獸益氣等湯斟勞瘧鱉甲十全補

熱除者桂入柴苓

註久患瘧疾形氣俱虛脾胃弱不思食宜用四獸飲
補中益氣等湯斟酌治之久病勞損氣血兩虛而
病瘧疾者名曰勞瘧宜用十全大補湯倍加鱉甲
熱盛者除去黃耆肉桂加柴胡黃芩也

柴胡截瘧飲

蜜佗僧散

諸瘧發過三五次表裏皆清截法先未清截蚤發不已