

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷三十



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷三十

刪補名醫方論卷五目錄

礞石滾痰丸

指迷茯苓丸

金匱枳朮湯

桂苓甘朮湯

疏鑿飲子

葶藶大棗瀉肺湯

蘇葶定喘丸

舟車神祐丸

實脾飲

清脾飲

芍藥湯

溫脾湯

大黃附子湯

越鞠湯丸

四磨飲

備急丸

磁硃丸

石斛夜光丸

洗刀散

失笑散

獨聖散

大黃廔蟲丸

仙方活命飲

托裏消毒散

御纂醫宗金鑑卷三十目錄

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷三十

刪補名醫方論卷五

礞石滾痰丸

治實熱老痰之峻劑虛寒者不宜用

黃芩八兩

大黃

沉香五錢

礞石

焰消煨過
內七日用

右四味為細末水丸如梧桐子大用溫

水一口送過咽即仰卧令藥徐徐而下半日不可飲食
勿起身行動言語待藥氣自胃口漸下二腸然後動作
飲食服後喉間稠黏壅滯不快此藥力相攻故痰氣泛
上也少頃藥力至而漸逐惡物入腹下腸效如響應

指迷茯苓丸

治中焦停痰伏飲

半夏

二兩製

茯苓

一兩

枳殼

五錢

風化消

二錢半

右四味薑汁糊為丸

註經曰飲入於胃游溢精氣上輸於脾游者運行也
溢者滲溢也輸者輸布也精氣者水化之精氣也
言入於胃運行水化之精氣滲溢於腸胃之外而
上輸布於脾也又曰脾氣散精上歸於肺言水之
清者上升猶天之雨露也又曰通調水道下輸膀胱
言水之濁者下降猶地之江河也此皆言水自
濁化清由府輸藏自清分濁由藏輸府水之運行

循環也又曰水精四布五經並行言水發源於脾
周布四藏並行五經也此皆言水內養藏府外滋
百骸水之變化精微也如是者何痰之有若飲食
失度不和於中水精不滲溢於外直下走大小腸
而為泄瀉矣若三焦失運氣不蒸化水之清者不
升水之濁者不降精化為水則內停作脹外泛作
腫上攻喘呼下蓄淋閼矣若上焦氣不清肅不能
輸布留於胸中水之精者悉變為濁陽盛煎灼成

痰陰盛凝蓄為飲也故治痰者以清火為主實者
利之虛者化之治飲者以燥濕為主實者逐之虛
者溫之所以古人治飲有溫補之法而治痰則無
之也王隱君製礞石滾痰丸治老痰一方用黃芩
清胸中無形諸熱大黃瀉腸胃有質實火此治痰
必須清火也以礞石之燥悍此治痰必須除濕也
以沉香之速降此治痰必須利氣也二黃得礞石
沉香則能迅掃直攻老痰巢穴濁膩之垢而不少

留滾痰之所由名也若陽氣不盛痰飲兼作又非
此方所宜當以指迷茯苓丸合而治之用半夏燥
濕茯苓滲濕風消軟堅枳殼利氣別於二陳之甘
緩遠於大黃礞石之峻悍殆攻中之平劑歟

金匱枳朮湯

治心下鞭如大盤邊旋如杯水飲所作

枳實

七枚

白朮

二兩

右二味以水五升煮取三升分溫三服腹中鞭即

散

註心下胃之上脘也上脘結鞭如盤邊旋如杯謂時

大時小水氣所作非有形食滯也用枳實以破結
氣白朮以除水濕溫服三服則腹鞭結開而鞭消

矣李杲法仲景以此方倍白朮是以補為主也此
方君枳實是以瀉為主也然一緩一急一補一瀉
其用不同只此多寡轉換之間耳

桂苓甘朮湯

治心下有痰飲胸脇支滿目眩又曰短氣有微飲當
從小便去之桂苓甘朮湯主之腎氣丸亦主之

茯苓

四兩

桂枝

三兩

白朮

三兩

甘草

三兩

右四味以水六升煮取三升分溫三服小便則利

集註趙良曰靈樞謂心胞絡之脈動則病胸脇支滿者

謂痰飲積於心胞其病則必若是也目眩者痰飲

阻其胸中之陽不能布精於上也茯苓淡滲逐飲
出下竅因利而去故用以為君桂枝通陽輸水走
皮毛從汗而解故以為臣白朮燥濕佐茯苓消痰
以除支滿甘草補中佐桂枝建土以制水邪也夫
短氣有微飲此水飲停蓄呼吸不利而然也金匱
並出二方妙義益彰呼氣之短用苓桂朮甘湯之
輕清以通其陽陽化氣則小便能出矣吸氣之短
用腎氣丸之重降以通其陰腎氣通則關門自利

矣

按風水陽水也石水陰水也陽水多實陰水多虛陽水在上故多喘陰水在下故多滿所以治陽水用散用攻治陰水用溫用補然陰中必有陽此方治陰水之在陽而上者也腎氣丸治陰水之在陰而下者也於此推之陽中亦必有陰故有小青龍湯五苓散之治法也今舉世不分陰陽虛實皆以金匱腎氣湯治之服之無效終不改轍每至吐血而