

欽定四庫全書

子部

世醫得效方卷二



南京中医药大学图书馆版权所有

醫方集解

大方脈症醫科

傷風

金匱

元 危亦林 撰

脈陽浮而陰弱陽浮者
寒洒洒惡風翕翕然發
人失血及下利則頻與

服使體潤熱熱連日當自解

桂枝去皮

芍藥各三兩甘草一兩

右剉散每服二錢水一盞半生薑三片棗一枚擘破
共煎至七分去滓溫服不拘時惟冬春初可行自春
及夏至以前可加黃芩半兩夏至以後加知母半兩
石膏二兩或升麻半兩若病人素虛寒者不用加減
無汗者不宜服之

杏子湯治足陽明胃經傷風惡食口苦咽乾腹滿微喘

發熱惡風自汗嗜臥身重小便難潮熱而噦其脈浮弦
長而數悉主之

杏仁去皮尖 半夏湯去滑 五味子各三錢半 芍藥

桂心 細辛 乾薑 大黃蒸

甘草炙各三錢 茯苓四錢

右剉散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前服
柴胡加桂湯治足少陽膽經傷風四五日身熱惡風頸
項強脇下滿手足溫口苦而渴自汗其脈陽浮陰弦或

發汗多亡陽譫語可以此和其榮衛通其津液自愈

柴胡

一兩三錢

半夏

湯去滑四錢一字

甘草

炙一錢一字

芍藥

黃芩

人參

辣桂

各半兩

右剉散每服五錢水一盞半薑五片棗一枚煎至七

分去滓空心溫服

桂枝芍藥湯治足太陰脾經傷風自汗咽乾腹滿自利

不渴四肢倦怠手足自溫其脈弦大而緩者

桂心

半兩

白芍藥

三兩

右挫散每服五錢鹽水一盞半薑五片棗一枚煎七分去滓溫服腹痛甚者加大黃一兩

桂附湯治足少陰腎經傷風胸滿心煩咽喉痛自汗腰疼連胛骨酸痛嘔吐涎沫頭痛其脈沈弦者

附子生去皮臍

桂心

乾薑

芍藥

甘草炙

茯苓

桃仁去皮尖麤炒各一兩

右剉散每服四錢水二盞煎七分去滓食前服或咽喉痛加桔梗半兩

八物湯治足厥陰肝經傷風惡風而勸自汗小腹急痛
寒熱如瘧骨節煩疼其脈尺寸俱微而遲者

桂心

當歸

川芎

前胡

防風

各三分

芍藥

一兩半

甘草

炙

茯苓

各半兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗三枚煎至八
分去滓空心服

傷暑

五苓散治傷暑煩渴引飲無度兼治傷風溫熱表裏未

解煩渴引水水入即吐或小便不利及汗出表解煩渴
不止又治霍亂吐利黃疸瘟疫

澤瀉

二兩半

桂心

一兩

猪苓

去皮

赤茯苓

去皮

白朮

去蘆各一兩半

右為末每服二錢沸湯調下不拘時候服訖多飲熱
湯汗出即愈溫熱病加甘草一兩炙瘥熱在裏身發
黃疸濃煎茵陳湯食前服疸病發渴及中暑引飲白
水調服小兒加白朮末少許發虛熱每料綿黃芪人

參麥門冬去心各一兩分陰陽退實熱山茵陳車前
草每服各二根止瀉加紫蘇陳米各少許薑汁半匕
久痢加肉豆蔻五錢每服鹽梅一枚赤痢烏梅一枚
粟殼二枚去蒂赤膜醋炒白痢粟殼二枚製同上粟米一
撮腹痛南木香半錢渴烏梅一箇枇杷葉二片去白
毛糯米一撮伏暑鼻衄白茅花一把小便血以生料
者每服加梔子三箇車前子一撮煩熱心神恍惚朱
砂一字燈心二十莖麥門冬二十粒去心淡竹葉十

片車前草二根傷暑吐血白茅花一握熱瀉車前子
一撮麥門冬二十粒去心暑濕瀉紫蘇五葉木瓜三
片車前子一撮傷暑頭痛濃煎葱白湯大便水瀉小
便不利加真車前子末少許又方治燥渴去桂心加
人參謂之春澤湯濕瀉身痛加蒼朮少許秋多淫雨
人患濕疫在冬時服之效

縮脾飲治伏暑熱煩渴燥悶乾霍亂

草果

去皮

縮砂

烏梅

去核

各一兩

乾葛

白扁豆

生薑

切片日乾各五錢重

右剉散每服五錢水一盞煎至八分浸冷服或欲溫
欲熱亦可斟酌傷暑發熱頭目痛用以吞消暑丸方
見後中暑類

卻暑散治冒暑伏熱頭目眩暈嘔吐瀉利煩渴背寒面
垢

赤茯苓

去皮

甘草

生各四兩

寒食麴

生薑

各一片細切搜麴令勻

右為末每服二錢新汲水調下或湯點服不拘時候
香薷丸治大人小兒傷暑伏熱燥渴脅悶頭目昏眩胸
膈煩滿嘔噦惡心口苦咽乾肢體困倦不思飲食或發
霍亂吐利轉筋並宜服之

香薷

去梗

紫蘇

去梗

乾木瓜

各一兩

丁香

甘草

炙

檀香

白茯苓

去皮

藿香

各十兩

右為末蜜丸彈子大每一丸至二丸熟水嚼下或新
汲水化下亦得小兒半丸

桂苓甘露散治傷寒中暑冒風飲食中外一切所傷傳受濕熱內甚頭痛口乾吐瀉煩渴喜飲冷小便赤澀大便急痛濕熱霍亂吐下腹滿痛悶及小兒吐瀉驚風

茯苓

一兩
去皮

甘草

二兩
炙

白朮

半兩

澤瀉

一兩

桂

半兩
去皮

石膏

二兩

寒水石

二兩

滑石

半兩

猪苓

半兩

右為末每服三錢溫湯調下新水亦得生薑湯尤良
小兒每服一錢

六和湯治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐泄瀉寒熱交作痰喘咳嗽胸膈痞滿頭目昏痛肢體浮腫嗜臥倦怠小便赤澀并傷寒陰陽不分冒暑伏熱煩悶或成痢疾中酒煩渴不食婦人胎前產後並宜服之

人參

縮砂

甘草炙

杏仁去皮尖

半夏湯炮七次各三兩

白扁豆薑汁略炒

赤茯苓去皮

藿香葉拂去塵

木瓜各二兩

香薷去梗

厚朴薑汁各四兩

右剉每服四錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎至

八分去滓不拘時候服

冷香飲子老人虛人伏暑煩燥引飲無度惡人疲倦服
涼藥不得者

草果仁三兩附子炮去皮臍

橘紅各一兩

甘草炙半兩

右剉散每服一盞水二盞生薑十片煎半盞去滓沈
冷旋旋服不拘時

潑火散傷暑煩燥發渴口乾及治血痢婦人熱崩

青皮去白

赤芍藥

黃連去鬚

地榆各等分

右為細末每服一錢冷水調下如蓄熱而氣血妄行
加甘草等分

枇杷葉散治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩
或陰陽不和致成霍亂吐利轉筋煩燥

枇杷葉 去毛炙半兩

香薷 三兩

白茅根

甘草 炙

麥門冬 去心

乾木瓜 各一兩

陳皮 去白焙半兩

丁香

厚朴 去皮薑汁炙各半兩

右剉散每服五錢水一盞半生薑三片煎服煩燥沈

冷服如脾虛感暑嘔吐不食以此藥煎去滓吞消暑
丸六十粒立効體本虛嘔吐昏倦手足冷除茅根麥
門冬加附子炮用

香薷散治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥膾生冷過
度起居不節或露臥濕地或當風取涼而風冷之氣歸
於三焦傳於脾胃脾胃得冷不能消化米穀致令真邪
相干腸胃虛弱飲食變亂於腸胃之間致吐利心腹疼
痛霍亂氣逆有心痛而先吐者有腹痛而先利者有吐