

欽定四庫全書

子部

薛氏醫案卷二十四



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

大...人...

薛氏醫方

卷之四

文

淵

月醫雜

淵

風

聖

聖

胎毒

胎毒

青槐白汁塗之

口及口瘡舌上瘡神效

亦是胎毒用針挑破

用南星殭蠶等風藥多

明 薛已 訂

薛氏醫案

初生小兒時時與看頻傳桑汁不然舌硬緊漸至撮口
難治

愚按曾世顯云嬰兒一七之內腹肚脹硬臍畔浮腫
口撮不開攢眉而叫名臍風或因剪臍帶少短或因
束縛不緊牽動風入臍中或因鐵器斷臍冷氣入內
傳於脾絡致舌強唇青手足微搐不能吮乳啼聲似
鴉喉痰潮響急掐破口泡去其毒水以艾灸臍中亦
有復生者治法多端無如灸法或以天南星一錢生

薑自然汁調灌為妙

變蒸

小兒不時變蒸變者異常也蒸者發熱也所以變換五臟蒸養六腑須待變蒸多遍氣血方榮骨脉始長

愚按錢仲陽先生云小兒在母腹中乃生骨氣五臟六腑成而未全自生之後即長骨脉五臟六腑之神智自內而長自下而上故生後三十二日一變蒸始即智意異前蓋人有三百六十五骨除手足中四十

五碎骨外有三百二十數自生下骨一日十段而上
之十日百段三十二日計三百二十以為一變亦日
一蒸骨之餘氣一自腦分入齦中作三十二齒則齒
數當與變日相合然而齒有不及三十二數者由變
不足其常也有或二十八日即止長二十八齒以下
倣此但不過三十二之數凡一週遍乃生虛熱諸病
如是十周則小蒸畢也計三百二十日生骨氣乃全
而未壯也故初三十二日一變生腎生志六十四日

再變生膀胱其發耳與鼽冷腎與膀胱俱生腎水水
數一故先變主之九十六日三變生心喜一百二十
八日四變生小腸其發汗出而微驚心為火火數二
一百六十日五變生肝哭一百九十二日六變生膽
其發目不開而赤肝主木木數三二百二十四日七
變生肺聲二百五十六日八變生大腸其發膚熱而
汗或不汗肺者金金數四二百八十八日九變生脾
智三百二十日十變生胃其發不食腹痛而吐乳此

後乃齒生能言知喜怒故云始全也太倉云氣入四肢長碎骨於十變後六十四日長其經脉手足受血故能持物能立能行也經云變且蒸謂蒸畢而足一歲之日也師曰不汗而熱者發其汗大吐者微止不可餘治全嬰方云變蒸者長氣血變者上氣蒸者發熱也輕則體熱虛則體冷微汗唇生白泡三日可愈重者寒熱脉微腹疼啼叫不能乳食食而即吐覘五日方愈其後與傷寒相似但以唇上白泡驗之亦有

受胎氣壯實不熱不驚或無證候而暗變者竊謂此
症小兒所不能免不必服藥古方以黑散子素丸子
主之非惟臟腑不能勝受抑且反傷氣血慎之慎之
嘗見一小兒至二變發熱有痰或治以抱龍丸一粒
卒至不救可以驗矣然父母愛子之心勝稍有疾病
急於求醫而醫者不究病情率爾投劑殊不知病因
多端見症相類難以卒辨況古人稟厚方多峻厲之
劑緩服可也

潮熱

小兒潮熱或壯熱不退多是變蒸及五臟相勝不必用藥又多是飲食停積鬱熱由中發外見於肌表只理其中清陽明之熱而表熱自除不可認作外感輕易發汗用小柴胡輕利等藥重傷其內又潮熱不退恐是出痘亦當審察勿使用藥

愚按前症若因飲食停積或腹痛吐瀉或肚腹膨脹宜用保和丸以消導健脾若飲食既消或腹痛不食

或肚腹膨脹宜用四君子以保養胃氣若因誤行汗
下損傷元氣宜用參耆歸朮陳皮甘草以補中氣大
凡傷食脾胃必損宜固胃氣庶無變症若寅卯辰時
熱者屬肝經也已午未時熱者屬心經也申酉戌時
熱者屬肺經也亥子丑時熱者屬腎經也當詳其虛
實而治之凡屬虛熱實熱投以攻補之劑其病既不
增減乃是病根深固而藥力未能及耳須宜多服功
力既至諸病悉退切不可改為別治設或藥不對症

禍在反掌慎之○李閣老子患潮熱飲食如故自申酉時甚至子丑時方止遍身似疥大便秘結小便赤澁熱渴飲冷余以為脾胃實熱傳於肺與大腸先用清涼飲四劑結熱始退又用四物湯加柴胡黃連數劑其瘡漸愈彼欲速效另用槐角丸之類諸症益甚遂求於施院長亦用四物湯加柴胡黃連加桃仁赤芍藥至百劑而愈

施院長名鑑
字銀臺弟

大小便白

小兒大小便時時審看小便如米泔或澄停少頃變作
泔濁此脾胃濕熱也若大便泔白色或如魚練或帶紅
或色黃黑此積滯濕熱也宜理脾消滯清中宮去濕熱
節飲食若忽然變青此是變蒸也不必用藥若久不愈
用補脾制肝藥一二服亦不宜多用

愚按小便如泔或大便泔白宜用肥兒丸若積滯黃
黑宜用四君子加黃連木香若色青日久不復或兼
泄瀉或兼腹痛當用六君子加木香芍藥若肌體色

黃小便不利髮黃脫落鼻下瘡痍嗜土少食大便青

褐色者須用梔子茯苓湯

詳見治疳要藥下

小兒病多屬肝脾二經

小兒病大率屬脾土肝木二經肝只是有餘有餘之病似重急而為治却易見效亦速脾只是不足不足之病似輕緩而為治却難見效亦遲二經為病惟脾居多用藥最要分別若肝木自旺則為急驚目直視或動搖手足搐搦風痰上壅等症此為有餘宜伐木瀉肝降火清

心若脾胃虛而肝木來侮亦見驚搐動搖諸症但其勢微緩名曰慢驚宜補養脾胃不可錯認將脾經誤作肝經治也

愚按急驚乃風火之症脾土受制肝經實熱者用瀉青丸徑伐其肝或導赤散以瀉其子肝經虛熱者用六味地黃丸以滋腎水補中益氣湯以養脾土則風木自息脾土自安矣若因乳食不調脾胃虧損木來侮土似慢驚而見抽搐搖頭劄目咬牙等症宜用六

君子加鉤藤鉤若脾胃虧損寒水反來侮土成慢驚
而見前症用前藥加薑桂如未應更加附子多有復
甦者 舉人杜克宏子發熱抽搐口噤痰湧此肝膽
經實火之症即急驚風也先用瀉青丸一服又用六
味丸二服諸症頓退乃以小柴胡湯加芎歸山梔鉤
藤鉤而安却用補中益氣湯而愈

急驚

急驚是有餘之症屬肝木心火陽邪太旺宜直瀉之降

火下痰是也五臟俱有陰陽如肝氣為陽為火肝血為陰為水肝氣旺則肝之血衰矣火妄動則水被煎沸不寧矣陽旺陰消風火相搏陰血走散勢所必至也故亦宜養血急驚雖屬肝心然木火旺則肺金受虧不能平木木來尅土斯損矣故亦宜養脾況治驚諸藥大率祛風化痰瀉火峻厲及腦麝辛散之味易於消陰血損脾胃者故治有餘急驚之症先須降火下痰一二服後加養血安神之藥若飲食少大便溏或吐瀉則當兼補脾