

內蒙古自治区昭烏达盟、哲里木盟

天然草場类型的質量鑑定

天然草場类型的生产力特征

中国科学院內蒙宁夏綜合考察队

1963. 4

主 編：

廖 國 藩	中國科学院綜合考察委員会
谷 錦 柱	內蒙古畜牧廳草原建設局

參加工作人員(草場組)：

廖 國 藩	中國科学院綜合考察委員会
谷 錦 柱	內蒙古畜牧廳草原建設局
賈 慎 修	北京農業大学
馬 驊	內蒙古昭烏達盟農牧科学研究所
朱 長 玉	北京農業大学

編 制：

廖 國 藩	中國科学院綜合考察委員会
谷 錦 柱	內蒙古畜牧廳草原建設局
馬 驊	內蒙古昭烏達盟農牧科学研究所
楊 愛 云	內蒙古哲里木盟農牧林办公室
哈 森	內蒙古哲里木盟農牧林办公室

內蒙古昭烏達盟天然草場类型的質量鑑定

目 录

內蒙古昭烏达盟天然草場类型的質量鑑定.....	1
內蒙古哲里木盟天然草場类型的質量鑑定.....	9
內蒙古昭烏达盟天然草場类型的生产力特征.....	13
內蒙古哲里木盟天然草場类型的生产力特征.....	21

中山山地草原草場

等 級	类 型	总 重 量 [公担/公 頃(鮮)]	占 总 重 量 · %						飼用植物成 分类型 (占 总重量60% 以上)	分 布 地 点
			禾 本 科 (3)	豆 科 (B)	莎 草 科 (O)	菊 科 (II)	杂 类 草 (PIP)	灌 木 (K)		
I	I ₃ 碱草+小禾草	44.30	85.55	1.13		2.48	10.84		3	克旗白音敖包林場云杉林下
II	II ₂ 針茅+碱草+蒿类	47.30	61.73			12.05	26.22		3	阿旗白音温都尔公社胡和烏素 北东 6km
	II ₄ 針茅+碱草+狐茅	18.00—20.20	68.88—50.49				31.12—49.51		3	林西县大水波罗河西岸, 海拔 1270m
	II ₄ 針茅+落草+冷草									克旗广兴元公社永兴大队, 海 拔1430m
	III ₂ 針茅+碱草+蒿类	46.50	43.01				56.99		ΠP	林西县胡家店
	III ₃ 針茅+杂类草									巴林右旗罕山林場, 海拔 1100m
	III ₃ 西伯利亚艾菊+針茅+碱 草+苔草	32.56—38.50	23.71—28.65	0—3.28	0—3.39	47.23—30.29	29.06—34.39		Π-ΠP	阿旗北部野托托东南 4km, 海 拔 1000m
	III ₃ 針茅+狐茅+杂类草									克旗白音查干公社保尔图格
	III ₄ 針茅+西伯利亚艾菊	26.60	11.59		16.99	34.58	36.84		ΠP-Π	克旗, 海拔 1300m
IV	IV ₃ 胡榛子+苔草	41.70					20.87	79.13	K	喀旗上店村以南的磨盘山
IV	IV ₃ 西伯利亚艾菊+狐茅	33.20	16.57			61.44	21.99		Π	
	IV ₄ 棘豆+苔草	19.44—16.68	5.35—0	6.37—0	5.14—20.86		10.31—0	72.83—79.14	K	喀旗小牛羣公社南台大队龙泉 寺西山, 海拔 1000m
	IV ₄ 胡榛子灌丛									喀旗上店村磨盘山
II	II ₅ 碱草+冷蒿	8.20	50.00		25.60		24.40		3-O	赤峯市老府公社敖包林場南山
III	III ₄ 胡榛子+苔草+杂类草	23.60	47.96				34.75	17.29	3-ΠP	赤峯市老府公社林場西五道沟 山上

低 山 草 原 草 場

等 級	类 型	总 产 量 [公担/公 頃(鮮)]	占 总 重 量 %						飼用植物成 分类型(占 总重量60% 以上)	分 布 地 点
			禾 本 科 (3)	豆 科 (Б)	莎草科 (O)	菊 科 (П)	杂 类 草 (ПП)	灌 木 (K)		
I	I ₄	碱草+胡枝子+杂草	28.40	62.25	20.70		17.05		3	敖汗旗大黑山林場,海拔 550m
II	II ₄	本氏針茅+冷蒿	16.50	88.49		6.06	5.45		3	喀旗老爷岭,海拔 840m
	III ₃	山坡草+杂草	31.44—34.48	48.34—11.02	6.11—29.00	5.09—0	40.46—0	0—59.98	3-II, ПП-B	敖旗大黑山林場碾盘沟沙子梁
	III ₃	羊茅+胡枝子+杂草								敖旗新地公社馬家店大队黑松山
	III ₄	山杏-針茅+隱子草+蒿类	16.50	88.48		6.06	5.46		3	喀旗老爷岭,海拔 840m
	III ₅	西伯利亚艾菊+隱子草	3.48	65.52	20.69		13.79		3	翁旗南湾子大队
IV	IV ₁	胡榛子-达乌里胡枝子+苔草	66.50	9.33	11.43	3.15		76.09	K	敖旗四家子公社大青山青沟梁, 海拔 800m
	IV ₂	木藍-西伯利亚艾菊+苔草	46.32	4.32	5.87	10.88	78.93		ПП	敖旗大黑山林場碾盘沟沙子梁, 海拔 620m
	IV ₃	胡榛子-西伯利亚艾菊	33.30	4.20	4.81	33.33	17.72	39.94	K-II	赤峯市老府公社敖包林場
	IV ₄	本氏針茅+隱子草	22.30	15.70	28.70		55.60		ПП-B	敖旗白塔子东北 2km
I	I ₄	鉄杆蒿+隱子草+碱草	24.00	37.08	45.00		17.92		B-3	右旗崩布吐
II	II ₁	大果榆+山杏-冰草+隱子草	69.80	64.61	3.58		31.81		3	阿旗甘珠尔庙
	II ₄	鉄杆蒿+碱草+杂草								林西县西40里温得尔胡碩
	II ₄	隱子草+鉄杆蒿+胡枝子	18—29	15.05—57.91	26.65—11.27	25.69—7.24	32.61—23.58		ПП-B, 3-ПП	右旗
	II ₄	隱子草								右旗崩布吐
	II ₄	蒿类+冰草+杂类草	29.60	9.33		77.42	13.25		II	右旗崗崗庙河谷,海拔 940m

丘陵草原草場

等級	類型	總重量 [公担/公頃(鮮)]	占 總 重 量 %						飼用植物成分 類型(占 總重量60% 以上)	分 布 地 點
			禾本科 (3)	豆 科 (Б)	莎草科 (O)	菊 科 (П)	雜 類 草 (ПР)	灌木 (K)		
I	I ₂	針茅+碱草+隱子草+冷蒿	53.50	77.19	10.66		12.15		3	右旗黃花廟以南, 6—7km
	I ₄	小禾草+達烏里胡枝子	15.90	43.40	33.96	22.64			3-Б	右旗崩巴吐東北, 海拔 680m
	I ₄	針茅+隱子草	20.7	78.36	4.83		19.81		3	阿旗新立屯, 海拔 350m
	I ₄	山杏-碱草	54.00	77.00	11.00		12.00		3	右旗崩布吐南 3km, 海拔 630m
	I ₅	冰草+隱子草+針茅	10.80	72.22	12.04		15.74		3	右旗羊場東北 1.5km
II	II ₁	鐵杆蒿+隱子草+冷蒿	7.20—90.00	69.44—33.88	30.56—6.34		0—59.78		3, ПР	林西县巴台林農場西 4km, 海拔 800—880m
	II ₁	早熟禾+雜類草(知母)								克旗長山溝門, 海拔 1380—1405m
	II ₄	蒿類+碱草	23.37	29.45		23.83	23.38		3-ПР	阿旗天山鎮黑木稷河東岸, 海拔 380m
	II ₄	隱子草+蒿類+雜類草	17.52	69.41		8.68	21.91		3	右旗崩巴吐東北, 海拔 680m
	II ₄	針茅+隱子草								林西县農場二巴地南 4—5 公里
III	III ₂	山杏-西伯利亞艾菊+針茅	58.40—49.10	16.44—46.24		66.43—0	17.13—53.76		П, ПР-Б	右旗黃花廟公社東南, 海拔 730m
	III ₂	針茅+碱草+西伯利亞艾菊								林西县北牧場, 海拔 1256m
	III ₃	碱草+西伯利亞艾菊	29.40	34.69		47.62	17.69		П-3	克旗巴彥查干公社浩特四隊, 海拔 1360m
	III ₄	山杏-針茅+隱子草	23.00—15.80	23.91—48.10	11.31—5.69	56.18—0	8.60—46.21		П-3, 3-ПР	右旗益和淖爾公社哈拉巴召
	III ₄	山杏-針茅+隱子草								右旗益和淖爾公社西馬鬃山
IV	III ₄	鐵杆蒿+隱子草	19.7	45.69	2.03	52.28			П-3	右旗短角牛場, 海拔 700m
	IV ₄	知母	19.40—27.10	18.04—24.36	0—18.45		81.96—57.19		ПР, ПР-3	林西县二巴地, 林西農場西 4km, 海拔 800—880m
	IV ₄	山杏-隱子草+針茅								右旗崩布吐西南 3km, 海拔 630m
	IV ₅	知母	12.50	16.10	3.80		80.10		ПР	林西县冬不冷公社

黃 土 丘 陵 草 原 草 場

等 級	类 型	总 产 量 [公担/公頃(鮮)]	占 总 产 量 %						飼用植物成分类型(占总重量60%以上)	分 布 地 点
			禾 本 科 (3)	豆 科 (B)	莎草科 (O)	菊 科 (II)	杂 类 草 (III)	灌 木 (K)		
III	III ₂ 白草+百里香	48.40—56.30	54.32—28.77	19.23—14.56			26.45—56.67		3-III	敖汗羊場黃羊洼
	III ₃ 隱子草+砂蒿+豆科草类									敖汗旗长胜公社小洼种羊場
	III ₄ 白草+杂草	20.5	87.32				12.68		3	敖汗羊場黃羊洼
	III ₄ 达烏里胡枝子+鉄杆蒿+紫苑	6.16	1.29	66.24		23.38	9.09		B	翁旗凡殖場西
	III ₅ 达烏里胡枝子+百里香+鉄杆蒿	10.32	7.35	27.91		26.75	37.99		III-B	”
	IV ₃ 狼毒+百里香+达烏里胡枝子	12.20	4.59	17.38			78.03		III	翁旗四份地西 500m 黄土丘陵
II	II ₂ 白草(隱子草+杂类草)	48.40	54.33	19.24			26.43		3-III	敖汗旗紫金林子西北 4km
	II ₄ (芦苇+)碱草+莎蒿	19.92	61.64	11.06		27.30			3	敖汗旗北大梁(平頂庙南)葦子沟,海拔 470m
IV	IV ₃ 冷蒿+百里香	37.00	7.03	10.00		48.64	34.33		II-III	赤峯市北 63km 馬架子附近,海拔 730m
	IV ₄ 白草+猪毛菜	23.20	18.45				81.55		III	敖汗羊場北梁
	IV ₅ 百里香+苔草	8.76—2.68	3.17—12.68	0—18.84	9.52—0	0—28.26	87.31—50.22		III, III-B	赤峯西大庙东公主陵以南山中 部北坡
	IV ₅ 百里香+蒿类									宁城县八里罕北4km,海拔798m
	IV ₅ 百里香+隱子草+杂草									赤峯县农場丘陵上部,海拔710m
	IV ₅ 百里香+隱子草									赤峯西北衣家营子,海拔 700m

高 原 草 原 草 場

等 級	类 型	总 重 量 [公担/公 頃(鮮)]	占 总 重 量 %						飼用植物成 分类型(占 总重量60% 以上)	分 布 地 点
			禾 本 科 (3)	豆 科 (Б)	莎 草 科 (O)	菊 科 (П)	杂 类 草 (ПР)	灌 木 (K)		
I	I ₁ 碱草+野豌豆	65.30—66.30	70.60—88.99	16.53—0		0—11.01	12.87—0		3	克旗六州湾, 韭菜地塔拉
	I ₁ 碱草+苔草+冷蒿									克旗免里朵河往經棚, 海拔1330m
	I ₂ 碱草	46.40	82.76				17.24		3	克旗保尔呼碩
	I ₃ 針茅+黃芪	43.24	37.74	40.52			21.74		Б-3	克旗达里諾尔貢格尔草原
	I ₄ 貝加尔針茅+碱草	26.10	75.86				24.14		3	克旗达里諾尔漁場西南 10km
II	II ₁ 碱草+杂类草									克旗达里諾尔湖滨砬子山东, 海 拔 130m
	II ₁ 針茅+冷蒿+隱子草	224.30—78.00	94.23—44.25	5.77—0	0—30.53		0—25.22		3,3-O	克旗河城东部, 海拔 1150m
	II ₁ 野大麦									克旗河城东部漁場东 3km
	II ₂ 碱草-落草+隱子草	48.40	36.78			26.44	36.78		3-ПР	克旗长山沟門附近, 海拔 1300m
	II ₃ 針茅+碱草	41.00	50.48				49.52		3-ПР	克旗长山沟門附近
	II ₄ 冷蒿+碱草	26.90—23.90	33.46—28.45	0—28.03		49.07—43.52	17.47—0		П-3	克旗好魯車羊場东 1 里的塔拉
	II ₄ 冰草+冷蒿+达烏里胡枝子									克旗义呈原, 海拔 1160m
	II ₅ 芨芨草+萎陵菜+碱草	14.16—13.20	98.87—51.51				1.13—48.49		3,3-ПР	克旗达里諾尔湖滨东部, 海拔 1260m
	II ₅ 碱草+杂类草									翁旗少郎河上游义合公社大 石厓台地
	III ₅ 早熟禾+苔草+蒿类	12.20	22.95			77.05			П	克旗貢格仁錫勒
III	III ₁ 西伯利亚艾菊+多叶棘豆+ 落草	65.80—59.90	3.04—2.84	14.89—13.36	1.83—3.67	68.69—52.08	11.55—28.05		П, П-ПР	克旗义合公社西場
	III ₁ ” ” (打草地)									”
	III ₂ 碱草+蒿类+杂类草									克旗达里諾尔貢格尔草原(休荒 一年)
	III ₃ 針茅+禾草+棘豆(多叶、紫花)	37.08—43.80	33.92—40.20			45.00—0	21.08—59.80		П-3, ПР-3	克旗广兴元公社蓮花山漫甸上
	III ₃ 西伯利亚艾菊+針茅+花苜蓿									克旗达里諾尔公社北 5km, 海 拔 1250m
	III ₄ 早熟禾+蒿类+萎陵菜	22.00	28.64			35.91	35.45		П-ПР	克旗达里諾尔西 3km, 海拔 1250m
	III ₅ 百里香+冷蒿+隱子草	19.50—10.40	17.95—12.31	0—0.76	0—32.31	22.56—0	59.49—54.62		ПР, ПР-O	克旗石岭河北岸, 达力諾尔公社, 海拔 1100m
	III ₅ 莎草+狐茅+碱草									翁旗青馬場

高原沙地草原草場

等級	類型	总重量 [公担/公頃(鮮)]	占 总 重 量 %					飼用植物成分 类型 (占 总重量60% 以上)	分 布 地 点
			禾本科 (3)	豆 科 (Б)	莎草科 (O)	菊 科 (П)	杂类草 (ПП)	灌丛 (K)	
I	I ₃ 針茅+碱草+杂草	37.00—44.00	95.61—87.04	0—1.02		0—7.48	4.39—4.46	3	克旗好魯庫羊場
	I ₃ 碱草+砂蒿+隐子草+猪毛菜								克旗河城东
II	I ₃ 碱草+冰草+落草	33.00—34.00	33.84—52.66			40.92—0	25.24—47.34	П-3,3-ПП	克旗白音敖包林場西北 2km
	II ₃ 冰草+碱草+冷蒿								克旗石岭子河南
III	II ₃ 冷蒿+冰草	38.80	37.83		6.71	19.89	35.57	3-ПП	克旗白家营子
	III ₃ 义分蓼+碱草								克旗好魯庫羊場
	IV ₂ 义分蓼	56.40	7.80				92.20	ПП	克旗白家营子
	IV ₃ 砂蒿-冷蒿+百里香	42.80	1.87				98.13	ПП	”

平原沙地草原草場

等 級	类 型	总 重 量 [公担/公頃(鮮)]	占 总 重 量 %						飼用植物成分类型(占 总重量60% 以上)	分 布 地 点	
			禾 本 科 (3)	豆 科 (Б)	莎草科 (O)	菊 科 (П)	杂 类 草 (ПП)	灌 木 (K)			
II	II ₄ 小叶錦鸡儿-百里香+冰草	22.50	39.55	21.34				39.11		3-ПП	翁旗旗杆庙西砂地
	{ II ₄ 冰草+砂蒿 II ₄ 冰草+隐子草+冷蒿 II ₅ 冰草+蒿类	16.00—21.00	23.3—45.16	20.25—10.25	4.30—0	20.25—39.84	31.9—4.75		ПП-3,3-П	右旗查干烏素配种站	
										翁旗爱林沟	
										翁旗大袖泡子沙地	
III	III ₁ 砂蒿+冰草	74.00	24.59				67.16	8.25		П	右旗崗崗庙
	{ III ₃ 砂蒿-錦鸡儿 III ₃ 冰草+砂蒿+木蓼	41.00—45.00	23.96	4.37			17.75	53.92		ПП-3	右旗白音汗山
											阿旗道德牧场
IV	IV ₄ 冰草+知母-錦鸡儿	19.90	16.58	3.02	7.54	6.03	66.83		ПП	阿旗白音温都尔	
II	II ₅ 木蓼-冰草	7.90	53.16	6.33	27.85		12.66		3-O	翁旗白音汗山	
IV	IV ₅ 小禾草+莎草+杂类草	3.27	18.04		13.15		68.81		ПП	翁旗五份地大袖泡子南砂甸地中	

山地草甸草場

等 級	类 型	总 重 量 [公担/公頃(鮮)]	占 总 重 量 %						飼用植物成分类型(占 总重量60% 以上)	分 布 地 点
			禾 本 科 (3)	豆 科 (B)	莎草科 (O)	菊 科 (II)	杂 类 草 (IIP)	灌 木 (K)		
II	II ₄	碱草+杂类草	20.40	65.68			34.32		3	阿旗天山鎮东 1 里
III	III ₁	雀麦+杂类草+狐茅+西伯利亚艾菊	71.60	14.10		19.55	66.35		IIIP	阿旗罕山山地
III	III ₂	莎草	54.40		41.17		58.83		IIIP	右旗汗山大西沟上,海拔 1920m
	III ₄	小叶樟+杂类草	27.10	36.91			63.09		IIIP	林西县馬蘭滩,海拔 920m
	III ₅	苔草	10.60		58.87		37.74	3.39	O	赤峰市老府公社林場西,五道沟山上
	III ₅	莎草+蒿类	7.70	22.08	29.87	36.36	11.69		II-O	翁旗松树山山顶,海拔 900m

平原草甸草場

等 級	类 型	总 重 量 [公担/公頃(鮮)]	占 总 重 量 %						飼用植物成分类型(占 总重量60% 以上)	分 布 地 点
			禾 本 科 (3)	豆 科 (B)	莎草科 (O)	菊 科 (II)	杂 类 草 (IIP)	灌 木 (K)		
I	I ₄	(馬蘭)針茅+碱草+杂类草	23.00	84.34	4.35		11.31		3	阿旗白音温都尔(甘珠尔庙)北 3km
III	III ₃	野枯草	44.70—37.00	95.07—24.87	3.36—9.46	0—28.37	1.57—37.30		3, IIP-3	阿旗蟒格吐河谷
	III ₃	铁杆蒿+碱草+杂类草								阿旗白音花公社尕神保冷大队,海拔 430m
	III ₄	碱草+萎陵菜	37.80	19.84	20.11	39.94	20.11		II-B	阿旗白音温都尔公社白音合碩
	III ₅	野大麦+碱草+碱茅—碱蓬	3.64	46.15			53.85		3	林西县查崗木伦西南 3km
IV	IV ₁	莎草	15.93		2.20	88.19	9.61		O	克旗好魯軍羊場大水諾东
II	II ₃	芨芨草+野大麦+碱草	15.50	92.90	7.10				3	翁旗白音汗公社南 4km
III	III ₂	碱草+苦馬豆	57.68	69.07	30.93				3	翁旗黑石滩营子,海拔 700m
II	II ₄	盐蒿—碱草+野大麦	19.60	66.33		10.46	23.21		3	米翁旗海金山牧場西 3km
III	III ₄	苔草+杂类草	23.20	16.38	35.35		48.27		IIIP-O	敖汗旗长胜公社烏兰巴苏大队白土梁子生产队西
I	I ₄	碱草+蒿类	24.70	87.86	0.40	11.74			3	翁旗烏丹东 10 里
	I ₅	碱草+隐子草+花苜蓿	9.80	81.63	8.16	8.16	2.05		3	翁旗海力苏公社烏兰吉格大队大甸子,海拔 430m
II	II ₄	碱草+蒿类	18.50	42.15	1.08	56.77			II-3	翁旗烏丹东 10 里

內蒙古哲里木盟天然草場类型的質量鑑定

低 山 草 原 草 場

等 級	类 型	总 重 量 [公担/公 頃(鮮)]	占 总 重 量 %						飼用植物成 份类型(占 总重量60% 以上)	分 布 地 点
			禾 本 科 (3)	豆 科 (B)	莎草科 (O)	菊 科 (Π)	杂 类 科 (ΠP)	灌 木 (K)		
II	II ₃ 西伯利亚艾+針茅+碱草	40.10—36.80	45.87—49.33	11.47—7.86	1.51—0	41.15—36.31	0—6.50		3-Π	扎旗 海不西列 东北海拔 910m
	II ₃ 鉄干蒿+針茅+碱草									” 民主公社 格日切老
	II ₄ 大針茅+碱草	29.50	53.22				46.78		3-ΠP	” 霍林河 海拔 893m
III	III ₃ 西伯利亚艾菊+弧茅+針茅	20.9—40.90	20.63—39.33	13.43—4.96	0.88—0	61.56—30.06	3.50—25.65		Π,3-Π	” 罕山林場 罕山 990m
	III ₃ 西伯利亚艾菊+隱子草+針茅									” 烏魯根他拉
	III ₃ 野枯草+針茅									” 阿魯混都 冷河

丘 陵 草 原 草 場

等 級	类 型	总 重 量 [公担/公 頃(鮮)]	占 总 重 量 %						飼用植物成 份类型(占 重量60%以 上)	分 布 地 点
			禾 本 科 (3)	豆 科 (B)	莎草科 (O)	菊 科 (II)	杂 类 草 (IIP)	灌 木 (K)		
I	I ₁ 碱草	60.60	90.76			9.24			3—B.3	高林屯牧場东南 5km
	I ₂ 碱草+达烏里胡枝子	58.20	45.02—65.29	24.05—15.12		11.68—13.75	19.25—5.84			扎旗 前进公社 吉布吐
	I ₂ 碱草+針茅+隱子草+达烏里胡枝子									” 烏魯格及
	I ₃ 碱草+隱子草	43.80—35.60	78.08—79.21	6.85—0	0—19.94	15.07—0	0—0.85	3	” 烏魯根他拉	
	I ₃ 碱草+苔草								” 道老杜公社西 0.5km	
	I ₄ 碱草+葱	25.25—24.50	58.34—95.51	0—3.27			41.66—1.22	3	” 古斯庙公路旁	
I ₄ 碱草+苜蓿	” 烏魯根他拉									
II	II ₄ 大油芒+艾菊	25.10	82.47			17.53		3	” 魯北东 23km	
III	III ₂ 拂子茅	52.00—42.00	80.76—41.33	0—4.46		0—14.36	19.24—39.85	3,3—IIP	” 烏魯根他拉	
	III ₂ 隱子草+碱草								” 塔里拉尔里河东北	
	III ₃ 針茅+野枯草	33.40—26.00	83.83—88.85	0—2.69			16.17—8.46	3	” 魯北西北 5km	
	III ₃ 山杏+野枯草								” 东南 60 里	
	III ₄ 山杏+野枯草	25.70	88.72	2.72		8.56		3	” 魯北东 2.3km	

沙 地 草 原 草 場

等 級	类 型	总 重 量 [公担/公 頃(鮮)]	占 总 重 量 %						飼用植物成 份类型(占 总重量60% 以上)	分 布 地 点
			禾 本 科 (3)	豆 科 (B)	莎草科 (O)	菊 科 (II)	杂 类 草 (IIP)	灌 木 (K)		
I	I ₃ 碱草	41.20	72.09			9.22	18.69		3	中旗 巨流河——魯北途中
	I ₄ 碱草+冷蒿+隱子草	27.90	100.00						3	中旗 哈拉胡碩
II	II ₁ 針茅+隱子草	63.00—66.00	65.65—100.00	9.52—0			26.83—0		3	扎旗 道老吐公社东 4km
	II ₁ 拂子茅+碱草									中旗 巨流河牧場
	II ₃ 黄蒿+紫花苜蓿	35.00—31.40	14.08—57.32	53.53—0		32.39—36.62	0—6.06		B—II, 3—II	通辽市 高林屯牧場南 2km
	II ₃ (撩荒地)									扎旗 道老吐公社
	II ₅ 隱子草+冷蒿+胡枝子	14.30	31.47	24.48		26.57	17.48		3—II	后旗 伊胡塔公社 甘珠尔庙
III	III ₁ 山竹子—砂蒿+狗尾草	63.80	16.77	52.51		22.57	8.15		B—II	“ ” “
	III ₂ 白草+麻黄	51.00—46.70	54.90—96.36			0—3.64	45.10—0		3	扎旗 烏魯格其牧場
	III ₂ 白草+麻黄 (撩荒地)									扎旗 道老吐公社
	III ₃ 白草—山竹子									奈曼旗 东明公社 刘茶館西北1km
	III ₃ (撩荒地)	32.00—39.80	70.23—37.70	0—22.52		0—15.02	29.77—24.76		3,3—IIP	扎旗 道老吐公社
	III ₃ 隱子草—黄蒿+麻黄									
IV	IV ₄ 碱草+杂类草	29.20—23.64	55.48—43.83	0—4.90		0—49.07	4.52—2.20		3—IIP, 3—II	后旗 后好来东 2km 海拔 240m
	IV ₄ 砂蒿—針茅+隱子草									通辽 高林屯牧場
IV	IV ₃ 黄柳—荻+野枯草	43.00	62.79	0.93		16.74	5.35	14.19	3	后旗 甘珠尔庙
	IV ₄ 山竹子—白草—砂蒿	29.30—22.72	27.64—18.49	48.81—16.37		18.77—49.29	4.78—15.85		B—3, II—3	奈曼旗 东明公社 刘茶館西北1km
	IV ₄ 砂蒿+錦鸡儿									“ 大沁他拉西 8里

平 原 草 甸 草 場

等 級	类 型	总 产 量 [公担/公 頃(鲜)]	占 总 重 量 %						飼用植物成 份类型(占 总重量60% 以上)	分 布 地 点
			禾 本 科 (3)	豆 科 (B)	莎 草 科 (O)	菊 科 (II)	杂 类 草 (IIP)	灌 木 (K)		
I	I ₃	碱草	34.40	97.97			2.03		3	中旗 巨流河牧場
II	II ₁	芦苇								扎旗 烏魯格其牧場
	II ₁	芦苇+杂类草	115.80—193.70	94.99—77.88		0—5.71	5.01—16.41		3	中旗 巨流河牧場
	II ₁	芦苇								中旗 花胡碩元南 2km
	II ₄	芦苇+杂类草	23.50	85.11			14.87		3	奈曼旗 火力公司
III	III ₃	狗尾草+蒿类	33.60	68.45	1.49	28.27	1.79		3	通辽至錢家店途中
	III ₄	野枯草+牛鞭草								后旗 孟根大垸牧場
	III ₄	苔草+剪刀股	20.3—29.00	83.64—45.70	0—37.45		16.36—16.85		3,3—0	奈曼旗 大沁他拉 孔春泡子
	III ₄	野枯草+木賊								扎旗 香山农場 石匠山南 1km
IV	IV ₅	蒲茅+芦苇	13.70	91.96	2.92		5.12		3	中旗 巨流河牧場

內蒙古昭烏達盟天然草場类型的生产力特征

中山山地草原草場

类 型	分 布 地 点	主 要 植 物	利 用 层 高度(cm)	公斤/公頃(鮮)		載畜量 只(羊)/ 公頃、年	适宜放 牧畜种	适 宜 利 用 方 式	等 級	調 查 日 期
				总产量	可食产量					
碱草+小禾草	克旗白音敖包林場云杉林下	碱草、落草、早熟禾、冰草、蒿类	30—45	4430	3101	1.7	馬牛羊	放牧	I ₃	62.7.24
針茅+碱草+蒿类	阿旗白音温都尔公社呼和鳴素北6km	貝加尔針茅、碱草、艾蒿、知母	20—55	4730	2365	1.3	”	”	II ₃	62.8.9
針茅+碱草+孤茅	林西县大水波罗河西岸	碱草、孤茅、針茅	10—40	1800	1080	0.6	”	放牧—刈割	II ₄	62.8.6
針茅+落草+冷蒿	克旗广兴元公社永兴大队	落草、針茅、冷蒿	15—30	2020	1010	0.6	羊馬牛	放牧	II ₄	62.7.29
雀麦+杂类草+孤茅+艾菊	阿旗罕山	西伯利亚艾菊、地榆、沙参	15—35	7160	2864	1.5	馬羊牛	”	III ₁	62.8.9
針茅+碱草+蒿类	林西县胡家店	針茅、碱草、蒿类	20—60	4650	2325	1.3	牛馬羊	”	III ₂	62.8.4
針茅+杂类草	右旗罕山林場	針茅、苔草、蒿类	60—65	3256	1303	0.7	羊牛馬	”	III ₃	62.7.14
艾菊+針茅+碱草+苔草	阿旗北部野托托东南 4km	碱草、針茅、艾菊、苔草	15—35	3350	1340	0.7	馬羊牛	”	III ₃	62.8.4
針茅+孤茅+杂类草	克旗白音查干公社保尔图格	針茅、孤茅、艾菊、豆科	10—25	3850	1540	0.8	羊馬牛	”	III ₂	62.7.27
針茅+西伯利亚艾菊	” ”	針茅、艾菊、苔草	I 70, II 25—30	2660	1064	0.6	馬羊牛	”	III ₄	62.7.20
西伯利亚艾菊+孤茅	克旗白音查干公社西到他拉南	孤茅、碱草、冰草、針茅、艾菊	25—50	3320	1328	0.7	”	”	IV ₃	62.5.25
胡榛子+苔草	喀旗上店村以南磨盘山	胡榛子、苔草	5—20	4170	1668	0.9	羊牛	”	IV ₃	62.6.2
棘豆+苔草	喀旗小牛羣公社南台大队龙泉寺西山	棘豆、苔草、蒿类、萎陵菜	4—25	1944	798	0.4	羊	”	IV ₄	62.6.8
胡榛子灌丛	喀旗上店村磨盘山	苔草、蒿类、萎陵菜	15—25	1668	667	0.4	羊	”	IV ₄	62.6.2
碱草+冷蒿	赤峯市老府敖包林場南山	碱草、冷蒿、針茅、胡枝子	5—25	820	410.0	0.3	羊牛馬	”	II ₅	62.6.11
胡榛子+苔草+杂类草	赤峯市老府公社林場西五道沟山上	碱草、蒿类、胡榛子、野豌豆、杭子稽	15—45	2360	944	0.5	牛馬羊	”	III ₄	62.6.11
苔草	” ”	苔草、玉竹、唐松草、杭子稽	12—20	1060	424	0.2	牛羊馬	”	III ₅	62.6.12