

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百四十七



南京中医药大学图书馆版权所有

普濟方卷之四

產後諸疾

產後惡露不盡腹痛

產後惡露不盡腹痛
產後惡露不盡腹痛
產後惡露不盡腹痛
產後惡露不盡腹痛

周王朱櫛 撰

論

有冷肺氣不調和既產
不斷久不已則經血不
足是其證也治法宜溫

有之者如女中身見月結有冷至於產時其血

必少或新產而又風涼皆令風冷搏於血血壅滯則不得宣通蓄積在內則有時惡露不下盡故腹痛也凡婦人大產後或腹臍腰痛乃敗血物之致伏也醫者便作虛冷以燥熱藥治之誤人久矣難經曰諸痛為實者熱也可用導水丸禹功散瀉三五行然後以玉燭散和血通經降火益水之藥治之獨不可便服黑神散燥熱之藥當同半產治之

方

桃仁湯

出千金方

治產後往來寒熱惡露不盡

桃仁

五兩

吳茱萸

二升

黃芪

當歸

芍藥

各三兩

生薑

醍醐酥

鍊

柴胡

各八兩

右㕮咀以酒一斗水二升合煮取三升去滓適寒溫

先食服一升日三

甘草湯

出千金方

治產乳餘血不盡逆搶心胃手足逆冷唇

乾腹脹短氣

甘草

芍藥

桂心

阿膠

各三兩

大黃

四兩

右呖咀以東流水一斗煮取三升去滓內阿膠令烱分三服一服入腹中面即有顏色一旦夜盡此三升即下腹惡血一二升立瘥當養之如新產者

大黃湯

出千金方

治產後惡露不盡

大黃

當歸

甘草

生薑

牡丹

芍藥

各三兩

吳茱萸

一分

右呖咀水一斗煮取四升去滓分四服一日令盡加人參二兩名人參大黃湯

蛇黃散

出千金方

治產後血傷不止或下血痢以蛇黃二十

枚火煨醋淬七次搗羅為散每服三錢米飲送下

蒲黃湯

出千金方

治產後餘積有積血不出腹大短氣不得

飲食上衝胃脇時煩憤逆滿手足悁疼胃中結熱

蒲黃

半兩

大黃

芒硝

黃芩

大棗

三十枚

甘草

一兩

右咬咀以水五升煮取一升清晨服五合至日中下
若不止進冷粥半盞即止若不下反少與熱飲自下

人羸者半之千金翼名大黃湯而不用芒硝

銅鏡鼻湯

出千金方

治產餘疾惡露不除積聚作病血氣結

搏心腹疼痛

銅鏡鼻

十八銖燒末

芍藥

芎藭

乾漆

乾地黄

芒硝

各二兩

亂髮

雞子大灰

大棗

三十枚

大黃

二兩半

右㕮咀以水七升煮取二升二合內髮灰鏡鼻末分

三服

小銅鏡鼻湯

出千金方

治產後餘疾惡露不除積聚作病血

氣結搏心腹疼

銅鏡鼻

十銖燒末

甘草

黃芩

大黃

芒硝

乾地黄

各三兩

桃仁

五十枚

右㕮咀以酒六升煮取三升去滓內銅鏡鼻末三服

亦治遁尸心腹痛及三十六尸疾

梔子湯

出千金方

治產後流血不盡小腹絞痛

用梔子三十個以水一斗煮取六升內當歸芍藥

各二兩蜜五合生薑五兩羊脂五兩於梔子汁中

煎取二升分三服日三

生地黄湯 治產後三日至七日腹中餘血未盡絞痛

生地黄五兩生薑三兩大黃 芍藥

茯苓 細辛 桂心 當歸

甘草 黃芩各一兩半大棗二十枚

右㕮咀以水八升煮取二升半去滓分三服日三

麻子酒出千金方治產後血不去

用麻子五升搗碎以酒一斗漬一宿明旦去滓溫
一升先食服不效夜服一升不吐不下忌房事一
月將養如初產法

升麻湯

出千金方

治產後惡物不盡或經一月半歲一歲

用升麻三兩以清酒五升煮取二升去滓分溫二
服當吐下惡物甚良

治產後惡血不盡腹中絞痛刺不可忍

出千金方

大黃

黃芩

桃仁

各三兩

桂心

甘草

當歸

各二兩

芍藥

四兩

生地黃

六兩

右㕮咀以水九升煮取二升半去滓食前分三服

治產後惡血不除四體並惡方

出千金方

用續骨木碎如筭子大以水一斗煮取三升分三

服相去如人行十里久間食粥或小便數或惡血

下即瘥此木得三遍煮

羚羊角散

出肘後方

治產後惡血下不盡煩悶腹痛

方見本門血暈

治產後餘血不盡奔上衝心悶腹痛

出千金方

搗生藕汁取飲二升甚驗一方飲一升

治產後有血心煩腹痛

出大全良方

用生地黃汁不拘多少以清酒一升將地黃汁和

煎二十沸分三服

又方

出千金方

用赤小豆搗散取東流水和服方寸匕不瘥更服

亦治心悶目不開

治產後血不可止者

出聖惠方

乾菖蒲三兩以酒五升漬煮取三升分再服即止

桃仁湯

出大全良方

治產後惡露方行忽然漸少斷絕不來

腰中重痛不止兩腹痛如錐刀刺痛入骨中此由血滯

於經絡不即通之有大痛處必作癰疽宜桃仁湯恐作

癰者預服五香連翹飲

桃仁

去皮尖

蘇木

生地黄

各半兩

蜜蟲

炒去足翅

水蛭

炒各三十個

右為粗末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服無

時候惡露下即住服

五香連翹湯產經治產後惡露不絕者由產後傷於經血

虛損不足或分解之時惡血不盡在於腹中而臟腑挾於宿冷致氣血不調血故令淋漓不絕也

木香

沉香

丁香

乳香

麝香

升麻

獨活

連翹

桑寄生

木通

各二兩

右為粗散每服五錢水二盞入竹瀝少許攪停去滓

溫服一方有大黃一兩

療產後惡露不多

出大全良方

川牛膝

大黃

各八分

牡丹皮

當歸

各六分

芍藥

蒲黃

桂心

各四分

右為末生地黄汁調酒服方寸匕日二服血下愈

沒藥丸

出大全良方

治產後惡露方行而忽然斷絕驟作寒

熱臍腹百脉皆痛如以錐刺非常此由冷熱不調或思慮動作氣所壅過血畜經

當歸

桂心

芍藥

各半兩

桃仁

去皮尖炒碎研

沒藥

研各一分

螭蟲

去足翅炒

水蛭

炒各三十個

右為末醋糊丸如豌豆大醋湯三丸下

澤蘭湯

出千金方

療產後惡露不盡腹痛往來兼胸滿少氣

蓋產後惡露不盡腹痛者何答曰產後惡血雖常通行或因外感五邪內傷七情至截然而止餘血停積壅滯不行所下不盡致令腹痛皆因妊娠當風取涼則胞絡有冷至於產時其血必少減新產時而取風涼此日令

風冷搏於血血壅滯則不得宣通蓄積在內有時惡露不盡故令腹痛急引腰背

甘草

分六

大棗

十四枚

右細切以水九升煮取三升分為三服日三墮身欲死服即瘥

救急惡露不盡腹脹痛

取亂髮和雞子灰汁洗淨燒為灰酒調服二錢

又療產後血不盡痛悶方

出肘後方