

幼科證治準繩集之四

心部二

金匱王肯堂李泰甫輯

痘瘡上

溯源

錢氏曰夫胎在腹中月至六七則已成形食母腹中穢液入兒五藏食至十月卽穢液滿胃至生時兒口
中猶有不潔產母以手拭淨則無疾病俗以黃連承
粉下其膾糞之穢此亦母之不潔餘氣入兒藏中本
先因微寒又遇風寒邪氣相搏而成痘疹也未出疹

作之時熱動五藏則五藏之證先見初欲病時先呵欠頓悶驚悸乍涼乍熱手足冷面腮頰赤燥咳嗽噴嚏此五藏證俱見也呵欠頓悶者肝也時發驚悸者心也乍涼乍熱手足冷者脾也面赤顚頰赤咳嗽噴嚏者肺也惟腎無候以在腑下不能食穢故也凡瘡疹乃五藏毒若出歸一證肝水疱肺膿癥心爲症脾爲疹腎雖無證其候惡者瘡變倒黽而黑陷則歸腎也此由不慎風冷而不能食內虛所致也 東垣曰瘡疹始出之證必先見面燥顚赤目胞亦赤呵欠頓悶乍熱乍涼咳嗽噴嚏足稍冷多睡睡驚竝瘡疹之

證或生膿泡大癥或生小紅癥或生癰疹此三等不同何故俱頭上證而後乃出蓋已上諸證太陽寒水起於右腎之下煎熬左腎足太陽膀胱寒水夾脊逆流上頭下額逆手太陽內火不得傳道逆於面上故顯是證蓋壬癸寒水克丙丁熱火故也諸癥證皆從寒水逆流而出也醫者當知此理乃敢用藥夫胞者一名赤宮一名丹田一名命門男子藏精施化婦人繫胞有孕俱爲生化之源非五行也非水亦非火此天地之異名也象坤土之生萬物也夫人之始生也血海始淨一日二日精勝其血則爲男子三日四日

五日血脉已旺精不勝血則爲女子乃二物相搏長
先身生謂之 又謂之精其子在 十月之間隨
母呼吸呼吸者陽氣也而生動作滋益精氣神饑渴
皆隨母血兒隨日長筋骨皮肉血脉形氣俱足十月
降生口中尚有惡血啼聲一發隨吸而下此惡血復
歸命門胞中僻於一隅隱伏而不發直至兒因內傷
乳食濕熱之氣下咽合於腎中二火交攻榮氣不從
逆於肉理惡血乃發諸癥瘕皆出於腎水其瘍後聚
肉理歸於陽明故三番癰始顯之證皆足太陽王膀
胱丸丙小腸其始出皆見於面終歸於陽明肉理盡

化爲膿者也二火熾盛反勝寒水遍身俱出此皆
足太陽傳變中來也萬氏曰痘疹之原有論穢毒
者有論溼火者有論時行正病者靡有定論將謂穢
毒淫火耶則一歲之中大而郡縣小而村落病者相
似而死相繼未必人人若此之甚也將謂時行正病
邪何以自少至老但作一度癰後再無傳染也蓋父
母於子一體而分精血之毒已畜於陽施陰化之始
固不待誕生之頃嘸其血而後有其精也况男子惜
其氣以養其精女子耗其氣以養其血苟失所養卽
貽他日之患者之受於父母者雖殊其爲毒則一也

豈有男子淫火起於氣爲陽毒而易治女子淫火起
於血爲陰毒而難治之理邪至於天行正病亦有其
時但觀夫年之所加及有四時不正之氣卽知有是
正病也然則待時而發者胎毒也或速而危或徐而
持或累而死者氣之微甚所使也發則其毒洩矣所
以終身但作一度後有其氣不復傳染焉痘爲胎
毒昭昭矣其間或疎而輕或密而重或重變輕或輕
變重變化叵測是又有說也疎而輕者始終如一密
而重者變恆百出或因父母相傳而然或因疫癘相
染而然或因鬼疰相著而然杳冥恍惚出於聞見思

慮之所不及此與智者道之癡人前不必說夢也何
者蓋痘疹之毒父母原有之雖常作過一番而臟
腑經絡皮毛肌肉骨髓之間餘毒猶有存者一旦分
形化氣注之於子其毒亦隨之洩矣所以子之瘡痏
多肖親也加之調攝失宜放恣無忌其毒益甚瘡痏
之候沉困危篤者未必非父母之所致也凡子之侏
儒跛躄必肖於親况疹痘之毒乎且人受天地之氣
以生天地之氣變人之氣亦變或遇遷正失守淫勝
鬱復之紀德令乖常青蓄迭見自然厲氣傳染證候
相似所以輕則俱輕重則俱重若有主之者是則疫

癘之所爲也故人之癘疾而死者精靈不散游竄往來隨氣而行常以其氣染於平人而爲之疾如瘵癩之傳染然形質龐厚福澤悠遠者不能相及苟體虛福薄之人陰陽舛亂之歲則畜育之堅臺駘之祟互相染著反復變化術不能禁工不能治也此非鬼疰之害乎夫治此三者當奈何曰必爲之豫解其毒平其氣遷其處庶乎可免矣 按痘疹之發顯是天行時氣壘市村落互相傳染輕則俱輕重則俱重雖有異於衆者十之一二而已豈可槩謂胎毒哉然疫癘終身不染者比比皆是而痘疹無一人得免疫癘一

染之後不能保其不再染而痘瘡一發不再發則胎
毒之說又何可盡廢乎至謂淫火穢血古亦有之而
何獨無痘疹之患欲以破胎毒之說則又不然天下
之無而忽有者多矣草有名虞美人者虞美人項玉
寵姬也爲項王死世哀之爲之歌對草倚聲悽慟而
草輒搖草無譎識也方其未有楚則寵姬亦無況有
草耶一切衆生自妄顛倒而成三界如之又何疑乎
痘疹

預防

萬痘瘡之病皆由父母胎毒竄於命門之中命門者

右腎相火也爲人身生化之本故毒藏焉如遇冬令溫和陽氣繁茂人則感之觸動相火至春夏生長之時其毒迺發傳染相似是謂天行疫癘也未出痘疹者但覺寒溫卽當預防宜服解毒之藥如辰砂散三豆湯代天宣化丸皆可用也頻頻與之使瘡疹之毒輕減自然易出易收無陷伏鬱遏留連之患 其辰砂散三豆湯代天宣化丸以解時行疫癘之毒則可或因父母精血不足者或其人素有他疾者或發熱之時別臟形證發見者竝宜兼而治之不可徒恃解毒而竟忘其本也如脾胃素弱者宜以養脾爲重解

毒次之養脾丸服三之二解毒三之一如因父母奉
養過厚精血畜毒素多胎病者宜二毒併解以遡源
解毒湯代天宣化丸相間服之 丹溪云痘疹初出
時或未出時見時人有患者宜預服此藥多者令少
重者令輕以絲爪近帶三寸連皮子燒灰存性爲末
沙糖拌勻乾喫入硃砂末更妙

三豆湯

赤小豆

黑大豆

菉豆各一升生

小甘草

三兩生剉

右以三豆淘淨同甘草用雪水八升

如無用長者流大代之者

豆熟爲度去甘草將豆曬乾又入汁再浸再曬
盡爲度逐日取豆水煮任意食之

代天宣化丸

卽韓氏五瘟丹如減也

人中黃

屬土甲巳年爲君

黃芩

屬金乙庚年爲君

黃柏

屬水丙辛年爲君

黃柏

梔子仁

屬木丁壬年爲君

黃連

屬火戊癸年爲君

苦參

佐

荆芥穗

佐

防風

去蘆佐

連翹

酒洗佐

山豆根

佐

牛蒡子

酒淘炒左

紫蘇葉

佐

先視其年所屬取其藥以爲君其餘主歲者爲臣
爲君者倍之爲臣者半之爲佐者如臣四分之三
於冬至日修合爲末取雪水煮升麻和竹瀝調神

廻爲丸外用辰砂雄黃爲衣每服竹葉湯下
製入中黃法取甘草大者不拘多少用新竹一節
納甘草於中仍緊塞無節空處放屎缸中浸七七
日取出曬乾聽用

通涼解毒湯

當歸身

川芎

生地黃

白芍藥

人參

連翹

黃連

生甘草

陳皮

木通

各等分

右剉細加淡竹葉拾斤水一盞煎半盞去渣溫服

無時

養脾丸

人參

白术

當歸

川芎

各一
半

木香

青皮

黃連

陳皮

各一
半

砂仁

山杏肉

神曲

炒

麥芽

炒各
五分

右爲細末水調神麴糊丸如豚子大每服三五十

丸陳蒼米飲下

消癰丹

未曾出痘及臨出者
宜擇痘空日預服

辰砂研爲極細末水飛過週歲以下
者伍座分一歲以上者服一升

絲瓜

近帶者卷寸穗有性爲未亦如前數

右用蜜調下或將鴿子及鴿煮熟以辰砂擦至全兒服之亦可屢試有驗

祕傳保嬰丹

真紫草

去蘆酒洗勿犯銹器

纏豆藤

燒灰存性各肆
味爲君

升麻

取新者鹽水炒引
下不使侵肺氣

川防風

去蘆及叉

荆芥穗

去梗

牛蒡子

炒各二兩
味爲臣

真天竹黃

人蟾酥

自取勿用
赤眼者

真牛黃

三味各一
千

大朱砂

林黃紫草荔枝殼煮過就將其湯
飛研取淨未三茶
四味爲佐

甘草梢去皮二

和雨

赤小豆

黑小豆

綠豆

各取十粒炒勿令焦
味爲使

右各取細末和勻另用紫草叁兩入水叁碗煎去查熬成膏半碗入生砂糖半碗和劑爲丸如芡實大另用飛過朱砂爲衣未出痘之先濃煎甘草湯每小兒磨一丸大人二丸如已發熱之時生薑湯磨服厚蓋取汗多者可以少者可無大有神効袁氏痘前沿法凡欲治痘須在未發之先預識其證而分別用藥重者可輕輕者必愈但未痘而愈則醫者無功故多不肯盡心及其既發又無及矣仁者須以救生保嬰爲心寧我無功不可使明兒失命備陳