

卷三十四

松峯說疫

松峯說疫卷之三

諸城劉奎松峯著輯

男秉錦濯西述較

福出劉嗣宗南埃叅閱

表姪李逢虔謹菴錄

雜疫

葡萄疫

小兒多患此症以受四時不正之氣鬱於皮膚結成大小青紫斑點色若葡萄發在遍體頭面乃爲腑症邪毒傳胃牙根出血久則必至虧損初起宜服羚羊角散清熱涼血久則胃脾湯滋益其內又有牙根腐爛者人中曰散

加羚羊角散 此方銀花羌活僵蚕生地等皆可酌入

羚羊角 末 防風 麥冬 去心 元參 知母 酒炒

黃芩 牛蒡子 炒 甘草 節 金銀花 淡竹葉十餘片 煎服

胃脾湯 此湯必實有不足之症方可用初起切勿輕投

白朮 土炒 茯神 陳皮 遠志 去心 麥冬 去心

沙參 五味子 研 甘草 節 虛弱自汗者去沙參 加參芪

人中白散 治小兒走馬牙疳牙齦腐爛黑臭

人中白 尿盡中白 城煨 兩 兒茶 五錢 黃稻 薄荷

青黛 各三錢 冰片 二分 五厘 共為細末先用溫湯漱淨次

藥于瘡上日六七次吹藥延從外流者吉內收者凶

捻頸瘟

其症喉痺失音頸大腹脹如蝦蟇者是也宜荆防敗毒散

荆防敗毒散

荆芥

防風

羌活

獨活

柴胡

前胡

桔梗

枳殼

麩炒

川芎

酒洗

茯苓

人參

甘草

姜葱煎食遠服發冷倍用葱

蝦蟇瘟

其症咽喉腫痛涕唾稠粘甚則往來寒熱身痛拘急大便

秘結有類傷寒亦與捻頸瘟相似但以不腹脹爲異治法
京散和解攻下敗毒隨症施治無不獲愈方俱散見各醫
書本門不多贅其治瘡捷法於初起時用手在病人兩臂
自肩頭極力將其中凝滯癰氣惡血趕至手腕數次用帶
子將手腕札住不令惡血走散用針刺少商穴并十指近
甲益薄肉正中處捻出惡血則愈少商穴在大指外邊爪面靠
甲角處摸有穴者是
又法將脖項患處口啣鹽水用力吮咽俟其皮色紅紫成
片則愈或用針將項下一挑手捻針孔出血密上挑捻愈

大頭瘟

外科門亦
名時毒

此症有陰陽有可汗不可汗者

其發於頭上并腦後項腮頰與目赤腫而痛發熱症似傷寒治療散見各醫書本門茲不多贅用前刺法亦妙

大力子丸 兼治啞瘡

元參

連翹 去隔

甘草

桔梗

川大黃

生熟
酌用

石膏

煨研

川連

酒炒

黃芩

酒炒

荆芥

防風

羌活

大力子

炒研

爲末作丸或姜煎服亦可

又方

蠶蚕

二兩
浸

大黃

二兩

姜汁丸彈子大蜜水和服一丸

又方

普濟消毒飲

見醫方集解專治大頭瘟初起

又方

大頭瘟生疔瘡及喉閉並將疔瘡刺出血卽愈

瓢音羊反
中定

瓜瓢瘟

其症胃高脇起嘔汁如血宜生犀飲

生犀飲

黃土

五錢

犀角

二錢

蒼朮

油炒

川連

芥山茶一撮

鎊音傍削
也
界音介山
名

流水煎入金汁和服日三夜二虛加入參

鹽水炒

大便結加大黃

渴加花粉

表熱去蒼朮黃土加桂

枝

性熱似不宜當酌加別解表藥

便膿血去蒼朮倍黃土加黃柏使便

滑人中黃代金汁

楊梅瘟

形似楊梅

其症遍身紫靛忽發出黧瘡者是也用清熱解毒湯下人

中黃丸并刺靛出血

黧音枚物
着濕變色

清熱解毒湯

川沛

酒洗

黃芩

酒洗

生地

白芍

酒炒

石羔

煨研

知母

鹽酒炒

人參

甘草

升麻

葛根

羌活

日三服夜二服姜煎

人中黃丸

大黃

三兩
尿浸

蒼朮

油炒

桔梗

滑石

各二兩

人參

川連

酒洗

防風

各五錢

香附

兩半姜汁
浸生用

人中黃

二兩如無
坑垢代之

麴糊爲丸清熱解毒湯送 如氣虛用四君子湯送

如血虛四物湯送 痰甚二陳湯送 熱甚蜜便送

錦按二方用參非取其補取其鼓舞之以祛和也

疔瘡瘰

其症發魄如瘤遍身流走且發久死三稜針刺入委中三分出血並服人中黃散 委中穴在兩腿屈盤當中前對膝蓋

人中黃散

人中黃 一兩 明雄

硃砂 各一兩共爲末薄荷桔梗湯下二錢日三夜二

消毒丸 治時疫疔瘡惡症

大黃

牡蠣煨

僵蚕

泡去涎炒

各一兩

共爲末煉蜜丸彈子大新汲水化下一丸無時

軟腳瘰

其症便清泄白足腫難移

卽濕

宜蒼朮白虎湯

卽白虎湯加蒼朮

絞腸瘟一名痧

其症腸鳴乾嘔或水瀉氣不通則探吐之宜双解散有陰

陽二症

陰痧 腹痛手足冷身上有紅點用燈草蘸油點着將

痧之 陽痧 腸痛手足暖以針刺少商穴並十指尖近

也 焮音烈 燒

甲處 刺法見前此刺法治諸中霍亂咽喉等病俱效

陰陽水方

滾水

一盅

冷水

一盅

對服立愈或加炒鹽少許妙

觀音救苦丹

磨點眼角二三次兼治咽喉諸症哈麥大一魂化嚙一切腫毒惡瘡蛇蝎傷津研察患處

火硝

一兩

白礬

四兩

黃丹

二兩

硃砂

明雄

各五

分

以上二方兼

治陰陽二痧

唱凡多而雄硃太小豈五不說生五分即

共細研勻化開候稍冷搓成小錠磁器收貯所用

氣母出

地漿

于南墻背陰處掘一坑入凉水一確繳之再候澄

清取飲

又方

生明凡

未二錢

冷水滾水各半盅調服

又方

菜豆

一二升

水二三桶熬湯以甕貯之令病人澆洗

稍冷全身入甕中泡透或稍愈且母遽出效

雙解散

即防風通聖散

洩瀉去硝黃自汗去麻黃加佳

防風

荊芥

薄荷

麻黃

白朮

上炒
汁浸

川芎

酒洗

當歸

酒洗

白芍

酒炒

連翹

去隔

山梔

炒

黃芩

石膏

煨

桔梗

甘草

滑石

末

芒硝

大黃

生熟
酌用

醫方集解之雙解散減去硝黃

引用生姜芎煎

以上四方專治陽痧

鷓鴣瘟

其症兩腮腫脹增寒惡熱

外用赤小豆柏葉共搗爛水

醋調敷內服薄荷濃煎湯服之

龍鬚瘟

其症喉硬舌強並聾耳中急以針刺喉上橫七針豎七針

硃砂

不拘多少研

蜜一匙

入燒酒和勻灌之

芋頭瘟

其症昏沉不食用芋頭燒灰存性研黃酒送下

蠍子瘟

其症喉痛發熱惡心痛連腮煩頭亦痛喉旁有疙瘩四散

紅如蠍爪壓舌針挑之要挑爪不可挑頂每爪上挑一

針令血出旋以硃砂末搽之再令醋少許即愈如刺當
中頂即為傷蠚蓋必出膿不食而危

版腸瘟

刮出紫疙瘩六個即難治

其症初發如傷寒熱病三四日小腹脹滿

不治數日即死

用麻一

縷

如指粗

先自兩肩頭刮至手腕刮出紫疙瘩針刺破擗去

惡血又自兩大腿跟刮至兩足跟有紫疙瘩刺破去惡血

俱男先右

又自咽喉窩刮至臍下刺法如前即時汗愈

女先右

脇痛瘟

一名結肋瘟甚惡不治數日即斃

其症但脇肋痛羅白切片蘸麝酒刮痛處出痧即愈未愈

用豆油一大盞銅杓熬三分之一服之愈又法青布包黑
凡蘸燒酒刮痧又法烙香油厚餅碗口大乘熱貼痛處冷
卽易可用三四餅餅棄勿食忌生冷

螫青茅俗
名班貓

刺螫瘟痧

其症壯熱煩悶遍身痛如螫刺所傷俗名螫刺瘟以痧治
之林月溪患時疫壯熱口渴胸腹迷悶手摩之如螫刺傷
痛遍體皆然因放腿灣痧甘餘針毒血成流用山甲天虫
角刺加活血順氣藥稍飲之而痊

八虫卽蠶
蠶角刺卽
刺

地葡萄瘟痧

此症見下
聖妙

暑熱時疫惡毒之氣攻於裡則為痰喘為血瘀昏迷沉重

不省人事若元氣壯實內不受邪不入于裡即散其毒于

肌膚血肉之表為腫為脹忌飲熱湯熱酒刺腿灣痧筋並

十指尖出毒血內服寶花散治痧仙劑 鬱金一錢 細辛三錢 降香三錢

荆芥四錢 共為細末清茶調三匙冷服○桃仁紅花湯治血疑結

桃仁去皮 紅花蘇木各一錢 青皮八分 烏藥四分 獨活六分 白蒺藜

去刺搗末 水煎服○紫朴湯治痧有食氣壅盛者 厚朴姜汁炒 山查葡萄

子研 三稜莪朮枳實炒 連翹去 青皮陳皮細辛等分 水煎冷

服

手足麻瘋

其症先少腹痛作羊毛疔挑之無血隨作紫疙瘡手足麻

麻至不知人而死急令人以足踏病者手之三關脉上

男

左手女用力踏勿放直待四支不麻病人自覺心頭發火

踏右手方放之自愈若放之早雖愈後亦纏滯三關脉即兩手寸

口診脉處

扣頸瘋

此症仕宦僕友不可不知倘遇患此死者而顧執言爲人所逼勒可乎可補洗冤錄一則

聞之老醫臧枚吉云余髫時聞先祖言凡人無故自縊者

爲扣頸廬伊時未解詳問及後遍閱方書並無此說辛巳