

欽定四庫全書

子部

肘後備急方卷三



北京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

肘後備急方卷三

治寒熱諸瘧方第十六

治瘧病方鼠婦豆豉二十七枚合搗令相和未發時服二

九欲發時服一九

又方青蒿一握以水二升漬絞取汁盡服之

又方取獨父蒜於白炭上燒之末服方寸匕

晉 葛洪 撰

又方五月五日蒜一片去皮中破之刀割令容巴豆一枚去心皮內蒜中令合以竹夾以火炙之取可熟搗為三丸未發前服一九不止復與一九

又方取蜘蛛一枚蘆管中密塞管中以縮頸過發時乃解去也
又方日始出時東向日再拜畢正長跪向日叉手當閉氣以書墨注其管兩耳中各七注又丹書舌上言子日死畢復再拜還去勿顧安卧勿食過發時斷即差
又方多煮豉湯飲數升令得大吐便差

又方取蜘蛛一枚著飯中合丸吞之

又方臨發時搗大附子下篩以苦酒和之塗背上

又方鼠婦蟲子四枚各一以飴糖裹之丸服便斷即差

又方常山搗下篩成末三兩真丹一兩白蜜和搗百杵

丸如梧子先發服三丸中服三丸臨卧服三丸無不

斷者常用效

又方大開口度上下脣以繩度心頭灸此度下頭百壯

又灸脊中央五十壯過發時灸二十壯

金匱要略卷三
又方破一大豆去皮書一片作日字一片作月字左手持日右手持月吞之立愈向日服之勿令人知也

又方皁莢三兩去皮炙巴豆二兩去心皮搗丸如大豆大一服一枚

又方巴豆一枚去心皮射蔞如巴豆大棗一枚去皮合搗成丸先發各服一丸如梧子大也

又方常山知母甘草麻黃等分搗蜜和丸如大豆服三丸比發時令過畢

又方常山三兩甘草半兩水酒各半升合煮取半升先發時一服比發令三服盡

又方常山三兩劉以酒三升漬二三日平旦作三合服欲嘔之臨發又服二合便斷舊酒亦佳急亦可煮

又方常山三兩秫米三百粒以水六升煮取三升分之服至發時令盡

又方若發作無常心下煩熱取常山二兩甘草一兩半合以水六升煮取二升分再服當快吐仍斷勿飲食

老瘡久不斷者常山三兩鼈甲一兩炙升麻一兩附子
一兩烏賊骨一兩以酒六升漬之小令近火一宿成
服一合比發可數作

又方藜蘆阜莢各一兩炙巴豆二十五枚並搗熬令黃
依法搗蜜丸如小豆空心服一丸未發時服一丸臨
發時又一丸勿飲食

又方牛膝莖葉一把切以酒三升服令微有酒氣不即
斷更作不過三服而止

又方末龍骨方寸匕先發一時以酒一升半煮一沸及
熱盡服溫覆取汗便即效

又方常山三兩甘草半兩知母一兩搗蜜丸至先發時
服如梧子大十九次服減七丸八丸後五六丸即差
又方先發二時以炭火床下令脊脚極暖被覆過時乃
止此治先寒後熱者

又方先炙鼈甲搗末方寸匕至時令三服盡用火炙無
不斷

又方常山三兩搗篩雞子白和之丸空腹三十丸去發
食久三十丸發時三十丸或吐或否也從服藥至過
發時勿飲食

治溫瘧不下食知母鼈甲炙常山各二兩地骨皮三兩
切竹葉一升切石膏四兩以水七升煮二升五合分
三溫服忌蒜熱麪猪魚

治瘴瘧常山黃連豉熬各三兩附子二兩炮搗篩蜜丸
空腹服四丸欲發三丸飲下之服藥後至過發時勿

喫食

若兼諸痢者黃連犀角各三兩牡蠣香豉各二兩並熬
龍骨四兩搗篩蜜丸服四十九日再服飲下

無時節發者常山二兩甘草一兩半豉五合綿裹以水
六升煮取三升再服快吐

無問年月可治三十年者常山黃連各三兩酒一斗宿
漬之曉以瓦釜煮取六升一服八合比發時令得三
服熱當吐冷當利服之無不差者半料合服得

勞瘧積久衆治不差者生長大牛膝一大虎口以水六升煮取二升空腹一服欲發一服

禳一切瘧是日抱雄鷄一時令作大聲無不差

又方未發頭向南卧五心及額舌七處閉氣書鬼字時
呪法發日執一石於水濱一氣呪云胷胷圓圓行路非難
捉取瘧鬼送與河官急急如律令投於水不得迴顧
治一切瘧烏梅丸方甘草二兩烏梅肉熬人參桂心肉
蓯蓉知母牡丹各二兩常山升麻桃仁去皮尖熬烏

豆皮熬膜取皮各三兩桃仁研欲丸入之搗篩蜜丸
蘓屠白搗一萬杵發日五更酒下三十丸平旦四十
丸欲發四十丸不發日空腹四十丸晚三十丸無不
差徐服後十餘日喫肥肉仍發也

丸見瘡白驢蹄二分熬大黃四分菜豆三分末砒霜二
分光明砂半分雄黃一分搗蜜丸如梧子發日平旦
冷水服二丸七日内忌油

附方

外臺祕要治瘡不痊乾薑高良薑等分為末每服一錢水一中盞煎至七分服

聖惠方治久患勞瘡瘴等方用鼈甲三兩塗酥炙令黃去裙為末臨發時溫酒調下二錢匕

治瘡用桃仁一百箇去皮尖於乳鉢中細研成膏不得犯生水候成膏入黃丹三錢丸如梧子大每服三丸當發日面北用溫酒吞下如不飲酒井花水亦得五月五日午時合忌鷄犬婦人見

又方用小蒜不拘多少研極爛和黃丹少許以聚為度
丸如鷄頭大候乾每服一丸新汲水下面東服至妙

治卒發癲狂病方第十七

治卒癲疾方灸陰莖上宛宛中三壯得小便通則愈

又方灸陰莖上三壯囊下縫二七壯

又方灸兩乳頭三壯又灸足大指本聚毛中七壯灸足

小指本節七壯

又方取葶藶一升搗三千杵取白犬倒懸之以杖犬令

血出承取以和葶藶末服如麻子大一丸三服取差
又方葶藶子三升酒五升漬之出曝乾漬盡酒止搗服
一錢匕日三勿多益狂

又小品癲狂葶藶散葶藶子三升末之酒一升漬多日
出搗之以向汁和絞去滓湯上煎令可丸服如小豆
三丸日三口面當覺急頭中有蟲行者額及手足應
有赤色處如此必是差候若未見服取盡矣

又方末房葵溫酒服一刀圭至二三身潤又小不仁為

候

又方自縊死者繩燒三指撮服之

凡癲疾發則仆地吐涎沫無知彊掠起如狂反遺糞者
難治

治卒發狂方燒蝦蟇搗末服方寸匕日三服之酒服
又方卧其人著地以冷水淋其面為終日淋之

治卒狂言鬼語方針其足大拇指爪甲下入少許即止
又方以甌帶急合縛兩手火灸左右脇握肘頭文俱起