

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷五十七



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

證治準繩卷五

女科

調經門

赤白帶下

醫方

長病源論

婦人有七事

明 王肯堂 撰

疾者七癥八瘕九痛十

人唯知赤白二帶耳此

欽定四庫全書

證治準繩

一

由勞傷衝任風冷據於胞絡婦人平居血欲常多氣欲常少百疾不生或氣倍於血氣倍生寒血不化赤遂成白帶若氣平血少血少生熱血不化紅遂成赤帶寒熱交并則赤白俱下其脉右手尺浮浮為陽陽絕者無子若足冷帶下輕則漏下甚則崩中皆心不榮血肝不藏血所致其脉寸口弦而大弦則為減大則為芤減為寒芤為虛寒虛相搏其脉為革主半產漏下又尺寸脉虛者漏血漏血脉浮者不可治 產寶帶下三十六疾者

是十二癥九痛七害五傷三固謂之三十六疾也十二
癥者是所下之物一者如膏二者如青血三如紫汁四
如赤皮五如膿痂六如豆汁七如葵羹八如凝血九如
清血似水十如米泔十一如月浣十二如經度不應期
也九痛者一陰中痛二陰中淋痛三小便痛四寒冷痛
五月來時腹痛六氣滿來時足痛七汗出陰中如蟲齧
痛八脇下皮痛九腰痛七害者一害食二害氣三害冷
四害勞五害房六害姙七害睡五傷者一竅孔痛二寒

冷痛三小腹痛四臟不仁五子門不正引背痛三固者
月水閉塞不通其餘二者文缺不載而仲景所說三十
六種疾皆出子臟冷熱勞損而夾下起於陰內也

戴赤白帶羅先生法或十棗湯

方見傷寒
脇滿痛

或神佑丸

方見

雜病
痰飲

或玉燭散

即四物加
調胃承氣

皆可用之虛者不可峻攻實

者可行

血虛加減四物湯

氣虛以朮參陳皮間與

之

赤屬血白屬氣主治燥濕為先

濕甚者固腸丸

方見
後

相火動者諸藥中加炒藥

滑者加龍骨赤石

脂 滯者加葵花

白者治白帶
赤者治赤帶

性燥者加黃連

寒

月少加薑附臨機應變先須斷厚味帶下與夢遺同法治之 肥人有帶多是濕痰用海石半夏南星炒蘗青

黛蒼朮川芎

瘦人帶病少如有多是熱用炒蘗蛤粉

滑石川芎青黛樗皮

帶漏俱是胃中痰積流下滲膀胱

出於大腸小腸宜升提甚者上必用吐以提其氣下

用二陳湯加白朮蒼朮仍用丸子

戴赤白帶下皆因七情內傷或下元虛冷感非一端大

率下白帶多間有下赤者並宜順氣散吞震靈丹仍佐
艾附丸或米飲調沙參末帶下不止成疴羸者四物湯
加煨牡蠣粉半錢吞固陽丸多服取效

固陽丸方見
雜病遺精門

有帶疾愈後一二月或再發半年一發先血而後下帶
來不可遏停蓄未幾又復傾瀉此名漏帶最為難治

下截之血小腹主之有因血虛而虛熱陷入小腸致小
便澀痛色白如泔或成沙粒皆不可作淋治用冷劑宜
以四物湯五苓飲各半貼和煎 良婦人帶下其名有

五因經行產後風邪入胞門傳於臟腑而致之若傷足厥陰肝經色如青泥傷手少陰心經色如紅津傷手太陰肺經形如白涕傷足太陰脾經黃如爛瓜傷足少陰腎經黑如衄血人有帶脉橫於腰間如束帶之狀病生於此故名為帶 薛徐用誠先生云前證白屬氣而赤屬血東垣先生云血崩久則亡陽故白滑之物下流未必全拘於帶脉亦有濕痰流注下焦或腎肝陰淫之濕勝或因驚恐而木乘上位濁液下流或思慕為筋痿戴

人以六脉滑大有力用宣導之法此瀉其實也東垣以脉微細沉緊或洪大而虛用補陽調經乃兼青其虛也丹溪用海石南星椿根皮之類乃治其濕痰也竊謂前證皆當壯脾胃升陽氣為主佐以各經見證之藥色青者屬肝用小柴胡加山梔防風濕熱壅滯小便赤濇用龍膽瀉肝湯肝血不足或燥熱風熱用六味丸色赤者屬心用小柴胡加黃連山梔當歸思慮過傷用妙香散等藥色白者屬肺用補中益氣加山梔色黃者屬脾用

六君子加山梔柴胡不應用歸脾湯色黑者屬腎用六味丸氣血俱虛八珍湯陽氣下陷補中益氣湯濕痰下注前湯加茯苓半夏蒼朮黃檗氣虛痰飲下注四七湯送六味丸不可拘肥人多痰瘦人多火而以燥濕瀉火之藥輕治之也

潔治帶下少腹冤結而痛者先以十棗湯下之次服苦楝丸大玄胡散調之是先攻後補之法也

治結痰白帶以小胃丹半飢半飽津液下數丸候鬱積

行卻服補藥

白朮一兩 蒼朮半兩 紅白葵花二錢半 白芍藥七錢半

右蒸餅為丸空心煎四物湯下廿丸

陶遵道外姑年七十形瘦善啖白帶食前薑湯吞大補丸五十九二次午膳後及臨臥時各與小胃丹十五丸愈

子和頃頓丘一婦人病帶下連縣不絕白物或來已三載矣命予脈之診其兩手脈俱滑大而有力得六七至

常上熱口乾眩暈時嘔酢水余知其實有寒痰在胸中
以瓜蒂散吐出冷痰二三升皆酢水也間如黃涎狀如
爛膠次以漿粥養其胃氣又次用導水禹攻以瀉其下
然後以淡劑滲泄之藥利其水導不數日而愈 息城
李佐衙之妻病白帶如水竊漏中綿綿不絕臭穢之氣
不可近面黃食減已三年矣諸醫皆云積冷陽起石硫
黃薑附之藥重重燥補汚水轉多戴人斷之曰此帶濁
水本熱乘太陽經其寒水不禁固故如此也夫水自高

而趨下宜先絕其上源乃涌痰二三升次日下沃水斗餘行三遍汗出周身至明旦病人云汚已不下矣次用寒涼之劑服及半載產一男

燥劑有濕痰而弱不禁攻者燥之熱濕宜涼燥寒濕宜溫燥

樗皮丸

治赤白帶有濕熱者

芍藥

五錢

良薑

三錢 燒灰

黃

藥

二錢各 炒成灰

椿根皮

半兩

右為末粥丸每服三五十九丸空心米飲下

赤白帶因濕熱勝而下者

蒼朮

鹽炒

白芍藥

各一兩

枳殼

三錢椿根皮

炒二兩

乾薑

煨二兩

地榆

半兩

甘草

三錢

滑石

二兩炒

為末粥丸米飲下

治帶下

椿根皮

二兩

神麴

炒

麥皮麴

炒

黃蘗

炒各一兩

芍藥

一兩半

滑石

枳殼

各半兩

蒼朮

一兩

右為末糊丸桐子大每服五十九空心下

固腸丸

治濕氣下利大便血白帶去脾胃陳積之後

用此以燥下濕亦不曾單用看病作湯使椿根皮為

末粥糊為丸此藥性涼而燥須炒用一方加滑石一

半

治白帶因七情所傷脉數者

黃連

炒

側柏葉

酒蒸

黃蘗

炒各半兩

香附子

醋炒

白朮

炒各一兩

白芷

燒存性

木香

各三錢

椿

根皮

二兩炒

白芍藥

一兩

右為末飯粥為丸米飲湯送下

右五方治帶椿皮例涼燥之劑濕熱盛者宜之後一

方有黃連香附木香故可治七情所傷

大乳香散

治赤白帶下

草菓

一枚去皮入麝香一小塊用麵餅裹火炮

焦黃留性取出和麵用之

右為細末每服二錢陳皮飲調下重者三錢

丹帶下不止用椒目白芷 治白帶用椒目為末米飲

調服

治帶下方 右用雲母粉溫水調下三錢立見神效

伏龍肝散 治赤白帶下久患不瘥涎悴乏力六脉微

濡

梭櫚

不拘多少燒赤急以盆蓋陰冷存性

伏龍肝

於竈直下去取赤土炒令烟盡

梁上懸塵

炒令烟盡出火毒

右等分研勻入腦麝各少許每服三錢溫酒或淡醋湯下

馬蹄丸

治白漏不絕

白馬蹄

禹餘糧

各四兩

龍骨

三兩

烏鰂魚骨

白殭蠶

赤石脂

各二兩

右為末蜜和丸如桐子大每服十九空心酒送下不

止加三十丸

又方治白帶

用白芷以石灰炒去皮蒿草少許粥糊