

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百六十二



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈履勘

普濟方卷一百一十

石門
孔石及熱頭痛

五行五藏皆互相生
養懷不故應春而王也為
神藏而無絨不為四藏

周王朱橚撰

而為藏首位在甲乙
一母餘藏循次而生焉
四藏為四鄙四鄙有擾

王必怵憂四藏和則王不怵悅則榮衛不錯憂則經

絡患生心不受邪所病者為憂藥能致也肺為風府施於太穹為呼吸之門氣息之道也諸藏紊亂氣息皆形誰能出不由戶耶若熱風盛心憂則頭痛若過憂即心煩熱盛必寒寒盛必熱倚伏之道足可明焉皆由風狂邪熱之謂也但平風熱抑狂邪榮衛自然通泰也若乳石發動寒熱頭痛者以石熱壅積將適失度陰陽之氣不得和平也蓋陽病發熱陰病發寒一於熱則偏於陽一於寒則偏於陰時寒時熱則榮衛交爭陰陽相勝若

傷寒諸瘧之狀是也且服乳石之人將息過溫榮衛壅滯氣血不和陰陽二氣更相乘尅陽勝則熱陰勝則寒陰陽不等虛實相并則生寒熱疾因其榮衛否塞石氣在於藏腑不得宣通致心肺有熱毒之氣上攻於頭則令頭痛也

方

麥門冬丸

出聖惠方

治諸石發動口乾時作寒熱似鬼神

病

麥門冬

去心焙五兩

大黃

剉炒

苦參

葳蕤

梔子仁

五加皮

剉

黃芩

去黑心

犀角

鎔

芍藥

升麻

大青

各一兩

甘草

炙三分

右為末鍊蜜搜和更擣勻丸如梧桐子大每食後以

蜜水下十五丸漸加至二十丸

犀角丸

一名麥門冬丸

治乳石發動口乾寒熱似鬼神為病

犀角屑

五加皮

剉

黃芩

去黑心各一兩

苦參

大黃

剉碎

微炒

芍藥

各一兩半

大青

甘草

炙各三分

麥門冬

去心焙三分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大食後以蜜水下十五

丸漸加至二十九丸早晨日午晚後各一服

石膏散

出聖惠方

治乳石發動寒熱鼻塞頭痛

石膏

二兩

白鮮皮

枳殼

麩炒微黃去白

玄參

薺芩

葳

蕤

黃芩

二分前胡

一兩去蘆頭

甘草

生剉半兩

右為散每服四錢以水一盞入生薑半分葱白七寸

煎至六分去滓不計時候溫服

葛根湯

出聖惠方

治乳石發寒熱頭痛後似天行四肢煩

疼心躁口乾多渴不能下食

葛根

麻黃

去根節各三分

石膏

二兩搗碎

梔子仁

三七枚

甘草

生剉碎用半兩

甜竹葉

握一

生薑

半兩

豉

葱白

七莖并豨

右細剉以水五大盞煎至二盞半去滓分溫五服不

計時服

芍藥湯

出聖濟總錄

治乳石毒經二三十年發動為寒熱

或慄慄似中寒者或欲食或不欲食若服紫石英發熱者熱悶昏昏喜臥起便無力皆石氣所生臟氣不

和礬石發熱燥石硫黃熱鬱如熱極者身並破

芍藥

赤茯苓

去黑皮

人參

藍實

黃芩

去黑心

甘

草

炙微赤各一兩

薺芩

二兩

蔓菁子

一升

右除蔓菁子外擣為粗末每五錢用水四盞先煮蔓菁子一合至三盞去滓次下藥末煎至一盞半去滓溫三服早辰日午晚後各一服效

知母散

出聖惠方

治乳石發動寒熱頭痛百節痠疼唇口

乾焦舌卷語澁

知母 石膏 川升麻 木通剉 川芒硝 黃芩

獨活各一兩 甘草半兩生用

右為散每服四錢以水一中盞半生薑半分竹茹一

分黑豆半合煎至六分去滓不計時候溫服

麻黃湯出聖惠方 治乳石發動頭痛寒熱不可解者

麻黃三分去根節 豉一合 甘草生用 梔子仁 赤芍藥 薺

芩 生薑各半兩

右細剉以水五大盞煎至二盞半去滓不計時候分

溫五服

升麻湯

出聖惠方

治乳石發熱如火頭痛寒熱煩悶嘔逆

升麻

前胡

去蘆頭

甘草

炙各二兩剉

黃芩

去黑心三兩

枳殼

去蘆麤炒

黃連

去蘆

瓜蒌

生地黄

切焙三兩

梔子仁

十四枚

右粗擣篩每服四錢水二盞入豉一合綿裏煎至一

盞去滓溫服早晨日午各一心煩加麥門冬一兩稍

冷加生薑一兩

鴨通湯

出聖惠方

解散餘熱

白鴨通

五升沸湯二斗半

淋之澄取汁二斗

梔子仁

二十枚

豉

三升

麻黃

八兩 冷石

二兩一作滑石

石膏

三兩 甘草

五兩

右以五味㕮咀以鴨通汁煮取六升去滓內豉三沸

分服五合若覺體冷小便自利其間若熱猶盛小便

赤促服之不限五合宜小營當漸進食不可食令少

但勿使多耳

前胡湯

出聖惠方

治乳石發如傷寒寒熱狀兼似瘡

前胡

去蘆頭

黃芩

去黑心

甘草

炙

知母

各二兩

牡蠣

煨

石

膏酪三
生薑一大片切
棗三枚劈破

右粗擣篩每服四錢以水一盞半煎至八分去滓溫服

三黃湯 折石熱通氣泄腸胃解肌

大黃三兩另入
黃芩
甘草炙各二兩
梔子二七枚
豉一升
麻黃

一兩去節

右切以水九升煮麻黃去上沫下諸藥煎取三升半下大黃三五沸去滓分服得利以瘥止

麻黃湯 去石毒

麻黃

去節 三兩

甘草

炙二兩

豉

一升 綿裹

右切以水五升煮取一升去滓分溫再服

猪膏湯 大解散

猪膏

二兩 炒

豉

一升

右以水三升煮豉取汁二升內猪膏服七合日三服

石人飲宜清冷不宜濁熱濁熱即氣壅否唯酒須熱

也

香豉湯

治乳石發內虛熱外風濕不解

方見本門乳石發心腹脹

滿類

治乳石發若得時氣冷熱不調動乳者皆由寒熱所致

其狀似瘡久不療能損人縱服湯藥亦難瘥宜作生

熟湯浴之方

出聖濟總錄

以溫湯半浴盆如過熱投少冷水解之即於湯中坐
須臾百節開寒熱之氣皆從毛孔中出變作流汗若
心中熱悶者還服少許熱湯即定久乃出湯以衣被

覆蓋睡豁然平復如患大重者不過三兩度

又方

若熱盛可向冷地臥腰下以厚物薦之腰以上令薄使受稍涼即起不得過度

若熱解寒不解者

可飲熱酒三合使解之

若寒解後頭重耳鳴滿眼漠漠心下痛者

用清酒二合許飲之便瘥寒溫宜依此法

療頭痛欲裂方

取當歸二兩清酒一升煮取六合飲至再服

若兢顫惡寒或寒熱如溫瘧者為失食忍飢失洗不行

又食臭穢故也

出聖濟
總錄

宜急飽冷食冷水洗數行即愈

乳石發苦熱解折

附論

夫五形之人其性各異故土形之人骨聳氣清水形
之人體薄氣長木形之人筋骨麓聲圓而長火形之