

欽定四庫全書

子部

赤水元珠卷六



南京中医药大学图书馆版权所有

火之方重入者

赤水元珠

酸

王叔和

明 孫一奎 撰

酸

論吐酸屬肝

酸

少陽之勝嘔酸夫酸

酸也如飲食熱則易方酸矣是以肝熱則口酸或言

為寒者但謂傷生冷硬物而喜噫醋吐酸故俗主於和脾胃豈知人之傷於寒也則為病熱蓋寒傷皮毛則腠理閉密陽氣怫鬱而為熱故傷寒熱在表以麻黃湯發散使腠理開通汗泄熱退而愈也凡內傷冷物者或積陰勝陽而為病寒或寒熱相搏而致腸胃陽氣怫鬱而為熱亦有內傷冷物而反病熱得汗泄身涼而愈也或微而止為中酸俗謂之醋心法宜溫藥散之亦猶解表之義若久喜酸不已則不宜溫之

宜以寒藥下之後以涼劑調之結散熱去則氣和也
所以中酸不宜食粘滑油膩者謂能令氣鬱不通暢
也宜糲食菜蔬使氣通利則酸自不作矣

論雜病吐酸與病機外邪不同

發明云病機吐酸皆屬於熱此上焦受外來客邪也胃
氣不受外邪故嘔仲景以生薑半夏治之以雜病論
之嘔吐酸水者甚則酸水浸其心不任其苦其次則
吐出酸水令上下牙酸澁不能相對以大辛熱藥療

之必減吐酸是吐出酸水也酸味者收氣也西方肺金旺也寒水乃金之子子能令母實故用大鹹熱之劑瀉其子以辛熱為之佐而瀉肺之實以病機作熱攻之誤矣蓋雜病醋心濁氣不降欲為中滿寒藥豈能治之乎

辨素問東垣論酸不同

丹溪云或曰吐酸素問明以為熱東垣又言為寒何也予曰吐酸與吞酸不同吐酸是吐出酸水如醋平時

津液隨上升之氣鬱積而成鬱積之久濕中生熱故
從火化遂作酸味非熱而何其有鬱積之久不能自
湧而出伏於肺胃之間咯不得上嚥不得下肌表得
風寒則內熱愈鬱而酸味刺心肌表溫暖腠理開發
或得香熱湯九津液得行亦可暫解非寒而何素問
言熱者言其本也東垣言寒者言其末也但東垣不
言外得風寒而作收氣立說欲瀉金之實又謂寒藥
不可治酸而用安胃湯加減二陳湯俱犯丁香且無

治鬱結濕熱之法為未合經意予常治吞酸用黃連
柴萸各炒隨時令迭其佐使蒼朮茯苓為輔佐湯浸
炊餅為小丸吞之仍教糲食蔬菜自養則病易安

劉宗厚曰謹按吐酸一證以病機言之則屬於熱以臟
腑論之則脾胃受病以內邪言之則痰飲宿食之所
為故治法熱者寒之脾惡濕以苦燥之有痰飲者清
之分利之有宿食者消之導之驅逐之局方不察斯
故以噫醋吞酸醋心吐酸水之證並入於氣門中率

用溫熱之藥豈吐酸專主於寒而無他證也故此一門以叙河間東垣丹溪之論其病源治法無餘蘊矣

停飲門

許學士云余苦有二疾一下血一膈中停飲下血有時而止停飲則無時始因年少時夜坐作文左向伏几案是以飲食多墜左邊半夜以後稍困乏必飲酒二三盞仍向左邊側睡壯盛時殊不覺病三五年後覺酒止從左邊下漉漉有聲脇痛飲食減十數日必嘔

數升酸水暑月止是右體有汗熱熱常潤左邊痛處
絕燥遍訪名醫及海上方服之少驗間或中病止得
月餘復作其補如天雄附子礬石其利如牽牛甘遂
大戟備嘗之矣予揣度之已成癖囊如潦水之有科
臼不盈不行必盈科而行也清者可行濁者依前停
蓄蓋下無路以出之也是以積之五七日必嘔而出
稍寬數日復作脾土惡濕而水則流濕莫若燥脾以
勝濕崇土以填科臼則疾當去矣於是悉屏諸藥止

服蒼朮三月而除自此後不復發嘔胸膈寬飲啖如
故暑月汗周體而身涼飲亦從中下前此飲漬其肝
目亦多昏眩其後燈下能書細字皆蒼朮之力也故
名其方曰神朮丸其蒼朮一觔去皮切末用之白芝
麻半兩水二盞研濾取汁大棗十五枚煮爛去皮核
研以麻汁成稀膏和入搜臼杵熟丸如梧子大每日
空心白湯吞五七十丸一日服二三次忌桃李雀鴿
初服時膈間必微燥且以蒼朮製之覺燥甚再進山

梔子散一服久之自不燥也予服半年以後止用燥烈味極辛者削去皮不浸極有力亦自然不燥山梔散用山梔一味乾之為末沸湯點服故知久坐不可伏向一邊時宜運動亦調息之法

脉經云胃脉虛主胃中冷苦吞酸頭痛寸口脉遲上焦有寒心痛喉酸吐酸水宜服附子湯生薑湯茱萸丸關脉沈心下有冷氣痞滿吞酸 據此亦有胃冷吞酸者

張子和治張風村一田叟嘔酸水十餘年乃留飲証也
醫皆以燥劑治之不效更以艾火燔針刺之中脘臍
脘瘡未嘗合予以苦劑越之出其涎如膠者二三升
談笑而愈

噫腐噯酸或每晨吐酸水數口或膈間常如酸蜚皆飲
食傷胃所致平胃散加神麴麥芽茯苓半夏

口吐清水乃胃中濕熱所為宜平胃散加白朮茯苓滑
石半夏不宜純用涼藥亦有胃寒而然者理中湯主

之 食鬱有痰二陳加南星黃芩香附之類治酸必
用吳茱萸者乃順其性而折之

戴元禮云濕熱在胃口上飲食入胃被溫熱鬱遏其食
不得傳化故作酸也如穀肉在器則易酸也

治寒酸溫胃之劑

東垣藿香安胃散 治脾胃虛弱不進飲食嘔吐不待
腐熟

藿香

丁香

人參

各二錢半

陳皮

五錢

右為末每服二錢生薑湯下

加減二陳湯 治痰飲為患嘔吐頭眩心悸或因食生

冷脾胃不和

丁香兩一半夏

陳皮

各五兩

茯苓

三兩

甘草

兩半

每服五六錢入生薑煎服

三因麴朮丸 治中脘宿食留飲酸蜇心痛口吐清水

神麴

炒三兩

蒼朮

米泔浸三宿洗淨

晒乾炒一兩五錢

陳皮

兩一

一方有砂

仁兩一

右為末生薑汁打神麴糊為丸薑湯下

加味平胃散 治吞酸食鬱所致

平胃散加炒神麴麥芽薑棗煎服

治吞酸因傷冷物所致 治食後吐酸水同

乾薑炒二兩 吳茱萸炒二兩

為末酒服方寸匕一日二服

治噫酢咽方

吳茱萸半斤 生薑三兩 人參二兩 棗十二枚

水六升煮二升分三次食前服

治吐酸清水方

蒼朮

陳壁土炒

白朮

茯苓

滑石

陳皮

各等分

水煎服

聖惠方乾薑丸

治酒癖停飲吐酸水

乾薑

葛根

枳殼

橘紅

前胡

各五錢

白朮

半

夏麴

各一兩

吳茱萸

甘草

各二錢半

右為末煉蜜丸桐子大每五十丸米飲下

三生丸 治中風痰涎眩暈嘔吐酸水頭疼惡心

半夏

二兩

南星

白附子

各一兩

一

右並生為末滴水丸梧子大以生麴裹為衣陰乾
每服十丸至二十丸生薑湯下

治熱之劑

丹溪方 一方加炒山梔仁三錢

吳茱萸

去枝梗炒乾

陳皮

黃芩

陳土炒各五錢

黃連

陳土炒一兩

蒼

朮

七錢半

一方有桔梗茯苓

各一兩