

王機微義卷之十七

血證門

○諸經叙血證所因

內經厥論云陽明厥逆喘欬身熱善驚衄吐血○溫
滯汗出熱衄○生氣通天論云陽氣者大怒則形氣
絕而血菀於上○氣厥論云脾移熱於肝則爲驚衄
胞移熱於膀胱則癰溺血○舉痛論云怒則氣逆甚
則嘔血故氣上矣○陰陽別論云結陰者便血云云
鍼經云厥氣生足悞悞生脛寒云云則後血見續○
脉經云下血先見血後見便此近血也先見便後見
血此遠血也

○脉法

內經云脉來懸鉤爲衄血常脉脉至而搏血衄身熱者死○腸癖下膿血脉弦絕則死滑大則生○血溫身熱者死○脉經曰脉得諸澁濡弱爲亡血○脉來輕輕在肌肉尺中自浮目精暈黃衄必未止○太陽脉大而浮必衄吐血○病人面無血色無寒熱脉沉弦衄也○脉浮弱手按之絕者下血○脉芤爲失血○瀋爲少血○尺脉滑而疾爲血虛○脉弦而緊脇痛臍傷有瘀血○吐血唾血脉滑小弱者生實大者死○唾血脉緊强者死滑者生○腎脉小搏沉爲腸癖下血心肝癖亦下血

○論血證分三因

陳無擇云衄者因傷風寒暑濕流傳經絡湧泄如清氣道中而致者皆外所因。積怒傷肝。積憂傷肺。煩思傷脾。失志傷腎。暴喜傷心。皆能動血。隨氣上溢。清氣道中而致者屬內因。飲酒過多。啖炙燔辛熱。或墜墮車馬傷損。致者爲不內外因。○吐血者或因四氣傷于外。七情動于內。及飲食房勞墜閃傷損。致榮血留聚。膈間滿則吐溢。世謂妄行。或吐瘀血。此名內傷。○便血或清或濁。或鮮或黑。或在便前便後。或與泄物並下。此由內外有所感傷。凝停在胃。隨氣下通。亦妄行之類。○尿血因心腎氣結所致。或憂勞房室過度。

此得之虛寒不可專以血得熱而溲溢二者皆致尿血與淋不同

謹按衄血下血傷寒邪氣壅迫於經而致者故有
之雜證見者多火熱所致或吐溢於空竅皆五志
所動或陰分鬱熱或內外有所傷而成有寒邪者
少如尿血因房勞者實由精氣滑脫陰虛火動榮
血妄行爾已上論爲虛寒恐未必然也若便血清
者屬榮虛有熱濁者屬熱與濕色鮮者屬火黑者
火極與泄物並下屬有積或絡脉傷也並宜分治
○論下血爲內傷絡脉肝致詳見積聚門
○論嘔唾血溢爲逆氣肝致

東垣曰經云怒則氣逆甚則嘔血暴癰內逆肝肺相搏血溢鼻口取天府穴又足少陰腎之脉從腎上貫肝入肺中循喉嚨其病則飢不欲食面黑如地色咳嗽則有血夫氣者陽也血者陰也氣主呵之血主濡之今血妄行上出於鼻口者皆氣逆也故經言陽明厥逆怒則氣逆暴癰內逆者是也

謹按悲氣勞氣等皆能致血證

詳見氣門

但怒氣致血

證者則暴甚故經曰抑怒以全陰者是矣否則五志之火動甚火戴血上錯經妄行也

○論衄吐血泄爲火熱所致

原病式曰衄者陽熱怫鬱于於足陽明而上熱則血

妄行鼻衄也。○血溢者上出也。心養於血故熱甚則血有餘而妄行。或謂嘔吐紫凝血爲寒者誤也。此非冷凝由熱甚銷燬以爲稠濁而熱甚則水化制之故赤兼黑而爲紫也。○血泄熱客下焦而大小便血也。○衄衄血汚血出也。汚者濁也。心火熱極則血有餘熱氣上甚則爲血溢。熱勢亢極則燥而汚濁害承乃制則色兼黑而爲紫也。

○論衄血下血爲傷寒所致

成無已曰傷寒衄者爲邪氣不得發散壅盛於經逼迫於血則因致衄也。桂枝湯麻黃湯治衄者非治衄也。即是發散經中邪氣爾。至畜血者血在下焦結住。

而不行。畜積而不散者是也。血菀於上而吐血者謂之薄厥。留於下而瘀者謂之畜血。此由太陽隨經瘀熱在裏。血爲熱所搏結而不行。畜於下焦之所致。經曰太陽病七八日。表證仍在。脈微而沉。反不結胸。其人如狂者。以熱在下焦。少腹當鞭滿。小便自利者。下血乃愈。

傷寒例。少陰證。下利便膿血者。桃花湯以固脫散寒。

補正

許氏治少陰誤汗衄血及臍中出血。用姜附湯治少陰之本。

陰證畧例治三焦出血。色紫不鮮。此重沓寒濕化毒。

凝泣浸漬而成。治要用黑錫丹

見直指方

按所論已上證皆寒邪之變病也。至又有甚者如論云服桂枝湯吐血其後必吐膿血。又厥陰證傷寒六七日大下後寸脉沉而遲手足厥冷下部脉不至咽喉不利唾膿血泄利不止者爲難治宜麻黃升麻湯。火邪亦咽燥唾血陽毒亦吐血皆變證之極者也。非衄證之比。大抵傷寒畜血下血爲傳變故下血衄血身涼乃愈其不傳變入裏邪氣不得發散逼迫於血因致妄行於下者爲逆下血必多不能止爲難治也

○論結陰便血

衛生寶鑑云真定史十年四十二形體本瘦秋時因
勉強飲酸酒數杯少時腹痛次傳下利無度待十餘
日便後見血或紅或紫腹鳴時痛諸醫以爲血熱用
芍藥栝皮丸治之未効仍不欲飲食食則嘔酸形體
愈瘦面色青黃不澤心下痞惡冷物口乾時有煩躁
不得安卧診時脉弦細而微遲手足稍冷經曰結陰
者便血一升再結二升三結三升又邪在五臟則陰
脉不和陰脉不和則血留之結陰之病陰氣內結不
得外行無所稟滲入腸間故便血也外灸申腕三里
氣海等穴內服平胃地榆湯而愈

按此治例實內傷法也宜與積聚門叙積之始兼

看

○血屬陰難成易虧論

丹溪曰經云。人年至四十。陰氣自半而起居衰矣。又曰男子六十四而精絕。女子四十九而經斷。夫以陰氣之成。止供給三十年之運用。已先虧矣。人之情欲無涯。此難成易虧之陰氣。若之何而可以縱欲也。

謹按或曰經云。榮者水穀之精也。和調五臟。洒陳於六腑。乃能入於脉也。源源而來。生化於脾。總統於心。藏受於肝。宣布於肺。施泄於腎。灌溉一身。目得之而能視。耳得之而能聽。手得之而能攝。掌得之而能握。足得之而能步。臟得之而能液。腑得之

而能氣。是以出入升降濡潤宣通者。由此使然也。
注之於脉。少則瀦。充則實。常以飲食日滋。故能陽
生陰長。取汁變化而赤爲血也。生化旺則諸經特
此而長養。衰耗竭則百脉由此而空虛。可不謹養
哉。故曰血者神氣也。持之則存。失之則亡。是知血
盛則形盛。血弱則形衰。神靜則陰生。形役則陽亢。
陽盛則陰必衰。又何言陽旺而生陰血也。蓋謂血
氣之常。陰從乎陽。隨氣運行於內。苟無陰以羈束。
則氣何以樹立。故其致病也。易調治也。難以其比
陽常虧而又損之。則陽易亢。陰易乏之論。可以見
矣。諸經有云陽道實。陰道虛。陽道常饒。陰道常乏。

陽常有餘陰常不足以人之生也。年至十四經行。年至四十九而經斷。可見陰血之難成。易虧如此。陰氣一傷。所變之證。妄行於上。則吐衄。衰涸於外。則虛勞。志反於下。則便紅。移熱膀胱。則癰閉溺血。滲透腸間。則爲腸風。陰虛陽搏。則爲崩中。濕蒸熱瘀。則爲滯下。熱極腐化。則爲膿血。火極似水。血色紫黑。熱勝於陰。發爲瘡瘍。濕滯於血。則爲痛痒癰疹。凝澁皮膚。則爲冷痺。畜之在上。則人喜忘。畜之在下。則人喜狂。墮恐跌仆。則瘀惡內凝。若分部位。身半以上同天之陽。身半以下同地之陰。此特舉其明顯之證者。治血必血屬之藥。欲求血藥其四。

物之謂乎。河間謂隨證輔佐。謂之六合湯者。詳言之矣。余故陳其氣味專司之要。不可不察。夫川芎血中氣藥也。通肝經。性味辛散。能行血滯於氣也。地黃血中血藥也。通腎經。性味甘寒。能生真陰之虛也。當歸分三治。血中主藥也。通肝經。性味辛溫。全用能活血。各歸其經也。芍藥陰分藥也。通脾經。性味酸寒。能和血。治血虛腹痛也。若求陰藥之屬。必於此而取則焉。脾胃論有云。若善治者。隨經損益。摘其一二味之所宜。爲主治可也。此特論血病而求血藥之屬者也。若氣虛血弱。又當從長沙血虛以人參補之。陽旺則生陰血也。若四物者。獨能

主血分受傷爲氣不虛也。輔佐之屬若桃仁紅花
蘇木血竭牡丹皮者。血滯所宜。蒲黃阿膠地榆百
草霜棕櫚灰者。血崩所宜。乳香沒藥五靈脂凌霄
花者。血痛所宜。菴蓉瑣陽牛膝枸杞子益母草夏
枯草敗龜板者。血虛所宜。乳酪血液之物。血燥所
宜。乾薑桂者。血寒所宜。生地黃苦參。血熱所宜。特
取其正治大略耳。以能觸類而長。可謂應無窮之
變矣。

○論治血證大法

東垣曰。傷寒家衄血者。仲景言不可發汗。蓋爲脉微
也。若浮緊者。麻黃湯。浮緩者。桂枝湯。脉已微者。二藥

俱不可用。宜黃芩芍藥湯主之。雜病見血。多責其熱。如衄血出於肺。以犀角升麻梔子黃芩芍藥生地黃紫參丹參阿膠之類主之。咯唾血者出於腎。以天門冬麥門冬貝母知母桔梗百部黃栢遠志熟地黃之類主之。痰涎血者出於脾。葛根黃芪黃連芍藥當歸甘草沉香之類主之。嘔吐血出於胃也。實者犀角地黃湯主之。虛者小建中湯加黃連主之。血證上行或唾或嘔或吐皆逆也。若變而下行爲惡痢者順也。血上行爲逆其治難。下行爲順其治易。故仲景云。畜血證下血者當自愈也。與此意同。若無病之人忽然下痢其病進也。今病血證上行而復下行惡痢者其邪

欲去是知吉也。經曰：諸見血身熱脉大者難治，是火邪勝也。身涼脉靜者易治，是正氣復也。故脉訣云：鼻衄吐血沉細宜，忽然浮大即傾危。此之謂也。

血證治法

婦室經血諸證詳見婦人門

○治風之劑

敗毒散治風熱流入大腸經下血不止。若因酒毒加

黃連

方見效門

按此出少陽例表裏藥也

本事方槐花散治腸風臟毒下血

槐花

炒

柏葉

許

荆芥穗

枳殼

各等分

右爲末每服二錢空心米飲送下