

切切集成卷二

鼎鍬幼幼集成卷之二

羅浮陳復正飛霞氏 輯訂

廬陵劉 勣宋孟氏 校正

遂陽周宗頗虛中氏 參定

○胎病論

兒之初生有疢亦惟胎弱胎毒二者而已矣胎弱者稟受於氣之不足也子於父母一體而分而稟受不可不察如稟肺氣爲皮毛肺氣不足則皮薄怯寒毛髮不生稟心氣爲血脈心氣不足則血不華

色面無光彩受脾氣爲肉脾氣不足則肌肉不生
手足如削受肝氣爲筋肝氣不足則筋不束骨機
關不利受腎氣爲骨腎氣不足則骨節軟弱久不
能行此皆胎稟之病隨其臟氣而求之所謂父強
母弱生女必羸父弱母強生兒必弱故小兒有頭
破顱解神慢氣怯項軟頭傾手足痿軟齒生不齊
髮生不黑行住坐立須人扶掖者此皆胎稟不足
之故也

胎毒者卽父母命門相火之毒也命門者男子以藏

精女子以繫胞道家謂之下丹田也夫二五之精
妙合而凝純粹之精鎔液而成胎淫佚之火蓄之
則爲胎毒矣蓋人生而靜天之性也感物而動人
之欲也成胎之後其母之關係尤緊凡思慮火起
於心恚怒火生於肝悲哀火鬱於肺甘肥火積於
脾淫縱火發於腎五欲之火隱於母胞遂結爲胎
毒凡胎毒之發如蟲疥流丹濕瘡癰癩結核重舌
木舌鵝口口瘡與夫胎熱胎寒胎搐胎黃之類是
也更如一七之臍風百日之咳嗽半歲之真搐一

過之流丹此又毒之至酷至烈而不可解者也

胎寒者母娠時患熱病多服寒涼之藥又或過食生冷令兒受之生後昏昏多睡間或哕乳瀉曰此內因也或百日之內忽病戰慄口冷手足踈曲不伸腹痛啼叫不止此生後受寒得之治宜溫散指迷七氣湯助胃膏爲佳

胎熱者母娠時喜食辛熱炙燂之物或患熱病失於清解使兒受之生後目閉面赤眼胞浮腫弩身呢呢作聲或啼叫驚煩遍身壯熱小便黃澁此胎熱

也若不早治則丹瘤瘡癰由此而至宜集成沆瀣丹徐服解之以平爲度

胎搐者母娠時曾因驚恐氣傳於子生後頻頻作搐其後身熱面青手足搐掣牙關緊閉腰直身僵睛邪目閉多啼不乳此乃胎瘤不治之證如因身有熱而作者必先啼叫雖曰胎病由外因也宜天麻丸後以六味地黃湯滋其化源久服自愈

盤腸氣者幼科稱內吊者是也皆因胎氣鬱積壅結榮衛五臟六腑無一舒暢其氣不能升降築隘腸

胃之間、抵心而痛、其聲輓輓如猫吐惡、乾啼口開、手足皆冷、宜疎散通氣、調中散、及木香丸、

臍突者、小兒多啼所致也、臍之下爲氣海、啼哭不止、則觸動氣海、氣動於中、則臍突於外、其狀突出、光浮如吹起者、捏之則微有聲、用亂髮燒灰、枯礬等、分爲細末、敷臍上、以膏藥貼之、自肖、

不乳者、小兒生下三二日間、忽然不乳、當詢問之、勿以不乳作臍風治、蓋臍風有多啼撮口之證、此則無之、但不乳耳、有吐乳乳之、又吐者、或因拭口不

淨惡穢入腹也、宜用檳榔木香甘草煎湯與服、如啼哭不乳者、腹痛也、亦胎寒之證、宜木香丁香乳香當歸甘草煎湯與服、如無已上諸證、無故不乳、宜問其母之乳汁多少、乳多者傷乳也、宜少節之、不久自思乳矣、乳少者必有他證、細心察之、

胎黃者、兒生下面目渾身皆黃如金色、或目閉身上壯熱大便不通、小便如梔子汁、皮膚生瘡、不思乳食、啼哭不止、此胎中受濕熱也、宜茵陳地黃湯母子同服、以黃退爲度、

胎肥者、兒生下遍身肌厚、肉色通紅、面色亦紅而黑、睛多、時時生痰、自滿月以後漸漸肌瘦、五心熱而大便難、白睛粉紅色、此名胎肥、是亦在胎時母食甘肥濕熱太過、流入胞中、以致形質虛肥、血分壅熱也、加減大連翹飲、外以浴體法浴之、

胎怯者、生下面無精光、肌肉瘦薄、大便白而身無血色、目無精彩、時時哽氣多噓者、此卽胎怯也、非育於父母之暮年、卽生於產多之孕婦、成胎之際、元精既已澆漓、受胎之後、氣血復難長養、以致生來

怯弱若後天調理得宜者十可保全一二調元散
助之

○入方

指迷七氣湯

一切腹痛寒熱多啼不乳等證皆由陰陽不升降
氣道壅塞而然並宜此方凡人身內之氣呼吸出
入無刻不與天道陰陽之氣通故六淫外襲則感
而致病翕受之理也內氣閉塞則天道不通升者
不升降者不降寒熱由此而生也是方疎利臟腑

神化無方最宜領會

廣陳皮

杭青皮

藿香葉

芽桔梗

蓬莪朮

香附米

法半夏

上肉桂

公丁香

益智仁

老生薑

大紅棗

炙甘草

右咬咀水二碗煎至一碗母子同服

助胃膏

治胎寒內飲胃氣虛弱胸脇脹滿嘔乳便青

白豆蔻

肉豆蔻

麪包煨
去油

官揀參

廣木香

各五

錢

公丁香

三錢

藿香葉

雲茯苓

漂白朮

土炒

真青桂

西砂仁

炙甘草

各一兩

廣陳皮

二兩

洋沉香

二錢

懷山藥

五兩

爲末蜜丸芡實大每一丸炒米湯化服

集成沆瀣丹

音亢械北斗夜半所降之甘露也

治小兒一切胎毒胎熱胎黃面赤目閉顴口口瘡

重舌木舌喉閉乳蛾渾身壯熱小便黃赤大便閉

結麻疹斑癩遊風疥癰流丹癰疹痰食風熱疥腮

面腫十種火丹諸般風搐並皆神效

此方古書未載得之異授微似古之神芎丸近有

能者妙出化裁而增損之遂爲幼科有一無二之神方作三焦之主治蓋凡臟氣流通者必不鬱滯或受毒於妊前或感邪於誕後遂爾中氣抑鬱則見以前諸證方內所用黃芩清上焦之熱黃柏清下焦之熱大黃清中焦之熱又藉其有推陳致新之功活血除煩之力能導三焦鬱火從魄門而出猶慮苦寒凝臆復加檳榔枳殼之辛散爲行氣利痰之佐使川芎薄荷引頭面風熱從高而下趨連翹解毒除煩赤芍調榮活血牽牛利水走氣分而

舒鬱滑石清潤、抑陽火而扶陰、又能引邪熱從小
便而出、用治以前有餘諸證、應如桴鼓、予生平最
慎攻伐、惟此方用之最久、功效莫能殫述、真濟世
之良方也。

杭川芎

九錢
酒洗

錦莊黃

九錢
酒蒸

實黃芩

九錢
酒炒

厚川柏

九錢
酒炒

黑牽牛

炒取頭
末六錢

薄荷葉

四錢
五分

粉滑石

水飛
六錢

尖檳榔

七錢五分
童便洗晒

陳枳殼

四錢五
分 楚炒

淨連翹

除去心隔
取淨六錢

京赤芍

六錢
炒

右十一味、依方炮製、和勻焙燥、研極細末、煉蜜爲

丸如芡實大、月內之兒每服一丸、稍大者二丸、俱用茶湯化服、乳母切忌油膩、但覺微有泄瀉、則藥力行、病卽減矣、如不泄再服之、重病每日三服、以愈爲度、此方斷不峻厲、幸毋疑畏、惟胎寒胎怯、面青白者忌之、

天麻丸 治胎搐、先以此丸通其經絡、次服地黃丸

明天麻

薑製

法半夏

北防丰

川羌活

牛膽星

直殭蠶

北全蝎

各五錢

爲末、蜜丸、芡實大、每一丸、鈎藤湯下、

六味地黃丸

卽仲景所製金匱地黃丸原治腎水虧損小便淋瀝頭目眩暈腰腿酸軟陰虛發熱自汗盜汗憔悴瘦弱精神疲困壯水之主以制陽光此方是也

錢仲陽以之治小兒胎怯稟受先天不足併肝疳白膜遮睛瀉血失音身瘦瘡疥腎怯語遲解顱行遲等證

薛立齋又以治小兒肝經血虛燥熱腎經虛熱作渴小便淋秘痰氣上壅或風淫客氣癰癰結核或

四肢搖擗、眼目瞶動、或欬血吐血、頭目眩暈、或咽
喉燥痛、口舌生瘡、或稟腎不足、解顱失音、五遲五
軟、腎疳肝疳、凡腎肝不足之證、皆宜用此以滋化
源、其功不能盡述、

予按錢薛二翁能用此方治小兒先天不足、誠卓
然有識者、予所敬佩、奈今之小兒體質元氣更不
及前、古以地黃丸爲補劑、今則實爲涼劑矣、此藥
用於陰虛枯燥者、誠爲得宜、倘兒肌肥面白、脾弱
多痰者、服此必致膩膈、變生他證、其害不小、非方