

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷六十四



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

證治準繩卷六十四

婦科

胎前
產後
白帶
赤帶
經閉
經痛
崩漏
帶下
子宮
不孕
產後
諸症

明 王肯堂 撰

結而成胎者雖不離乎

精血猶為後天清血之生而一點先天真一之靈氣萌

於情欲之感者妙合於其間朱子所謂稟於有生之初
悟真篇所謂生身受氣初者是也醫之上工因人無子
語男則主於精語女則主於血著論立方男以補腎為
要女以調經為先而又參之以補氣行氣之說察其脈
絡究其虧盈審而治之夫然後一舉可孕天下之男無
不父女無不母矣

診脉陳楚良曰人身氣血各有虛實寒熱之異惟察脉
可知舍脉而獨言藥者妄也脉有十二經應十二時一

日一周與天同運循環無端其至也既不宜太過而數數則熱矣又不宜不及而遲遲則寒矣不宜太有力而實實非正氣能自實也正氣虛而火邪來乘以實之也治法先當散鬱以伐其邪邪去而後正可補也不宜太無力而虛虛乃正氣正血虛也治法惟當補其氣血耳亦有男婦上熱下寒表實裏虛而未得子者法當臨睡時服涼膈之藥以清其上每晨食未入口時服補藥以溫其下暫進升散之藥以達其表久服厚味之藥以實

其裏又有女人氣多血少寒熱不調月水違期或先或後白帶頻下而無子者皆當診脉而以活法治之務欲使其夫婦之脉皆和平有力不熱不寒交合有期不妄用精必能生子子不殤死故欲得子者必須對脉立方因病用藥

仲男子脉浮弱而濇為無子精氣清冷 脉婦人少腹

冷惡寒久年少者得之此為無子年大者得之絕產

脉微弱而濇年少得此為無子中年得此為絕產 肥

人脉細胞有寒故令少子其色黃者胸上有寒 少陰
脉浮而緊緊則疝瘕腹中痛半產而墮傷浮則亡血絕
產惡寒

調經婁胎前之道始於求子求子之法莫先調經每見
婦人之無子者其經必或前或後或多或少或將行作
痛或行後作痛或紫或黑或淡或凝而不調不調則血
氣乖爭不能成孕矣詳夫不調之由其或前或後及行
後作痛者虛也其少而淡者血虛也多者氣虛也其將

行作痛及凝塊不散者滯也紫黑色者滯而挾熱也治
法血虛者四物氣虛者四物加參芪滯者香附縮砂木
香檳榔桃仁玄胡滯久而沉痼者吐之下之脉證熱者
四物加芩連脉症寒者四物加桂附及紫石英之類是
也直至積去滯行虛回然後血氣和平能孕子也予每
治經不調者只一味香附末醋為丸服之亦百發百中
也 素問云督脉生病女子不孕

婦人經事不調即非受孕光景縱使受之亦不全美宜

服六味地黃丸

熟地黃

四兩

山茱萸肉

山藥

各二兩

牡丹皮

白茯苓

各一兩五錢

澤瀉

香附米

童便浸

一兩 蘄艾葉

去筋醋煮五錢

右為末煉蜜丸如梧子大每服七十九白沸湯送下

隨後證作湯使或另作煎劑服經水過期者乃血虛

也宜四物湯加參芪陳皮白朮服之若肥白人是痰

多宜二陳加南星蒼朮滑石芎歸香附之類 經水

不及期者血熱也四物加芩連肥人亦兼痰治色紫

黑者同血熱論 經將行而作痛者氣滯也用歸身
尾香附米及桃仁紅花黃連以行之或加四物莪朮
玄胡索木香熱加黃芩柴胡 經行後作痛者血氣
虛也八物湯

丹婦人肥盛者多不能孕育以身中有脂膜閉塞子宮
以致經事不行瘦弱婦人不能孕育以子宮無血精氣不
聚故也肥人無子宜先服調理藥 當歸一兩 茯苓二兩

川芎七錢 芍藥 白朮 半夏湯洗 香附米 陳皮

甘草各一兩 作十貼每貼薑三片水煎吞後九子

白朮二兩 半夏麴 川芎 香附米各一兩 神麴炒

茯苓各半兩 橘紅四錢 甘草二錢以上並為末 粥九每服八

十九如熱多加黃連 枳實各一兩 服前藥訖却服

後蝨斯丸 附子 茯苓各六錢 厚朴 杜仲 桂

心 秦朮 白薇 半夏 乾薑 牛膝 沙參

各二錢 人參四錢 細辛五錢

右為末煉蜜和丸小豆大每服五丸空心酒下加至

十九不妨覺有孕三月後不可更服忌食牛馬肉則難產

按此方即秦桂丸也丹溪忌服之者蓋忌於瘦人無血者若肥人濕多者又兼前調理藥而所服丸數十減其九只服五分無妨也上三方得之於丹溪之子朱懋誠者累試有效

抑氣散 治婦人氣盛於血所以無子尋常頭眩暈膈

滿體疼怔忡皆可服

香附子

炒淨二兩

陳皮

焙二兩

茯神

甘草炙各一兩

右為細末每服二三錢不拘時白湯調下

海大五補丸 天門冬 麥門冬去心 菖蒲 茯苓 人

參 益智 枸杞子 地骨皮 遠志肉 熟地

黃各等分

右為細末煉蜜丸如桐子大空心酒下三十丸服本方數服後以七宣丸泄之

增損三才丸 天門冬酒浸去心 熟地黃酒蒸 人參去蘆 遠志去骨

五味子

茯苓

酒浸鹿茸

炙酥

一法加白馬莖

炙酥

一法加麥門冬令人有力

一法加續斷以續筋

骨 一法加沉香煖下焦虛冷

右為細末煉蜜和杵千下九如桐子大每服五十丸

空心好酒下年老欲補加混元衣全個入藥

混元衣者是胎

衣頭生兒者方佳用酒浸晒乾細剉為末

紫石門冬丸

又名紫石英丸

紫石英

鍾乳石

鷲管通明者二味各七日

研之得上浮即熟

天門冬

已上各三兩

當歸

芎藭

紫葳

卷柏 肉桂 乾地黄 牡蒙 禹餘糧煨醋石

斛 辛夷以上各二兩人參 桑寄生 續斷 細辛

厚朴薑製乾薑 食茱萸 艾葉 白薇 薯蕷

烏鰂骨 甘草炙以上各一兩半 柏子仁一兩

右件搗羅為末煉蜜丸如梧子大酒服十九三日漸增至三十九以腹中熱為度不禁房室夫行不在不可服禁如藥法比來服者不至盡劑即有娠 此方舊用烏頭牡丹牛膝據藥性此三物俱墮胎求子藥

中用之蓋胎未著之時若服之已著已著而未覺服之未已反為害也今悉去之增鍾乳艾葉白薇茲無疑矣

白薇丸 治婦人無子或斷緒上熱下冷百病皆主之

白薇 熟乾地黄

川椒

去目及閉口者微炒出汗

白龍骨

以上

各一兩 麥門冬

去心焙一兩半

藁本

卷柏

白芷

覆盆

子 桃仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

人參

桂心

菖蒲

白茯苓

遠志

去心以上各七錢半

車前子

當歸

剉微炒

芫薺

蛇床子

細辛

乾薑

炮製各半兩

右件藥杵羅為末煉蜜為丸梧子大每服三十九空

心日午以溫酒下予之故友江君雅曾仲容俱無

嗣因以此方贈之踰年而皆有子後有艾君肅黃翰

公者亦然故述之

趙氏蓯蓉兔絲子丸

肉蓯蓉

一兩三錢

覆盆子

蛇床子

川芎

當歸

兔絲子

各一兩二錢

白芍藥

一兩

牡蠣

鹽泥

固濟

烏賊魚骨

各八錢

五味子

防風

各六錢

條芩

五錢

艾葉

三錢

此方不寒不熱助陰生子前藥俱焙乾為末煉蜜丸

如梧子大每服三四十丸青鹽湯下早晚皆可服

加味香附丸男服聚精丸女服此

香附一斤

四兩老酒浸兩

宿炒搗碎再焙乾磨為末四兩米醋浸同上
四兩童便浸同上四兩用山梔四兩煎濃汁去

查入香附澤蘭淨葉六兩海螵蛸六兩搗
浸同上兩酒洗稍碎炒當歸四兩酒洗

川芎三兩白芍藥四兩懷熟地八兩搗
酒炒膏焙乾

各為末用浮小麥粉酒醋水打糊為丸如菉豆大每