

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷十四

十二至



北京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

備急千金要方卷十二

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

小兒驚風方

驚風第六

小兒出胎二百

日中患小兒

四肢縮動并脊脊跳眼反須臾氣絕良久復蘇已與常

小兒身患小瘡治護小瘡復發五

日變癰一日二十過發

治痢湯得快吐下經日不間爾後單與竹瀝汁稍進一日一夕中合進一升許發時小踈明日與此竹瀝湯得吐下發便大折其間猶稍稍與竹瀝汁

竹瀝湯方

竹瀝

五合

黃芩

三十銖

木防已

羚羊角

白朮

各六銖一作白鮮

大黃

二兩

茵芋

三銖

麻黃

白薇

桑寄生

草薢

甘草

各半兩

右十二味㕮咀以水二升半煮取藥減半內竹瀝煎
取一升分服二合相去一食久進一服一方無
革薺
紫菀湯治小兒中冷及傷寒暴嗽或上氣咽喉鳴氣逆
或鼻塞清水出方

紫菀

杏仁

黃芩

當歸

甘草

橘皮

青木香

麻黃

桂心

各六銖

大黃

一兩

右十味㕮咀以水三升煮取九合去滓六日至百

日兒一服二合半一百日至二百日兒一服三合

五味子湯治小兒風冷入肺上氣氣逆面青喘迫欬嗽

晝夜不息食則吐不下方

五味子

當歸

各半兩

麻黃

乾薑

桂心

人參

紫苑

甘草

各六兩

細辛

款冬花

各二銖

大黃

一兩半

白朮

右十二味㕮咀以水二升半煮取九合去滓兒六十

日至百日一服二合半一百日至二百日一服三合其

大黃別浸一宿下

一方無欬冬花大黃有大棗三枚

治小兒大人欬逆短氣胸中吸吸呵出涕唾嗽出臭膿

方

燒淡竹瀝煮二十沸小兒一服一合日五服大人一

升亦日五服不妨食息乳哺

治小兒寒熱欬逆膈中有癖乳若吐不欲食方

乾地黃

四兩

麥門冬

五味子

蜜

各半升

大黃

消石

各一兩

右六味呔咀以水三升煮取一升去滓內消石蜜煮
令沸服二合日三胸中當有宿乳汁一升許出大者
服五合

射干湯治小兒欬逆喘息如水雞聲方

射干

麻黃

紫苑

甘草

生薑

各一兩

半夏

五枚

桂心

五寸

大棗

二十枚

右八味呔咀以水七升煮取一升五合去滓內蜜五
合煎一沸分溫服二合日三

又方

半夏

四兩

紫苑

桂心

生薑

細辛

阿膠

甘草

各二兩

款冬花

二合

蜜

一合

右九味㕮咀以水一斗煮半夏取六升去滓內諸藥
煮取二升五合五歲兒服一升二歲服六合量大小
多少加減之服之立効

杏仁圓治大人小兒欬逆上氣方

杏仁三升熟搗如膏蜜一升為三分以一分內杏仁
搗令強更內一分搗之如膏又內一分搗熟止先食
已含咽之多少自在日三每服不得過半方寸匕則
利

又方

半夏二斤去皮河水洗六七度完用

白礬一斤為末

丁香

甘草

草豆蔻

川升麻

縮砂各四兩粗搗

右七味以好酒一斗與半夏拌和勻同浸春冬三七

日夏秋七日密封口日足取出用冷水急洗風吹乾
每服一粒嚼破用薑湯下或乾喫候六十日乾方得

服疑非孫思邈方

八味生薑煎治少小嗽方

生薑七兩

乾薑四兩

桂心二兩

甘草

款冬花各三兩

紫苑各三兩

杏仁

蜜各一升

右合諸藥為末微火上煎取如飴鋪量其大小多少
與兒含咽之百日小兒如棗核許日四五服甚有驗

四物款冬圓治小兒嗽晝瘥夜甚初不得息不能復啼
方

款冬花

紫莞

各一兩半

桂心

兩半

伏龍肝

六銖

右為末蜜和如泥取如棗核大傳乳頭令兒飲之日

三傳之漸漸令兒飲之

菖蒲圓治小兒暴冷嗽及積風冷嗽兼氣逆鳴方

菖蒲

烏頭

杏仁

礬石

細辛

皂莢

各六銖

款冬花

乾薑

桂心

紫苑

各十
八銖

蜀椒

五銖

吳茱萸

六合

右十二味為末蜜丸如梧子三歲兒飲服五丸加至
十丸日三兒小以意減之兒大以意加之暴嗽數服
便瘥

桂枝湯治少小十日已上至五十日卒得聲欬吐乳嘔
逆暴嗽晝夜不得息方

桂枝

半兩

甘草

二兩
半

紫苑

十八銖

闕

麥門冬

一兩十
八銖

右四味呿咀以水二升煮取半升以綿著湯中捉綿滴兒口中晝夜四五過與之節乳哺

麻黃湯治少小卒肩息上氣不得安此惡風入肺方

麻黃

四兩

甘草

一兩

桂心

五寸

五味子

半升

半夏

生薑

各二兩

右六味呿咀以水五升煮取二升百日兒服一合大

小節度服之便愈

癖結脹滿第七

方灸法
霍亂附

雙紫圓治小兒身熱頭痛食飲不消腹中脹滿或小腹
絞痛大小便不利或重下數起小兒無異疾惟飲食過
度不知自止哺乳失節或驚悸寒熱惟此丸治之不瘥
更可重服小兒欲下是其蒸候哺乳食減少氣息不快夜
啼不眠是腹內不調悉宜用此丸不用他藥數用神驗
千金不傳方

臣億等詳序例中凡云服紫丸者即前變
蒸篇中四味者是也云服紫丸不下者服

赤丸赤丸差駛病重者當用之方中並無赤丸
而此用朱砂又力緊於紫丸疑此即赤丸也

巴豆

麝核仁

各十
八銖

麥門冬

十
銖

甘草

五
銖

甘遂

朱砂

各二銖

牡蠣

蠟

各八銖

右八味以湯熟洗巴豆研新布絞去油別擣甘草甘遂牡蠣麥門冬下篩訖研蕤核仁令極熟乃內散更擣二千杵藥燥不能相丸更入少蜜足之半歲兒服如荏子一雙一歲二歲兒服如半麻子一雙三四歲者服如麻子二丸五六歲者服如大麻子二丸七歲八歲服如小豆二丸九歲十歲微大於小豆二丸常以雞鳴時服至日出時不下者熱粥飲數合即下丸

皆雙出也下甚者飲以冷粥即止

治小兒胎中宿熱乳母飲食粗惡辛苦乳汁不起兒乳
哺不為肌膚心腹痞滿萎黃瘦瘠四肢痿躄繚戾服之
可令充悅方

芍藥

柴胡 各二兩

大黃

人參 各一兩

乾薑

如熱以枳實代

甘草

各半兩

鼈甲

茯苓 各一兩半

右八味為末蜜丸如大豆服一丸一歲已上乳服三
丸七歲兒服十丸日二