

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷七十二



北京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷七十二

編輯外科心法要訣目錄

發無定處

上

疔瘡

流注

癰瘤

多骨疽

結核

痼發

癰疽


烏白癩

御纂醫宗金鑑卷七十二目錄

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷七十一

編輯外科心法要訣



黑點疔多生於
黃豆疔多生於唇口角

瘡疔多生於骨之間
火灼疔多生於唇指

白刃疔多生於口

紅絲疔

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑

發無定處

疔瘡

五藏皆可發疔瘡現於形體細考詳若論陰陽分上下
欲知經藏辨何方

疔名火焰發心經往往生於脣指中心作煩時神恍惚
痛兼麻癢炮黃紅

毒發肝經名紫燕此患多於筋骨見破流血水爛串筋
指青舌強神昏亂

黃鼓由於脾發毒多生口角與顴骨皸黃光潤紅色纏
麻癢硬殭兼嘔吐

毒發肺經名白刃白皸頂硬根突峻易腐易陷多損腮
咳吐痰涎氣急甚

從來黑靨發腎經黑斑紫皸硬如釘為毒極甚疼牽骨
驚悸沉昏目露睛

以上五疔應五藏又有紅絲疔一樣初如小瘡漸發紅
最忌紅絲攻心上

凡治疔證貴乎早三陰三陽更宜曉在下宜灸上宜鍼
速醫即愈緩難保

註此數證俱名曰疔蓋疔者如丁釘之狀其形小其
根深隨處可生由恣食厚味或中蛇蠱之毒或中
疫死牛馬豬羊之毒或受四時不正疫氣致生是
證夫疔瘡者乃火證也迅速之病有朝發夕死隨
發隨死三五日不死一月半月亦必死此係藏府
之乖逆性情之激變節候之寒溫肅殺且毒中有

淺深也若一時失治立判存亡有名為火焰疔者
多生於脣口及手掌指節間初生一點紅黃小皰
痛癢麻木甚則寒熱交作煩躁舌強言語疎忽此
屬心經毒火而成也有名為紫燕疔者多生於手
足腰肋筋骨之間初生便作紫皰次日破流血水
三日後串筋爛骨甚則目紅甲青邪視神昏睡語
驚惕此屬肝經毒火而成也有名為黃鼓疔者初
生黃皰光亮明潤四畔紅色纏繞多生口角腮顴

眼胞上下及太陽正面之處發時便作麻癢重則惡心嘔吐肢體木痛寒熱交作煩渴乾噦此屬脾經毒火而成也有名為白刃疔者初生白皰頂硬根突破流脂水癢痛兼作多生鼻孔兩手易腐易陷重則腮損咽焦欬吐痰涎鼻掀氣急此屬肺經毒火而成也有名為黑靨疔者多生耳竅牙縫胸腹腰腎偏僻之處初生黑斑紫皰毒串皮膚漸攻肌肉頑硬如丁痛徹骨髓重則手足青紫驚悸沉

困輒陷孔深目睛透露此屬腎經毒火而成也以
上五疔本於五藏而生又有紅絲疔發於手掌及
骨節間初起形似小瘡漸發紅絲上攻手膊令人
寒熱往來甚則惡心嘔吐治遲者紅絲攻心常能
壞人又有暗疔未發而腋下先堅腫無頭次腫陰
囊辜丸突兀如筋頭令人寒熱拘急炊熱疼痛又
有內疔先發寒熱腹痛數日間忽然腫起一塊如
積者是也又有羊毛疔身發寒熱狀類傷寒但前

心後心有紅點又如疹形視其斑點色紫黑者為老色淡紅者為嫩以上諸證初起俱宜服蟾酥丸汗之毒勢不盡憎寒壯熱仍作者宜服五味消毒飲汗之如發熱口渴便閉衄沉實者邪在裏也宜服黃連解毒湯加生大黃一錢五分葱頭五個清之凡證輕者宜服化疔內消散若疔毒將欲走黃急服疔毒復生湯已走黃者令人心煩昏憤急用七星劍湯以救之若手足冷六脈暴絕者係毒氣

閉塞元氣不能宣通先宜蟾酥丸隨服木香流氣
飲行氣其脈自見若疔毒誤灸煩躁譫語者乃逼
毒內攻也宜服解毒大青湯若潰後餘毒未盡五
心煩熱者宜服人參清神湯鍼後出膿之時氣虛
驚悸者宜服內托安神散若攻利太過以致發渴
六脈虛大者宜服補中益氣湯若發汗之後汗不
止熱不退瘡不疼便不利者此屬裏虛宜服八珍
湯加黃耆麥冬治之凡疔潰後不宜補早雖見真

虛只可平補忌用溫補之藥外治用藥鍼灸亦當
循其次第書云疔瘡先刺血內毒宜汗瀉禁灸不
禁鍼怕絲不怕鐵初覺貴乎早治十證十全稍遲
者十全五六失治者十壞八九初發項以上者三
陽受毒必用鉞鍼刺入瘡心四五分挑斷疔根令
出惡血隨用立馬回疔丹或蟾酥條插入孔內外
以巴膏蓋之如項以下生者三陰受毒即當艾灸
以殺其勢灸之不痛亦須鍼刺出血插蟾酥條旁

腫以離宮錠塗之如旁腫頑硬推之不動用鍼亂刺頑硬之處令多出惡血否則必致走黃挑法先用鍼幹將毒頂焦皮刮開鍼入疔根堅硬如鐵者為順若鍼刺入絛軟如瓜穰而不知痛者為逆百無一生凡挑疔根先出紫黑血再挑刺至鮮血出以知痛為止隨填拔疔散令滿以萬應膏蓋之過三四時撥去舊藥易以新藥若藥乾無水不痛者此挑法未斷疔根也再深挑之必以上藥知痛藥

入水流為率三四日後瘡頂乾燥以琥珀膏貼之
令疔根托出換九一丹撒之黃連膏抹之外蓋白
膏藥生肌斂口若初起失治或房勞夢遺損氣以
致毒氣內攻走黃不住者其瘡必塌陷急當隨走
黃處按經找尋有一芒刺直豎即是疔苗急當用
鐵鍼刺出惡血即在刺處用艾壯灸三壯以宣餘
毒若身面漫腫神昏悶亂乾嘔心煩作渴遍身起
皰抽搐者俱為逆證惟紅絲疔於初起時急用磁

鍼於紅絲盡處砭斷出血尋至初起瘡上挑破即用蟾酥條插入萬應膏蓋之隨服黃連解毒湯再暗內二疔不用挑法先以蟾酥丸含化令盡以冷水漱去毒涎再用三丸嚼葱白三寸裹藥黃酒送下蓋卧出汗少時無汗再飲熱酒催之仍無汗係毒熱滯結急用霹靂火法令汗出毒熱隨之而解次用雙解貴金丸下之自效若暗內二疔初起牙關緊急者用蟾酥丸三五粒葱頭煎湯研化灌之