

欽定四庫全書

子部

聖濟總錄纂要卷三



北京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

聖濟總錄纂要卷三

傷寒門

傷寒統論

論曰風寒暑濕飲食勞倦皆能為病是謂五邪冬傷於
寒者春必病溫春傷於風者夏必殭泄夏傷於暑者秋
必痲痺秋傷於濕者冬必咳嗽是乃四時之氣也然五

休寧程林纂

邪所中雖不同本皆外邪大率同類唯多冬時嚴寒其毒厲尤甚人或中之病在冬時則正名傷寒若邪毒藏於肌膚至春之時乘溫而發者溫病若留連日久至夏之時乘盛暑而發者為暑病所謂先夏至一日為病溫後夏至日為病暑是也其病之傳次先客於太陽其病令人頭項痛腰脊強其脉尺寸皆浮太陽不已傳於陽明其病體熱目疼鼻乾不得卧其脉尺寸皆大陽明不已傳於少陽其病胸脇痛而耳聾其脉尺寸皆弦少陽

不已太陰受之其病腹滿體重其脉尺寸俱微太陰不
已少陰受之其病口燥舌乾而渴或背微惡寒其脉尺
寸俱沉少陰不已厥陰受之其病煩滿舌卷囊縮其脉
寸尺俱緩病之所傳不過三陰三陽而已其未滿三日
者邪在陽經未入於裏其病在表宜汗之而愈若經四
日者邪入陰經其病在裏宜下之而愈特其大畧爾蓋
有一日而傳之數經者亦有數日而尚在太陽者陽病
雖宜發汗陽明之病反宜下之陰病雖宜下少陰之病

或宜溫之由人之稟受虛盛其傳有遲速又有不傳經者當審其脉證凡此六經受病五邪脉證各不同傷風必惡風其脉浮緩傷寒者必惡寒其脉浮緊以至傷暑脉虛傷溼脉濡人迎緊盛為傷寒氣口緊盛為傷食診得五邪知其本也診得六經知其標也有病雖在表而不可汗者或裏而不可下也或若汗之太多則津液燥竭遂致亡陽下之太早則邪氣動膈乃成結胸清濁相干則變為霍亂熱毒內瘀則變為瘀血又或為發黃者溼

熱相蒸也或為發斑者陽毒太盛也陽盛之人得之於
熱乃為陽毒陰盛之人得之於寒乃為陰毒蠱動則為
狐惑壞病之甚則為百合若勞復陰陽易之類雖差後
猶宜節慎變態多端不可備舉當以類求之皆以適當
為良唯兩感之病表裏皆受邪為難治其他或陰證似
陽陽證似陰或陰盛隔陽或陽盛隔陰者在診病者以意詳之

傷寒可汗

論曰傷寒病汗之而愈者以初得病一日至三日陽經

受邪未傳諸陰其邪在表故當發汗此大約也然病數日脉浮太陽證不罷者亦可汗之當以脉證為準凡頭痛發熱惡風振寒是為可汗之證其脉浮者是為可汗之脉陽虛則惡寒脉浮為在表或浮而弱或浮而緊或浮大而數皆宜汗之

麻黃湯方 治傷寒太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風發熱無汗而喘者

麻黃

去根節
三兩

桂

去粗皮
三兩

甘草

炙一兩

杏仁

去粗皮雙
仁七十枚

呖咀如麻豆大每服五錢水煎溫服覆取微汗不須
啜粥餘如桂枝法將息

大青龍湯方 治傷寒太陽中風脉緊發熱惡寒身痛
不汗出而煩躁

麻黃去根節 桂皮去粗 甘草各二 杏仁去皮尖雙 生

薑三棗大者 石膏一雞子

呖咀如麻豆大每服五錢水煎溫服脉微汗出惡風

者不可服

桂枝麻黃各半湯方 治傷寒太陽病得之八九日如
瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便一日二三度
發脉微緩者為欲愈也脉微而惡寒者此陰陽俱虛不
可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以
其不能得小汗出身必痒

桂去粗皮
一兩半芍藥 生薑 甘草 麻黃去根節
各一兩大

棗四枚杏仁三十四枚湯浸
去皮尖雙仁

㕮咀如麻豆大每服五錢水煎溫服

桂枝湯方 治傷寒太陽病外證未解脉浮弱者當以

汗解

桂去粗皮芍藥 生薑各三兩甘草二兩大棗十二枚

以咀如麻豆大每服五錢水煎溫服須臾啜熱稀粥

助藥力取微汗

麻黃附子甘草湯方 治傷寒少陰病得之二三日宜

微發汗以二三日無裏證故微發汗

麻黃去根節甘草各二兩附子一枚炮製去皮臍

呖咀如麻豆大每服五錢水煎溫服

葱豉湯方 治傷寒初覺一二日頭項腰脊痛惡寒

葱白十四莖 豉半合 乾薑一分 麻黃去根節 桂去粗皮 芍藥各半兩

呖咀如麻豆大每服五錢水煎溫服良久投葱豉熱

粥蓋覆出汗

葱粥方 治傷寒服葱豉湯後未得汗再服

葱白十莖并頭切 豉三合炒 生薑半兩拍碎

水五盞煎至二盞半去滓入白米依常法煮粥入少

鹽攪勻任意食之衣覆出汗未汗再服

麻黃葛根湯方 治傷寒初得一二日出汗

麻黃

去根節
一兩

葛根

柴胡

去苗各
一兩

芍藥

三分

每服五錢水一盞豉一百粒開口椒七粒連鬚葱白

三寸薄荷二十葉同煎熱服服後葱豉湯一盞投之

衣覆取汗未快再服

葛根湯方 治傷寒初覺頭痛惡寒壯熱腹內熱脉洪

大一二日宜服

葛根

黃芩

柴胡

去苗各半兩

蔥白

五莖合一

咬咀每服五錢生薑一棗大拍碎同煎溫服良久再

服得汗即止

麻黃解肌湯方 治傷寒初患一二日體熱頭痛

麻黃

去根節一兩

石膏

碎

葛根

各一兩半

甘草

一分半

芍藥

杏仁

去皮尖雙仁炒各一兩

桂

去粗皮三分

每服五錢生薑五片水煎溫服

葛根湯方

治傷寒一二日頭痛壯熱遍身疼痛其脉

洪數

葛根

白朮

芍藥

乾薑

各半兩

麻黃

去根節

桂

去粗

皮各三分甘草

炙一分半

每服五錢水煎熱服如脉微即加附子半兩

石膏人參解肌湯方

治傷寒初得一二日頭疼壯熱

惡寒脉浮緊

石膏

碎麻黃

各一兩

柴胡

去苗人參

各半兩

桂

去粗皮

甘草

各一分葛根

二兩

每服三錢入葱豉生薑同煎熱服

十味人參湯方 治傷寒頭痛體疼寒熱不解

人參

厚朴

生薑汁炙

桂

甘草

杏仁

去皮尖雙仁炒

白朮

乾薑

白茯苓

陳橘皮

湯浸去白各一兩

麻黃

去根節湯

煮去沫二兩

每服三錢生薑二片棗一枚同煎熱服纔覺傷風併

三兩服汗出立差

羌活湯方

治傷寒表不解頭痛體疼發汗

羌活 獨活 柴胡 前胡 人參 白茯苓

桔梗

芍藥

甘草

炙各一兩

枳殼

去瓢麤炒一兩

每服三錢生薑二片薄荷少許同煎溫服不拘時

葱豉湯方

治傷寒一日至三日以前身熱脉大肢體

疼痛汗不出

蒼朮

米泔浸去皮麤炒黃

麻黃

去根節湯煮去沫各二兩

甘草

炙桂各一兩

每服三錢葱白三寸鹽豉二十粒同煎熱服不拘時

候