

卷六湯方目

奔豚湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

桂枝加桂湯

備急丸

貪食食多不消心腹堅滿痛治之方

蛟龍病方

療犬肉傷

療食鱸傷

療

鱸癥

療蝨癥

療十年疰癖方

椒熨方

破癖湯

備急熨癥方

廣濟療驚癥

廣

濟療米癥

療米癥羸瘦至死

廣濟療髮癥

積塊丸

治食索粉積方

易簡紅丸

大

七氣湯

半硫圓丸

髮癥飲油方

食髮成

瘕方

酒驚氣驚血驚方

蛇瘕方

蛟龍病

方

蛇瘕

腹內蛇瘕方

血瘕方

虱瘕

婦人狐瘕方

以上積聚瘕瘕

甘草粉蜜湯

烏梅丸

療蚘虫攻心腹痛

療虫蝕下部

療傷寒慄

病

追虫丸

下虫丸

療寸白虫

又方

療濕慄虫

療蛔虫

療百虫方

鶴虱

散

胡粉丸

甘草瀉心湯

苦參湯

雄

黃

赤小豆當歸散

療心痛欲死

蕪黃

散

以上

頭痛方

又方

厥頭痛吐方

石膏

散 透頂散 痛風餅子 止痛太陽丹

氣攻頭痛方 治頭痛方 玉液湯 麝犀湯

秘方貼頭風熱病 清震湯 治頭內如虫

蛀響 玉真圓 茶調散以上頭痛 栝蘘薤白白酒湯

栝蘘薤半夏湯 枳實薤桂枝湯 茯苓杏

仁甘草湯 橘皮枳實生薑湯 薏苡仁附子散

桂枝生薑枳實湯 赤石脂丸 九痛丸

大建中湯 療胸脾心痛方 熨背法 療

心痛方 海蛤丸 失笑散以上心痛 甘薑苓朮湯

青娥丸

加味小柴胡湯

摩腰膏

療

腰痛方

又方

麋茸丸

藥碁子

以上腰痛

厚朴

七物湯

附子粳米湯

蒸臍法

厚朴三物

湯

大黃附子湯

以上腹痛

礬石湯

第一竹瀝湯

烏麻酒

茱萸木瓜湯

蘓子粥

杉木湯

栝榔散

木瓜散

雞屎白散

療轉筋

方

延效療轉筋

轉經灸法

以上脚氣

蘭臺軌範卷六

吳江徐靈胎洄溪著

孫男 華我聞校

積聚癥痞

靈素

靈白病始生篇黃帝問於岐伯曰夫百病之始生也皆生於風雨寒暑清濕喜怒喜怒不節則傷臟風雨則傷上清濕則傷下三部之氣所傷異類願聞其會岐伯曰三部之氣各不同或起於陰或起於陽請言其方喜怒不節則傷臟臟傷則病起於陰也清濕襲虛則病起於下風雨襲虛

則病起於上是謂三部。至於其淫泆不可勝數。黃帝曰

積之始生至其已成奈何。岐伯曰積之始生得寒乃生。四字

乃成積厥乃成積也。黃帝曰其成積奈何。岐伯曰厥氣生

足。惋惋生脛。寒脛寒則血氣凝滯。血氣凝滯則寒氣上入

於腸胃。入於腸胃則腹脹。腹脹則腸外之汁沫迫聚不得

散。日以成積。卒然多飲食則腸滿。起居不節用力過度則

絡脉傷。陽絡傷則血外溢。血外溢則衄。血陰絡傷則血內

溢。血內溢則後血。衄爲陽經之血宜涼後腸胃之絡傷則

血溢於腸外。腸外有寒汁沫與血相搏則并合凝聚不得

散而積成矣

凡積未有不因血而成者

卒然外中於寒若內傷於憂怒

則氣上逆氣上逆則六輸不通溫氣不行凝血蘊裏而不

散津液瀦滲着而不去而積皆成矣 六元正紀大論大

積大聚不可犯也衰其大半而止過則死 骨空論任脉

爲病男子內結七疝女子帶下瘕聚

息積 素奇病論帝曰病脇下滿氣逆二三歲不已是爲

何病岐伯曰病名曰息積此不妨於食不可灸刺積爲導

引服藥藥不能獨治也

積最宜外治

伏梁 靈邪氣臟腑病形篇心脉微緩爲伏梁在心下上

下行時唾血。素腹中論帝曰人有身體髀股脰皆腫環臍而痛是爲何病岐伯曰病名伏梁此風根也其氣溢於大腸而着於盲盲之原在臍下故環臍而痛也不可動之動之爲水溺瀦之病

難經

病有積有聚何以別之然積者陰氣也聚者陽氣也故陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚故積者五臟所生聚者六腑所成也積者陰氣也其始發有常處其痛不離其部上下有所終始左右有所窮處聚者

陽氣也其始發無根本上下無所留止其痛無常處故以是別知積聚也 五臟之積各有名乎以何月何日得之然肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至心下脾之積名曰痞氣在胃脘腹大如盤肺之積名曰息賁在右脇下覆大如杯腎之積名曰賁豚發於少腹上至心下若豚狀或上或下無時

金匱

師曰病有奔豚有吐膿有驚怖有火邪此四部病皆從驚發得之師曰奔豚病從少腹起上衝咽喉發作欲死復還

止皆從驚恐得之

夫瘦人繞臍痛必有風冷穀氣不行

而反下之其氣必衝不衝心下則痞

問曰病有積有聚

有滯氣何謂也師曰積者臟病也終不移聚者腑病也發

作有時展轉痛移爲可治滯氣者脇下痛按之則愈復發

爲滯氣

積聚皆有形滯氣則無形而有氣耳

病者腹滿按之不痛爲虛痛者

爲實可下之舌黃未下者下之黃自去

腹滿時減復如

故此爲寒當與溫藥

脉緊如轉索無常者有宿食也

薤不可共牛肉作羹食之成瘕病韭亦然

醋合酪食之

令人血瘕

病源

癥瘕 皆由寒溫不調飲食不化與臟氣相搏結所生也其病不動者直名爲癥若病雖有結瘕而可推移者名爲瘕瘕瘕者假也謂虛假可動也

蠶癥 謂腹內有癥結如蠶之形狀有食蠶觸冷不消生癥者有食諸雜物得冷不消變化而作者

蟲癥 人有多蟲而性好嚙之所嚙旣多腑臟虛弱不能消之變化生癥患者見蟲必嚙之不能禁止時從下部出亦能斃人

米癥 人有好啞米轉久彌嗜啞之若不得米則胸中清水出米不消化遂生癥結其人常思米不能飲食久則斃腹內有人聲 有人腹內忽有人聲或學人語而相答此乃不幸致生災變非關經絡臟腑冷熱虛實所爲也服雷丸可愈

髮癥 有人因飲食內悞有頭髮隨食成癥胸喉間如有虫上下來去者是也

蛟龍病 三月八日蛟龍子生在芹菜上人食芹菜入腹變成蛟龍其病之狀發則如癲

魚癥 有人胃氣虛弱者食生魚因爲冷氣所搏不能消之結成魚癥揣之有形狀如魚也

蛇癥 人有食蛇不消因腹内生蛇癥也亦有蛇之精液誤入飲食內食之其狀常若飢而食則不下喉食至胸內卽吐出其病在腹摸揣亦有蛇狀謂蛇癥也

酒癥 人有飲酒多而食穀少積久漸瘦遂常思酒不得則吐多睡不復能食是胃中有虫使之然名爲酒癥也

腹內有毛 人因飲食內誤有毛隨食入腹則漸漸羸瘦但此病不說別有證狀常自言因食毛以知之

積聚癥痞方

奔豚湯

金匱

奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱此主之

甘草

川芎

當歸

各二兩

半夏

四兩

黃芩

二兩

生

葛

五兩

芍藥

二兩

生薑

四兩

甘李根白皮

一升

右九味以水二斗煮取五升溫服一升日三夜一服

茯苓桂枝甘草大棗湯

金匱

發汗後臍下悸者欲作賁豚

此湯主之

桂枝

四兩

茯苓

半斤

甘草

二兩

大棗

十五枚

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取

三升去渣溫服一升日三服

桂枝加桂湯

金匱

發汗後燒針令其汗針處被寒核起而

赤者必發黃豚

小腹上至心灸其核上各一壯與

此湯

此灸法不循
穴道亦甚易

卽桂枝湯加桂二兩

脩急丸

金匱

治寒氣冷食稽留胃中心腹滿痛大便不通

大黃

乾薑

各二兩

巴豆

一兩去皮
研如脂

右先搗大黃乾薑爲末內巴豆合搗千杵和蜜丸如豆
大藏密器中勿洩氣候用每服三四丸煖水或酒下

又主中惡心腹脹滿卒痛如錐刺氣急口噤如卒死者
捧頭起灌令下咽須臾當差不差更與三丸當腹中鳴
卽吐利便差若口噤者須化從鼻孔用葦管吹入自下
於咽

此溫下之法 口噤不能服藥者亦是一法

貪食食多不消心腹堅滿痛治之方

千金

鹽一升水三升

右二味煮令鹽消分三服當吐出食便差

蛟龍病方

金匱

治春秋二時龍精帶入芹菜中人偶食之

爲病發時手背腹滿痛不可忍