

欽定四庫全書

子部

世醫得效方卷十四



南京中医药大学图书馆版权所有

次定由重人書

世作交一

和

產科兼人藥店科

濟陰論

齊世

信難承或

元 危亦林 撰

難濟陰猶急何則婦人

七瘕八瘕九痛十二帶

證狀推原其理無非血

病多因經脉失於將理臨蓐不善調護內作七情外感六淫陰陽勞逸飲食生冷遂致榮衛不輸新陳不忤隨經致濁淋露凝滯為癥為瘕流溢穢惡痛害傷痼以致所患不一而止犯時微若秋毫感病重於山嶽是也故女子十四而天癸至天謂天真之氣降癸謂壬癸水名故云天癸而衝任脉主之衝任者血之海也月水者經絡之餘也蓋婦人以血為本心生血肝行血榮衛四體如環無端灌注百脉餘者為月候以時而行若水溢自

流不自知覺故纖痾不作而氣體充盛而有子矣其有
來多不斷或過期不來或未期而先來參差不一而病
生當其來時則一二日之前腰腹滿痛或頭疼作熱百
節攣急甚於重患過此則發為虛熱自汗加以五心內
熱遂為虛勞血少水涸燥氣乘肺則為喘嗽宿寒留滯
血與氣搏則為腹痛敗血結塊時發寒熱則為癥瘕或
風寒濕滯經血化為水流溢四肢謂之血分脾不能制
血與水并浮脹肌肉謂之虛腫或衝任氣虛內慾過度

風邪冷熱之氣入於胞門穢液與血兼下冷則多白熱則多赤冷熱不調赤白相半或為赤白帶下若衝任勞損經海動傷脾虛胃弱不能約制其血倏然暴下故謂崩中漏下所下五色各應五臟五臟俱虛五色併下以致眩暈煩悶嘔惡怔忡迷亂多忘發狂妄語小便不禁是皆血之為病也復有生於嬌貴之家愛憎在念而氣逆于中故氣有一息不行血有一息不運則胃腹脹痛眩暈嘔噦倦乏不自勝持飲食不為肌膚致成重患治

療之際調氣為上調經次之斯可為定法受孕之後切
宜避忌胎殺所遊如經云刀犯者形必傷泥犯者竅必
塞打擊者色青黯繫縛者相拘攣甚至母殞驗若返掌
斷不可忽半產一證非如正產正產如果中栗熟其殼
自開兩無所損若半產則比之採斫新栗碎其膚殼損
其皮膜然後取得其實半產正類此以其胎臟傷損胞
繫斷去而後胎墜下皆因月未滿足誤服藥餌或寒邪
熱毒所傷或舉重打傷跌撲或犯禁忌或衝任脉虛漏

下所致生死形候亦如正產察認大抵半產須加十倍
調治或外證喘促痰壅恍惚昏迷不語惡露斷絕煩渴
或變痙候無復生全其有惡露通昏迷乍醒不喘促猶
可治也復有市井之家村落之婦恣情妄作偷生不正
或多日女厭於養育往往以早藥毒之驚憂敗血不下
衝心悶亂喘痰虛汗交作死者罔記聞者可不為戒治
之者須以解毒行血藥亟救則十全二三矣逮夫正產
有娠六七月切忌恣情交合八月亦忌飲酒呌怒洗頭

臨產必難產婦古以陣面健兒為喻可謂危矣臨產之初先脫尋常所穿衣以籠竈頭及竈口則易產不可喧閤宜謹選一熟善坐婆及得力家人扶持無使揮霍致令產婦憂恐惟當食軟飯糜粥之類若腹中痛且令扶行或痛或止名曰弄痛不可便行試水手探聽產母坐卧切須熟忍或服催生符藥却不可曲腰眠睡如連腰引痛眼中如見火色此是兒轉蓋腎則繫於腰胞繫於腎貼於脊更盡脉轉甚弦如急珠者即其驗矣又須令

人扶策徐徐而行若行步艱難即凭物立須臾扶策再行直至腰腹相引陣痛頻作又服催生藥勉強扶行痛陣轉甚難於行立認是產時將至然後坐草切勿太早恐子在腹中難於轉側及胞漿先破子道乾澁皆至難產務要產婦惜力若心中熱悶以蜜一匙新汲水調下若熱悶未解以生雞子一箇打破吞服直待兒迫產門頭面端正然後令人抱腰其抱腰之人不得傾斜則兒順其理自然易產又有卧產者須待卧定背平著席體

不偃曲則兒不失其道必無難產之理時當盛暑宜居
深幽淨室日色遠處開啟牕戶多貯清水以防血暈血
悶血溢妄行血虛發熱之證如冬末春初天色凝寒宜
密閉產室糊塞窓隙內外生火常令暖氣如春仍下襲
衣服不可去綿方免胎寒血結母致難產矣及至產訖
先令飲童子小便一盞無使就睡且令閉目而坐頃之
方可扶置於床宜仰卧立膝勿令伸足睡熟亦宜頻喚
醒產室無俾風著其肌致生他疾況產下切未可以得

男為喜恐為紅汗之證得女為憂恐致敗血衝心之患
惟當頻啜艾醋等湯藥常啐醋煙以防紫悶逡巡進少
白粥毋令過飽其有破水之後經日而不產者又當隨
證細辨身重躬熱作寒面黑舌青及舌上冷母死子活
面赤舌青母活子死唇口俱青吐沫子母俱斃倉皇之
間救治不可不審且當預與病家言之若胎衣不下者
停待稍久非惟產母疲倦又且血流入胞中為血所脹
上衝心胸喘急疼痛必至危篤宜急斷臍帶以少物繫

墜繫墜之時尤宜用心拴繫然後截斷不爾則胞上掩
心而死須使其子血脉不潮入胞中則胞衣自當痿縮
而下縱淹延數日亦不害人予治療多見之惟欲產母
心懷安泰終自下矣未可輕信坐婆妄用手法因此而
殂正產後中風口眼喎斜角弓反張六脉緊大自汗過
多虛極生風唇青肉冷剛柔二瘕項背彊硬手足攣急
咬齒嚼舌血虛眩暈頻發悶絕氣冷口鼻黑起出血不
止虛熱變生名胃絕肺眩喉中氣急喘促不息煩渴殊

甚惡露斷絕名孤陽絕陰五七日內彊力下床或憂怒
太過一月之內或傷於房事或亂行針艾以致眼昏口
噤肌肉暈搖腰脊彊直語言不出類皆難治猶宜敬謹
外此傷寒及諸雜病與男子等當以理血藥為助臨治
之際宜以意消息而加減之

護胎

驗胎法婦人經脉不行已經三月欲驗有胎

川芎

一兩半生用不見火

右為末空心濃煎艾湯調下方寸已覺腹內微動則
有胎

參蘇飲治外感風寒渾身壯熱眼暈頭旋或洗項背或
當風取涼致令頭目昏痛增寒甚至心胸煩悶妊娠不可
輕易投劑止宜用此以散表邪及治痰飲嘈煩忪悸嘔
逆不食腹滿此藥至和而且平嘔加白朮腹脹枳實虛
煩竹葉煩燥大渴麥門冬知母水停心下微吐逆茯苓

頭痛川芎腹疼加白芍藥

方見大方
科傷寒類

香蘇散治妊婦增寒壯熱頭痛身疼加川芎川白芷生

薑葱白煎得微汗解

方見大方
科傷寒類

石膏湯治妊婦傷暑頭疼惡寒身熱躁悶四肢疼痛背

項拘急唇口乾燥

柴胡 四兩

甘草 二兩

石膏 八兩

右剉散每服三錢水一盞生姜五片煎不拘時候溫

服若氣虛體冷加人參二兩

加減安胎飲凡婦人晝眠不起倦於梳飾乾惡心擇食

怕聞飯氣但喜鹹酸止經候明矣氣血弱者宜服此兼
進脾藥安胎溫養令母臟氣平和陰陽全備免有損墮
之患成者受胎母無疾耳溫胎保養之劑恐非所宜此
方兼治胎動不安腹痛漏下或胎奔上刺心短氣大效
漏胎下血不可用僭燥熱藥

條參

去蘆

嫩黃耆

去蘆

揚芍藥

大川芎

熟地黄

酒洗炒

川續斷

去蘆

側柏葉

炒

阿膠

燉炒

粉草

當歸

去尾

各等分

右判散每服四錢水一盞半生姜三片金銀器各一
半漏下不止加熟艾一握又如胎動口噤唇青下利
不入亦用熟艾一兩酒三盞煮至二盞去滓灌之即
安

桑寄生散治妊娠或因房室驚觸勞力過度傷動胞胎
或食毒物致令子宮虛滑經血淋瀝若不急治敗血湊
心子母難保日漸胎乾危亡不久

桑寄生

當歸

去蘆
酒浸

川續斷

酒浸

川芎