

醫學指要

醫學指要卷之三

癲狂辨治

癲病之來也以漸狂病之來也以卒難經曰重陽者狂重陰者癲陰陽寒熱判然各別而諸家有謂癲狂大概是熱豈其然乎癲卽癰也原非二症而諸家於癲症之外又有癰症牽強無足憑徒滋惑亂凡狂病多因於火治此者當以治火爲先而或痰或氣亦必審察而兼治之如清心湯涼膈散清膈散抱龍丸硃砂安神之類若痰飲壅閉氣道不通必須先用吐法並當清其飲食此治狂之要也凡癲

病多由痰氣治此者當察痰察氣因其甚者而先之至若
火之有無又當審其脉象而兼爲之治也如四磨飲牛黃
丸六安煎清膈飲硃砂安神之類若痰逆氣滯之甚者亦
必用吐法吐後隨症調理之要之癰症無火者多若無火
邪不得妄用涼藥恐傷脾氣以致變生他症又痴呆症凡
平素無痰而或以鬱結或以思慮或以驚恐言辭顛倒舉
動不經其症千奇萬怪脉必或弦或數或大或小變易不
常此其逆氣在心故肝胆二經氣有不清但察其無虛脫
症悉宜服蠶煎治之然胃氣元氣强者可治弱者不可

癲狂門列方

清心湯

黃連

黃芩

梔子

連翹

薄荷

甘草

芒硝

大黃

竹葉

涼膈散

見火症門

清膈散

陳皮

貝母

膽星

海石

白芥子

木通

抱龍丸

膽草

天竺黃

雄黃

朱砂

射香

右爲細末用甘草水煮極濃汁搗丸陰乾薄荷湯下

此方加牛黃名牛黃抱龍丸加琥珀名琥珀抱龍丸

硃砂安神丸

生地

硃砂

當歸

甘草

黃連

四磨飲

沉香

烏藥

枳實

檳榔

牛黃丸



白木

麥冬

枯黃芩

人參

補

蒲黃

山藥

炙艸

杏仁

桔梗

大豆黃卷當歸

肉桂

阿膠

白蘇

扶苓

川芎

防風

射香

冰片

羚羊角

犀角

雄黃

乾薑

大棗

金箔

煉蜜與東杵勻爲丸金箔爲衣

六安煎

見傷風門

服靈煎

生地

麥冬

芍藥

石菖蒲

石斛

川丹皮

茯神

陳皮

木通

知母

鬱症治法

王安道曰凡病之起多由於鬱鬱者滯而不通之義故有鬱久而生病者有病久而生鬱者經曰木鬱達之火鬱發之土鬱奪之金鬱泄之水鬱抑之言五行之化也諸病皆有此因病而鬱也景岳論情者三鬱一曰怒鬱二曰思鬱三曰憂鬱此因鬱而病也自古言鬱但知解鬱順氣通作

實邪是未可以膠柱鼓瑟之一疴結於心而傷於脾上達

脾胃下達肝腎不知培養而一味解散且施消伐其不致

於委頓者鮮矣是故治怒鬱逆氣未解者宜

解化

肝煎神香

越鞠之類逆氣既散肝脾受傷而致倦怠食少者則宜五

味異功或大營煎歸脾湯之類以調養之治思鬱初起宜

和胃飲啓脾丸之類及其既久而血氣日虧則宜以大營

煎歸脾湯之類治之治憂鬱初起宜二陳平胃之類久則

內傷歸脾壽脾五福七福之類皆可擇而用之若諸鬱滯

則但審其爲氣爲血爲食爲痰爲風爲濕爲寒爲熱分類

治之此則所以治實邪也然而實中有虛是又當兼顧其
本不然則愈虛愈鬱矣

鬱症門列方

解肝煎

見厥症門

化肝煎

青皮

陳皮

芍藥

丹皮

梔子

澤瀉

土貝母

神香散

丁香

白豆蔻

越鞠丸

香附

山查

神麴

麥芽

撫芎

蒼朮

梔子

五味異功散

見傷寒門

大營煎

見真中類中門

歸脾湯

見勞症門

和胃飲

陳皮

厚朴

乾薑

炙艸

啓脾丸

人參

白朮

陳皮

青皮

神麴

麥芽

砂仁

厚朴

乾薑

炙草

二陳湯

見傷風門

平胃散

厚朴

陳皮

蒼朮

炙草

壽脾煎

白朮

當歸

山藥

炙艸

棗仁

遠志

乾薑

蓮肉

人參

五福飲

見瘕症門

七福飲

五福飲加東仁遠志

三消分治

消症有三曰上消曰中消曰下消三焦受病也上消者大渴引飲隨飲隨渴古云其病在肺而不知心脾陽明之火皆能薰炙而然故又謂之膈消中消者多食善飢不爲肌肉其病在脾胃又謂之消中下消者小便赤黃爲淋爲濁如膏如脂面黑耳焦目漸消瘦故又名腎消此三消者古人悉認爲火症然有實火有虛火有陽消之症有陰消之症使不知辨虛實審陰陽鮮有不悞事者上焦屬肺中焦屬胃然總之火在中上二焦者無非胃火上炎之故二焦果由實火者皆宜白虎湯主治若渴多飢少病多在肺者宜

人參白虎湯若水虧於下火炎於上有不得清者宜压
女煎中消火症治以三補丸玉泉散白虎湯之類下消者
多腎水虧竭之症治以六味地黄之類然亦當辨其寒熱
渴澀分而治之總之治消之法必先察其脉症果實火致
耗精液者但去其火則津液自生而消渴自止若由真水
不足命火衰敗悉屬陰陽兩虛陽不生陰精不化氣者無
論上中下急宜治腎宜八味加冬味之類治之必使陰陽
漸充氣血漸復則病必自愈但知清火則陽無以生陰無
以化而日見消敗矣顧人知陰虛之消宜壯水而不知陽

虛之消宜補火此意惟景岳發之

消癰門列方

白虎湯

見傷寒門

人參白虎湯

見傷寒門

玉女煎

生石膏

熟地

麥冬

知母

牛膝

玉泉散

石膏

粉甘艸

三補丸

黃連

黃芩

黃柏

六味地黄丸

八味丸

見火症門

見真中類中門

怔忡驚恐髓雜不寐通治

怔忡之病心胸築築振動惶惶惕惕無時得寧者是也此症惟陰虛勞損之人乃有之其在經曰胃之大絡曰虛里出於左乳下其動應衣宗氣泄也若夫驚恐則肝胆與腎

之不足者也經曰東方色青入通於肝其病發驚駭又曰
肝氣虛則恐又少陽所至爲驚躁脅眩暴病又腎在志爲
恐恐傷腎怔忡驚恐雖有心脾肝腎之分然陽統乎陰心
本乎腎君相資輔精氣互根所以上不寧者未有不由乎
下心氣虛者未有不因乎精此心肝脾腎之氣名雖有異
而治有不可離者饑燥一症或作或止腹中空空若無一
物似飢非飢似辣非辣似痛非痛而胸中懊懣莫可名狀
此中雖有火饑瘦饑之別而由脾氣虛寒者恒多不寐症
分邪正有邪則實無邪則虛然而有邪不寐必兼外症