

海寒真方歌括

長樂陳修園著

傷寒真方謬括

味根叅匪板

序

醫者玉仲景至矣六經之理玉
傷寒論為矣自宋景濂學士
創為死全書之說而後之注
是書者任嘉剛移為抒臆說

刀圭家苦無適從吾聞陳
脩園前輩精於醫理嘗取仲
景傷寒揭其旨要示徑辯證
各立方例間有未盡明此復詳
注其所以然之妙未錄魏念

庭先生跋後以殿之顧曰真方款
括讀其果得其解是亦衛生之
一助也若夫引伸觸類不泥於
法而亦不背於法神而明以則
存乎其人矣

咸豐己未重陽前二日浚學林
壽萱謹序

傷寒真方歌括目錄

閩長樂陳念祖修園著

東冶林壽萱校

卷一

太陽上篇方法

太陽中篇方法

計歌括拾壹條

計歌括玖條

太陽下篇方法

太陽救誤變症方法

計歌括叁條

計歌括拾捌條

卷二

陽明上篇方法

陽明中篇方法

計歌括拾條

計歌括肆條

陽明下篇方法

計歌括叁條

卷三

少陽上篇方法

少陽中篇方法

計歌括陸條

計歌括叁條

少陽下篇方法

計歌括壹條

卷四

太陰全篇方法

計歌括式條

卷五

少陰全篇方法

計歌括拾陸條

卷六

厥陰全篇方法

計歌括伍條

陰陽易差後勞復病方法

計歌括伍條

未附魏念庭先生跋語

傷寒真方歌括卷一

閩長樂陳念祖修園著

冶南林壽萱校

太陽上篇方法

太陽為寒水之經。主一身之膚表。邪之初傷。必自太陽經始。論云。太陽為病。脈浮。頭項強痛。惡寒。統傷寒中風而言也。傷寒詳見中篇

茲請先別中風之病。論云。太陽病。發熱。汗出。惡風。脈浮。緩。或見鼻鳴。乾嘔者。為中風病。主以桂枝湯。服湯啜粥。

得。漿。漿。微。似。汗。則。愈。若。服。桂。枝。湯。大。汗。出。不。解。所。以。然。者。以。風。邪。得。微。汗。則。除。得。大。汗。反。不。除。病。不。去。則。變。浮。緩。之。脉。而。為。洪。大。仍。用。桂。枝。湯。取。微。似。汗。則。愈。倘。若。不。愈。則。病。如。瘧。狀。日。再。發。邪淺欲散宜。桂。枝。二。麻。黃。一。湯。撤。其。餘。邪。則。全。愈。矣。○。前。症。是。汗。後。餘。邪。未。盡。以。小。劑。為。緩。汗。法。此。症。是。過。經。不。解。不。可。不。汗。故。制。此。湯。以。急。汗。之。不。可。大。汗。故。制。小。劑。以。小。汗。之。人。知。大。劑。急。汗。之。法。而。不。知。小。劑。亦。有。急。汗。之。法。也。○。若。太。陽。病。得。之。八。九。日。頭。痛。項。強。雖。日。久。而。未。去。熱。多。寒。少。往。來。如。瘧。而。頻。發。

本論云一日是邪淺而欲衰。面上反有熱色。身癢。必得

二三度發。

少汗而全愈。宜桂枝麻黃各半湯主之。○桂枝症而兼喘者。宜桂枝加厚朴杏仁湯主之。○若燒針針處核起。因驚而發奔豚者。宜灸其核。以桂枝加桂湯主之。○若奔豚症欲作未作。其悸只在臍下者。宜茯苓桂枝甘草大棗湯主之。○若悸在心下。又手冒心者。因發汗過多所致。宜桂枝甘草湯主之。○若悞汗遂漏不止。惡風。小便難。四肢拘急者。宜桂枝加附子湯主之。○若桂枝症誤下之後。胸滿者。是陰邪盛于陽位。恐芍藥附和陰氣。

宜桂枝去芍藥湯急散之。若兼惡寒者恐薑桂力微。宜桂枝去芍藥加附子湯以溫散之。○若汗後陽虛陰氣凝聚身痛者以桂枝新加湯行其陽氣。○又有太陽傳入本腑症發熱六七日不解煩渴飲水水入即吐小便不利者宜五苓散表裏兩解之。又有太陽裏症而表邪具在下後心下滿小便不利者宜桂枝去桂加茯苓白朮湯利水則表邪自化此皆太陽症虛邪之方法也。

桂枝湯

發熱自汗是傷風。桂草生姜芍藥逢。頭痛項強浮緩脉。

必須稀粥成功。

芍藥桂枝生薑各三錢 炙草三錢 大棗四枚 水煎溫服。

須臾啜稀粥。溫覆取微似汗。此方最切於時用。中風

汗自出者用之。服麻黃湯復煩者用之。下後脈仍浮者

用之。氣冲利不止者用之。陰症脈浮為欲愈亦用之。

桂草辛甘化陽助太陽融會肌氣。芍草若甘養陰。故少

陰莫安營血。薑佐桂枝行陽。棗佐芍藥行陰。此方本不

發汗。藉熱粥之力。充胃氣以達於肺。令風邪從皮毛而

解。不傷氣血為諸方之冠。

時醫以桂枝湯麻黃湯地非北方時非冬月戒不敢
用。以羗獨蒼芎荆防代之。而不知此等藥更燥烈害
人也。桂枝湯以桂枝為君。色赤入心生血。得芍藥之
苦以和之。為陰陽調和之劑。麻黃湯以麻黃為君。比
物輕清走表。絕無辛烈之味。悍濁之氣。又佐之桂枝
入心化液。杏仁入肺降氣。甘草安內攘外。不加薑之
上行。棗之留中。逕走肌表。不傷津液。觀蒼芎羗獨之
類。孰和平孰峻烈耶。

桂枝二麻黃一湯

汗出不徹邪還襲。如瘧頻來時翕翕桂枝湯二麻黃
表後脈洪藉此輯。

桂枝一錢三分。芍藥生薑各一錢。炙草七分。麻黃七分。
杏仁十六箇。

大棗一枚。先煮麻黃去沫。後入諸藥。溫服。○此是麻黃
症。只用桂枝湯。汗不徹之故。故又作此湯。再解其肌。微
解其表。此又桂枝後。更用麻黃法也。○按柯韻伯云。麻
黃湯桂枝湯。兩方各煎。聽用。如各半湯。則各取其半而
合服之。此湯則取桂枝湯二分。麻黃湯一分。合而服之。
猶水陸之師。各有節制。兩軍相為表裏。異道夾攻之義。

也。後人等其分兩。合為一方。與葛根青龍草何異。

桂枝麻黃各半湯

面熱身癢。感雖輕。小汗輕施。顧衛營。麻杏桂薑芍棗草。減之各半。定方名。

桂枝一棧二分。芍藥生薑炙草麻黃各八分。杏仁七枚。

太棗二枚半。先煎麻黃去沫。入諸藥煎溫服。○此方原

小劑。治欲退之餘邪。活人借用之。以代解肌諸方。

桂枝加厚朴杏仁湯

桂枝厚朴杏仁湯。諸喘皆須疎利方。誤下喘成還用此。