

欽定四庫全書

子部

普濟方卷四百三



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院八品吏目臣黃發

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

普濟方卷四百三

明

周王朱橚 撰

嬰孩痘疹門

一切痘疹附論

夫嬰孩患疹痘瘡子者皆是積熱在於臟腑蒸鬱熱毒散於四肢小兒皮膚內嫩弱多成此疾凡食乳嬰孩湯藥不可與童兒同療用藥過劑必有損也蓋由輕啜乳在於臟腑熱極方成此疾腑熱生於細疹臟熱生

於痘瘡若用湯藥宜療於乳母也又絕乳嬰孩患者
多由積熱伏在於脾肺之間而不早以湯藥療其病
源則毒熱行於四肢榮衛之中漸透於肌膚之表疹
痘乃隨邪熱而出也嬰兒之性自然陽盛而陰微臟
腑陰陽氣逆大小便多秘不通纔覺是此疾即可便
與疎利即輕患也若已出即不可疎轉若出定却宜
利大小腸按扁鵲及倉公論云療於嬰孩服以湯散
性有可餌之者不可餌之者宜先和節陰陽調治榮

衛方利臟腑即熱氣漸解也○凡絕乳嬰孩生於疹痘或未出已前是此疾候按扁鵲論云可先以油劑服之行解四肢熱極或疹痘已出不可以油可服平和湯藥療於肝臟解於敗熱慮熱毒攻肝後衝於眼目生障翳今覩時醫及疾患之家疹痘未出已前多是誤認疾候皆以他藥解之其間或餌以躁藥或餌以冷藥不無失傷時醫用藥直候瘡疹子出病家方覺患者住餌醫者拱手已患之後俗多禁餌致大小便不通不能調於湯

藥和於臟腑遂停敗熱在於臟腑之間攻於肝臟疹痘
纔愈致令衝於眼目成於障翳不遇醫治瞳人遂損因
茲無所見也○凡斷乳嬰孩童子患疹痘疾候初覺多
似傷寒面色與四肢俱赤壯熱頭疼腰背疼足多厥冷
眼睛黃色脉息但多洪數纔大不定小便赤少大便多
秘纔覺四肢色候及脉息雖是疹痘疹未攻皮毛穴出
者便可以服餌勻和臟腑疎洩逐下若疹痘已結右皮
毛穴處微似出即不可疎洩也或疹出大盛竇穴膿水

者却可疎利也或未與疎利轉即且急服紫草飲子方
辯小兒痘証

呵欠 嚏噴 睡中發驚 或耳尖冷 眼澁

辯復食

口熱 或口中醋氣 妳辦不消 或腹中疼痛

如斑證少具其斑未發乃與升麻湯三五錢帶熱服
之待身表溫和斑瘡已顯服藥乃止如其身涼其斑
未出辦得斑証無問服數直候身表溫和斑瘡顯後

乃止只時時與桔梗湯寬利胸膈快咽喉

方

宣風散 治小兒瘡豆盛出身體熱煩渴腹脹氣喘大
小便澁面赤悶乳及氣腫水腫并一逐脾間風又治
風腫積腫又治熱筋脉攣縮作痛及豆瘡二三日瘡
病不佳欲死者一服効蓋熱氣蒸於皮膚故瘡痂不
得焦也宜服此導一二行後服生犀磨水解之瘡痂
即焦其効如神

檳榔 陳皮

甘草

各半

牽牛

用四兩半
生半炒

右為細末三二歲蜜湯下半錢三歲以下一錢食前
易老加防風海藏云與通膈丸相上下氣血也一方
用一錢水半盞食前服風熱蜜湯調下

牛蒡彊蚕散

牛蒡子

炒五錢

白彊蚕

去絲觔
炒一分

右為末每服一大錢水六分盞紫草二七寸煎四分
連三服量兒大小加減

薄荷散

家薄荷葉

一兩

麻黃

去節

甘草

炙各五錢

右為末入姜棗煎服量兒大小為劑

荊芥湯

荊芥穗

薄荷葉

牛蒡子

炒

甘草

炙各等分

右吹咀白朮煎量兒大小為劑

安班散

調理瘡疹已發未發皆可服之

川升麻

赤茯苓

白者亦用

黃耆

羌活

各一兩

人參

去蘆

枳殼去穰炒 桔梗 甘草各五錢

右咬咀每服二錢水半盞紫草少許薄荷一葉煎至五分去滓通口服之或加木通糯米同煎量兒大小為劑

余記治一小兒瘡豆毒氣入心心煩強躁適無討腦子處極是束手無措余自處一方應手而愈用萊豆粉一錢硃砂五分研極細麥門冬濃煎候溫調五分服隨即心神定自此而愈此乃解圍活法耳

余記一婦人年十八九歲出豆正出後忽平伏低陷適遇經脉行其家甚慌余曰証雖危然豆疹低伏乃是血動或苦無害遂用四物湯加人參黃芪四服痘子光壯後只是四物湯此病危甚而愈

當歸丸

當歸

五錢

甘草

一錢

黃連

大黃

各二錢半

右先將當歸熬膏子入藥末三味為丸漸加服之以利為度

消毒救苦散

治班疹悉具消化令不出如已出稀者

再不生斑仲冬立此方隨四時加減通造化明藥性者能此

麻黃 羌活 防風 各五分 川芎 藁本

葛根 蒼朮 黃芩 酒炒 生黃芩 柴胡 各二分

細辛 紅花 蘇木 橘皮 白朮 各一分

升麻 生地黃 酒黃栢 各五分 生甘草 一分

黃連 當歸身 各三分 連翹 五分 吳茱萸 半分

右判如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去滓熱

服空心食前夫斑瘡出者皆因內傷必出斑營氣逆故也大禁牽牛巴豆食藥宜用半夏枳朮大黃益智之類去其青瀉止其吐若耳尖冷呵欠睡中驚嚏噴眼澁必出斑也○諸大膿胞水小班癰疹三色皆營氣逆而寒復其表宜以四味升麻湯中加當歸連翹此定法也○如肺或膿斑先顯喘咳或氣高而喘促加人參黃芩以瀉壯火而補元氣○如心出小紅斑必先見血溢驚身熱肌肉腫脉弦洪少加黃連○如

命門出癰疹先必骨疼痛不敢動搖少加生地黃黃
栢○諸斑疹皆為陰証瘡瀕因傷於乳食脾胃不足
營氣逆行雖火勢內熾陰覆其外故錢仲陽製四物
升麻湯發之如有傳變証依加減服之

紫草飲子 治小兒痘瘡出被風吹復不見入皮膚內

紫草 人參 芍藥 蟬蛻 甘草 川山甲

土拌

炒各
等分

右為末每服一錢水一盞煎七分作三四次溫服

平和飲子 治小兒瘡疹

人參 白朮 茯苓 甘草 升麻 各等分

右為細末每服一二錢水煎去滓溫細細飲之量歲大小虛實以意詳之此藥治諸瘡疼痛煩渴不寧者皆可服之惟小兒瘡疹尤佳

連翹散 治一切熱兼治瘡疹有神

連翹 防風 梔子 甘草 各等分

右為末水煎服海藏云治熱在外而不厥此少陽藥

也

木香散

藥性溫平能和表裏通行津液清上實下救

陰助陽治小兒腹脹瀉渴其効如神○瘡始出五六

七日之間身熱或腹脹足指冷或瀉渴或身熱驚悸

腹脹或瀉頻津液內耗血氣不勻瘡雖起而不靨如

身溫腹脹咬牙喘渴難治緣水穀去多津液枯竭飲

水不止蕩散真氣故多死者急與木香散異功散救

之若欲靨已靨忽不能靨腹脹煩渴及瘡已靨其痂