



数据加载失败，请稍后重试！



数据加载失败，请稍后重试！



数据加载失败，请稍后重试！



数据加载失败，请稍后重试！

江西省中醫驗方秘方集第三集

目 錄

內 科

痢 疾	12方
瘧 疾	6方
血絲虫病	12方
血吸虫病	2方
水腫臌脹	9方
黃 疸	10方
肺 病	7方
胃 病	11方
胃 腸 炎	9方
噯 呃 逆	5方
吐 血	11方
鼻 衄	6方
便 血	3方
癲 狂 癩	3方
腰 痛	2方
暑 症	4方
腸 癰	1方
头 痛	5方

腦充血..... 1方

大頭癩..... 2方

遺精..... 2方

婦科

避孕..... 1方

胎前病..... 4方

產後病..... 1方

催乳..... 2方

崩帶..... 4方

小兒科

預防麻疹..... 2方

牙疳..... 3方

百日咳..... 3方

五官科

眼疾..... 5方

耳疾..... 3方

齒疾..... 4方

口腔病..... 7方

外傷科

瘰癧..... 2方

痔瘡..... 3方

淋病	4方
疝气	5方
鬚鬚	6方
癰疽类	9方
瘡瘍类	3方
疹癩类	6方
中毒类	2方
跌仆损伤	7方
破伤出血	9方
湯火伤	9方
針灸	10方
共計	237方

痢 疾

1. 民 間 方

主 治：紅白痢。

处 方：馬齒莧 木槿花。

制法和用法：共煎水服，紅痢用紅木槿花，白痢用白木槿花。

来 源：崇仁县衛协分会熊浪平。

2.

主 治：痢 疾。

处 方：北山查五錢 川根朴三錢 北細辛八分

制法和用法：上藥共研細末，雞脚爪生的搗汁，將上藥末分三次對服。

禁 忌：忌煎炒、辛辣、魚腥。

来 源：瑞金九堡中醫藥社鍾天墀。

3.

主 治：噤口痢（紅白痢里急后重，四五日不能食）

处 方：雉雞一只（即山雞或称野雞）

制法和用法：將雞去腸杂，入沙罐內燉四五小時，不能食雞者，吃湯，盡量服，可以入鹽少許，能吃雞者亦可。

来源：进贤高桥中医联合诊所赵松寿

4.

主治：噤口痢。

处方：绿豆粉 白糖

制法和用法：冷开水调服屡效。

来源：吉水县王勤益。

5.

主治：久痢不止。

处方：麻油 鹹魚

制法和用法：用麻油煎鹹魚食数次效。

来源：吉水县王勤益。

6.

主治：多年痢疾。

处方：鴉旦子（去壳）桂元肉包之。

制法和用法：大人每包七粒，多则七包，少则五包，小儿每包三粒，多则五包，少则三包，空心服滚水吞下。

禁忌：戒食生冷量腥。

来源：吉水县王勤益。

7.

主治：痢疾

处 方：生苦瓜一条紅 糖二两白糖二两。

制法和用法：苦瓜搗爛如泥，紅痢用紅糖，白痢用白糖，紅白均有，紅白糖各一两搗勻。过二小时將水濾出，一次冷服。

来 源：进賢赵松寿（高桥中医联合診所）

8.

主 治：紅痢不止。

处 方：馬齿莧搗汁半杯兌蜂蜜半杯。

制法和用法：空心热服即愈。

来 源：吉水县王勤益。

9.

主 治：噤口痢

处 方：煨姜三錢 食鹽火三分，沙糖三錢 陈倉米一撮

制法和用法：共煎湯服，外用田螺搗爛敷臍上。

来 源：吉水县王勤益。

10.

主 治：紅白痢疾，里急后重，腹痛难忍，日夜痢下无度（并兼治水瀉）。

处 方：栗壳七个溫水泡去筋膜蜜炙 炙甘草七寸 烏梅七个打碎
紅棗七个 灯芯十莖。

制法和用法：水一碗，水酒一盅，同煎，分二次服，連服三剂，小儿酌減。

- 禁忌：**忌食猪肉、油、梨。
- 治 驗：**1. 东源村曾某，男，十四岁，患痢五六天，腹痛赤白相兼，每日十余次，經服此方三剂而癒。
2. 田南村李某，男，十六岁，患痢日夜二十余次，腹痛不食，經服此方四剂愈。
3. 金溪县王家边村熊某，男，三十八岁患痢十余天，服此方五剂愈。
- 来 源：**資溪县高田乡楓林医药社石水清

11.

- 主 治：**久痢腹痛。
- 处 方：**鉄脚鳳尾草二两 楓树蓀少許 黄 糖少許
- 制法和用用：**先將鳳尾草，楓場蓀炒干后配黄糖 燉水一大碗，分次服。
- 来 源：**寻鄔留丰联合診所鄺世忠。

12.

- 主 治：**妇人产后赤白痢疾。（凡妇人产后气血虛弱，腹痛，里急后重，下痢赤白，飲食少納）
- 处 方：**杭白芍三錢 白云苓三錢 白头翁二至三錢
条芩一錢至一錢五分 广木香一錢五分 全当归二錢
砂仁一錢至一錢五分 厚朴一錢五分 香附二錢五分至三錢
粉甘草八分至一錢
- 制法和用法：**水煎日服一剂，飯前服。

禁治

忌：忌煎炒生冷粘滯食物。

驗：1. 周某，女26岁住龙南县上楊乡，1957年10月患者产后第三日腹痛，腰痛，赤白痢，里急后重，口苦，两脉沉稍数，面黄瘦帶黑，舌边絳，中白膩微黄，处方以 全当归二錢 酒白芍三錢 酒条芩一錢 白云苓二錢 广木香一錢五分 制香附二錢五分 川續断一錢五分 白头翁二錢 川厚朴一錢五分 西砂仁一錢五分 左秦艽二錢 粉甘草一錢 水煎服一剂。翌日伊夫来所改方，据云，服一剂后，腰痛、下痢均減，仍照前方加減

全当归二錢 生白芍三錢 酒条芩一錢五分
白云苓三錢 广陈皮一錢 广木香一錢
炒黑地榆一錢 白头翁二錢 西砂仁一錢五分
漂白术一錢 川厚朴一錢 粉甘草一錢
紅 棗二粒 老 米一撮 水煎再服一剂愈。

2. 廖某女性37岁，产后二十余天，患赤白痢，里急后重，胸肋下腹痛，小便淋瀝作痛，微咳嗽，舌絳，苔黄膩，脉沉濡。处方以 全当归一錢五分 生白芍三錢 北柴胡八分 黄条芩一錢五分 赤茯苓三錢 西砂仁一錢 白头翁三錢 生香附三錢 广木香一錢五分 車前子二錢 川厚朴一錢五分 陈只实二錢 漂白术一錢 生甘草八分 水煎服一剂。服后症減，但呵欠甚多改方如下：

正結面党三錢 土炒白朮二錢 正北薯一錢五分
正川芎一錢五分 全當歸三錢 酒白芍三錢
木香一錢 戶陳皮二錢 西砂仁二錢
白朮一錢 桂支尖二錢 白頭翁一錢五分
粉甘草一錢 姜棗二片 水煎服一劑而愈。

來源：龍南縣龍南鎮中醫聯合診所黃展云

瘧疾

1.

主治：瘧疾（一日發，間日發，三日一發及年久瘧疾。）

處方：川常山六錢 制烏豆一兩 大紅棗一兩（去核）

制法和用法：先將烏豆炒過，後放入常山，大棗，水煎濾去渣，加米酒一、二兩對服，不飲酒者，可酌減酒量，連服三、四劑、屢用屢效。

來源：新建衛協分會

2.

主治：瘧疾

處方：明雄黃一錢 川常山二錢 北柴胡二錢 草果仁二錢

制法和用法：共研細末，用紅棗水每早試服五分，至三、四次不能再發。

禁 忌：小孩忌服。
来 源：新建衛协分会。

3.

主 治：不論新久瘡疾
处 方：巴 豆二两 （去壳）搗研淨末五錢
白胡椒二两 草果仁二两

制法和用法：右药共研極細末掺入膏药中于临發前二小时將膏药貼于脊骨第三处一周取下。

来 源：清江衛协分会聶桂芳

4.

主 治：久瘡（一日、間日、三日瘡）
处 方：烏鷄蛋一个 北細辛七至九根，一二寸長。

制法和用法：將蛋穿一小孔，把細辛納入蛋內，用紙糊好蛋孔，放文火內炙，临臥时吃，一日一个，吃至五七个自愈。

来 源：进賢高橋中医联合診所赵松寿

5.

主 治：久瘡
处 方：陈皮（留白）五錢 砂仁、蒼朮、甘草各二錢
茯苓、常山各三錢 檳榔一錢二分 草果一个煨

制法和用法：先一晚用酒娘煎好，取鉄器盖之露1宿次早仍热滾，略对开水服之效

禁忌与反应: 忌食魚腥之类

来源: 宜黄陈光表

6.

主治: 乳儿患瘡。

处方: 扁豆花四至五分

制法和用法: 乳蒸，去花吃乳，服后嘔吐痰涎愈。

禁忌: 服后不可接近扁豆和扁豆藤，接近即复發。

来源: 新建衛协分会熊惠生。

血 絲 虫 病

1. 鷄鳴散(准繩方)

主治: 血絲虫病 (陽性微絲蚴, 兼淋巴管炎)

处方: 苏叶一錢 吳子一錢 桔梗二錢 木瓜三錢
陈皮二錢 檳榔三錢 生姜二錢

制法和用法: 提煉藥, 每日早晚各服一剂。

治驗: 治疗患者七例治疗程十天, 血片檢查, 微絲幼完全消失者二例, 較原減少90%者二例, 減少50%以上者三例。

来源: 黎川县茶亭医院楊吉亞

2. 四物湯加味

主治: 血絲虫病 (陽性微絲蚴, 兼微絲蚴淋巴管炎)

处 方：当 归三錢 地 黃六錢 炒白芍三錢
川 芎錢半 木 瓜三錢 枳 榔三錢

制法和用法：提煉葯，每日早晚各服一劑。

治 驗：治療患者六例，治療程十天。微絲蚴完全消
失者一例。減少90%者一例，減少50%者三例。
微絲蚴反而增加者1例。

来 源：黎川县茶亭医院楊吉亞。

3. 桂芍知母湯

主 治：血絲虫病（陰性象皮腫，和象皮腫兼淋巴管炎
者）

处 方：炒芍葯三錢 知 母五錢 防 風一錢
漂白朮二錢 桂 支二錢 附 子二錢
麻 黃二錢 炙甘草二錢 生 姜二錢

制法和用法：提煉葯，每日早晚各服一劑。服后一般体征有
所減輕。

来 源：黎川县茶亭医院楊吉亞。

4.

主 治：血絲虫病（下肢腫大）

处 方：生黃芪三錢 西党參三錢 全当归三錢
炒碎补二錢 川牛夕錢半 黑附片三錢
正血竭錢半 炒川芎二錢 生苡仁二錢
炒蒼朮錢半 川木瓜二錢 炙甘草錢半

制法和用法：水煎，連服三劑效。

来源：資溪县衛生局。

5.

主治：血絲虫病（習慣性下血，脚腫大不消）

处方：白 芨二錢 附 片二錢 川 朴錢半
早 杞二錢 陈 皮二錢 蒼 朮二錢
紫草根五分 甘 草一錢 西 党二錢
生 姜三片 生 芪五錢 当 归二錢
川 芎錢半 玉 活一錢 广 香錢半
紅 花錢半

制法和用法：水煎加米酒一杯，白糖二錢冲服。

来源：資溪县衛生局。

6.

主治：血絲虫病（初起而有炎症——紅、腫、痛熱）

处方：木 瓜五錢 牛 夕二錢 伏 毛二錢
广 香錢半 茯 苓二錢 甘 草一錢

針 灸：足三里、复留、內庭、丘墟，解谿（輪流应用）

制法和用法：上药煎服，一边服药，一边針灸良效。

来源：資溪县衛生局。

7. 民間方

主治：血絲虫病（初發紅、腫、熱痛者）

处方：紅 糖二兩 木 耳五錢

制法和用法：同炒吃。