

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷三十六



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

備急千金要方

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

傷寒方

刺法

問曰夫瘡者何也

暑秋為瘡瘡也問曰瘡

者陰氣也風者陽氣也

先傷一寒而後傷一風故先寒而後熱也病以時作名

曰寒瘧問曰先熱而後寒者何也對曰先傷于風而後傷于寒故先熱而後寒也亦以時作名曰溫瘧其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩悶手足熱而欲嘔名曰瘴瘧問曰夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍舍于何藏對曰溫瘧者得之冬中于風寒氣藏于骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能自出因遇大暑腦髓鑠肌肉消腠理發泄因有所用力邪氣與汗皆出此病邪氣先藏于腎其氣先從內出之于外也如是則陰虛而陽

盛盛則病矣衰則氣復反入入則陽虛虛則寒矣故先
熱而後寒名曰溫瘧問曰瘧瘧何如對曰瘧瘧者肺素
有熱氣盛于身厥逆上衝中氣實而不外泄因有所用
力腠理開風寒舍于皮膚之內分肉之間發則陽氣盛
陽氣盛而不衰則病矣其氣不及于陰故但熱而不寒
氣內藏于心而外舍于分肉之間令人消鑠脫肉故名
曰瘧瘧夫瘧之旦發也陰陽之旦移也必從四肢始也
陽已傷陰從之故氣未并先其時一食頃用細布索緊

束其手足十指令邪氣不得入陰氣不得出過時乃解
夫瘧脉自弦也弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者可
下之弦遲者可溫之若脉緊數者可發汗針灸之脉浮
大者吐之瘧脉弦數者風發也以飲食消息止之

瘧歲歲發至三歲或連月發不解者以脇下有痞也治
之不得攻其痞但得虛其津液先其時發其汗服湯已
先小寒者引衣自覆汗出小便利即愈瘧者病人形瘦
皮上必粟起也病瘧一日發當以十五日愈設不瘥當

月盡解也令不愈當云何師曰此病結為癥瘕名曰瘧
母急當治之鼈甲煎圓主之方

成死鼈

十二斤治如食法要略作鼈用三兩

半夏

人參

大戟

各六銖

瞿麥

阿膠

紫葳

一作紫葍

牡丹皮

石葦

乾薑

大黃

厚朴

桂心

海藻

要略作赤消

葶藶

蜣螂

各十銖

蜂窠

桃仁

芍藥

各一兩

柴胡

一兩半

烏羽

燒一作烏扇

黃芩

各十銖

麝香

蜜蟲

各三十銖要
畧作鼠婦

右二十四味為末取鍛竈下灰一斗清酒一斛五斗

以酒漬灰取酒著鼈盡爛泯泯如漆絞去滓下諸藥

煎為丸如梧子大未食服七丸日三

仲景方無
大戟海藻

柴胡栝蒌根湯治瘧而發渴者方

柴胡

黃耆

人參

甘草

生薑

各三兩

大棗

二十枚

栝蒌根

四兩

右七味㕮咀以水一斗二升煮取六升去滓煎取三

升溫服一升日三

牡蠣湯牡瘡者多寒治之方

牡瘡一作牡瘡

牡蠣

麻黃

各四兩

甘草

二兩

蜀漆

三兩無以恒山代之

右四味先洗蜀漆三過去腥以水八升煮蜀漆

麻黃得六升去沫乃內餘藥煮取二升飲一升即吐

出復飲之

蜀椒散多寒者牡瘡也治之方

蜀椒

雲母

龍骨

各等分

右三味治下篩先未發一炊頃以酢漿服半錢臨發服一錢溫瘧者加蜀椒半分雲母取火燒之三日三

夜

要畧不用雲母用雲貴

有瘧瘧者陰氣孤絕陽氣獨發而脉微其候必少氣煩滿手足熱欲嘔但熱而不寒邪氣內藏于心外舍于分肉之間令人消鑠脫肉也

有溫瘧者其脉平無寒時病六七日但見熱也其候骨

節疼煩時嘔朝發暮解暮發朝解名溫瘧

白虎加桂湯治之方

石膏

斤一

知母

兩六

甘草

兩二

粳米

合六

右四味㕮咀以水一斗二升煮米爛去滓加桂心三兩煎取三升分三服覆令汗先寒發熱汗出者愈

麻黃湯治瘧須發汗方

麻黃

括萎根

大黃

各四兩

甘草

兩一

右四味㕮咀以水七升煮取二升半分三服未發前

食頃一服臨發一服服後皆厚覆取汗

治瘡或間日發者或夜發者方

恒山

竹葉

各三兩

秫米

一百粒

石膏

八兩

右四味㕮咀以水八升銅器中漬藥露置星月下高
淨處橫刀其上明日取藥于病人房中以銅器緩火
煎取三升分三服清旦一服未發前一食頃一服臨
發一服三服訖靜室中卧莫共人語當一日勿洗手
面及漱口勿進食取過時不發乃澡洗進食并用藥

汁塗五心胃前頭面藥滓置頭邊曾用神驗救急方用烏梅

二七枚

又方先作羊肉臠麵餅飽食之并進少酒隨所能令其欣欣有酒氣入密室裏然炭火厚覆取大汗即瘥

又方燒黑牛尾頭毛作灰酒服方寸匕日三

恒山圓治瘡瘡說不可具方

恒山

知母

甘草

大黃各十銖

麻黃一兩

右五味為末蜜和丸如梧子大未食服五丸日二不

知漸增以瘥為度

肘後無大黃

又方治瘡經數年不瘥者兩劑瘥一月已來一劑瘥方
恒山三兩為末以雞子白和併手丸如梧子大置銅
枕中于湯中煮令熟殺腥氣則止以竹葉飲服二十
丸欲吐但吐至發令得三服時早可斷食而晚不可
斷食可竹葉汁煮藤少食之

梔子湯治同前

梔子

十四枚

秫米

十四粒

恒山

三兩

車前葉

二十七枚
炙乾

右四味㕮咀以水九升煮取三升分三服未發一服
發時一服發後一服以吐利四五行為瘥不止冷飯
止之

治老瘡久不斷者方

恒山

三兩

烏賊骨

升麻

鼈甲

附子

各一兩

右五味㕮咀絹袋盛以酒六升漬之小令近火轉之
一宿成一服一合比發可數服或吐下

治瘡無問新久者方

小便

一升半

蜜

三匕

右二味煮三沸頓服每發日平旦時服自至發勿食
重者漸退不過三服瘡

又方

鼠尾子

車前子

各一虎口

右二味呿咀以水五升煮取二升未發前服盡

又方馬鞭草汁五合酒三合分三服

又方擣葭蓉根燒為灰和水服一合量人大小強弱用之

又方瓜蒂二七枚擣水漬一宿服之

又方常以七月上寅日採麻花為末酒服方寸匕

又方故鞋底去兩頭燒作灰井花水服之

又方服翹搖汁