

壽世保元

卷之五

增補醫林狀元壽世保成集卷五

太醫院吏目金點雲林龔廷賢子才編 男 龔廷賢校

眩暈

脈風寒者濕氣鬱生涎下虛上實皆暈而眩風浮寒緊濕細暑虛涎絃而滑虛脈則無治眩暈者尤當審諦先理痰氣次隨證治

眩者言其黑暈言其轉冒言其昏眩暈之與冒眩其義一也其狀目閉眼眩身轉耳聾如立舟車之上起則欲倒蓋虛極乘寒得之亦不可一途而取孰也風則有汗寒則掣痛暑則熱悶濕則重滯此四氣乘虛而眩暈也喜怒哀樂悲恐憂思鬱而生痰隨氣上厥七情致虛而眩暈也淫慾過度腎家不能繼氣歸原使諸氣逆奔而上此眩暈之出於氣虛也明矣吐衄漏崩肝家不能收攝榮氣使諸血失道妄行此眩暈之生於血虛也又明矣以致新產之後血海虛損或瘀不行皆能眩暈是可推尋致病之因乎治法隨機應敵其間以升降鎮墜行焉最不可妄施汗下然而眩暈欲解自汗則有之若諸逆發汗劇者言亂目眩與夫少陰病下利止而頭眩時時自汗者此虛極而脫也識者將有採薪之憂 清暈化痰湯

王方治眩暈之總司也

陳皮^{半夏} ^{姜汁} 白茯苓^{去皮各}

枳實^{一錢} 川芎^{黃芩}

白芷^{細辛} 南星^{姜汁}

防風^{羌活}

各七 甘草^三 右到一劑生薑三片水煎服以此作丸亦可

氣虛加人參七分 白朮去蘆一錢

血虛加當歸倍川

芎

有熱加黃連薑炒七分

一論頭旋眼黑惡心煩悶氣短促上喘無力言語心神顛倒目不敢開如在風雲中頭若裂身重如山四肢厥冷不得安睡

此乃胃氣虛損停痰而致也 半夏白朮天麻湯 方見頭疼

一論勞役之人饑寒眩暈者狀虛弱也 補中益氣湯 方見內傷 依本方加半夏天麻白芍熟地黃 一眩暈屬氣虛有濕

痰者依本方去柴升加白茯苓川芎半夏天麻桔梗白芷

一論陰虛火動眩暈者狀心數也 清離滋坎湯 方見勞瘵 依本方加川芎天麻山梔竹瀝少許

一論真陽不足上氣喘急氣短自汗虛極欲倒如坐舟車眩暈手足冷脈沉細也 參附湯 人參五 大附子三 右

劉一創生薑十片水煎熱服

一論眩暈之症因氣虛痰火炎上故也

清陽除眩湯

人參

白朮

白茯苓

陳皮

半夏

天麻

分 檳榔

旋覆花

甘草

右劉一創生薑三片水煎服

一論肥白人日常頭眩眼花卒時暈倒者名痰暈

清痰祛眩湯

南星

半夏

天麻

蒼朮

川芎

陳皮

茯苓

桔梗

枳殼

烏藥

酒芍

羌活

甘草

右劉生薑水煎

臨服入竹瀝姜汁同服

一論體虛之人一時為寒所中口不能言眩暈欲倒手足厥冷

姜附湯

乾姜

附子

大附子

生薑

右劉每五錢水煎

溫服

一論一切失血過多眩暈不醒者

芎歸湯

川芎

當歸

右劉水煎溫服

虛甚加炮過大附子

一論氣血兩虛而挾寒作頭目眩暈者

十全大補湯

方見補益

依本方如有痰加陳皮半夏

一治一人形體魁梧不慎酒色因勞怒頭暈仆地痰涎上壅手足麻痺口乾引飲六脉洪數而虛予以為腎經虧損不能納

氣歸原而頭暈不能攝水歸原而為痰陽氣虛弱而麻痺虛火上炎而作渴以補中益氣湯合地黃丸料治之而愈

一人氣短疲暈服辛香之劑痰盛遺尿兩尺浮大按之如無予以為腎家不能納氣歸原香燥致甚耳用八味丸料三劑而愈

八味丸

見補益

一人形體豐厚勞神喜怒面帶陽色口渴吐痰或頭目眩暈或熱從眼起左三脉洪而有力予以為足三陽虧損用補中益氣

湯加麥門五味及加減八味丸而愈

一人大方疲暈湯

半夏

法製

橘紅

赤茯苓

黃芩

酒洗

白朮

一錢

川芎

石膏

薄荷

甘草

右劉一劑生薑三片水煎臨臥服

一生員形體魁梧不慎酒色因勞怒頭暈仆地痰涎上壅手足麻痺口乾引飲六脉洪數而虛余以為腎經虧損不能納氣

歸源而頭暈不能攝水歸源而為痰陽氣虛熱而麻痺虛火上炎而作渴補中益氣合六味丸料治之而愈其後或勞役

或入房其病即作用前藥而愈

一孟都憲氣短疲暈服辛香之劑痰盛遺尿兩尺浮大按之如無余以為腎家不能納

氣歸原香燥致甚耳用八味丸料三劑而愈

一孫都憲形體豐厚勞神喜怒面帶陽色口渴吐痰或頭目眩暈或熱從

氣歸原香燥致甚耳用八味丸料三劑而愈

一孫都憲形體豐厚勞神喜怒面帶陽色口渴吐痰或頭目眩暈或熱從

腹起左三脉洪而有力右三脉洪而無力余謂足三陰虧損用補中益氣加麥門五味及加減八味丸而愈 十全大補湯見補益補中益氣湯見內傷八味丸見補益

◎麻木

脉浮而濡屬氣虛。關前得之。麻在上體。關後得之。麻在下體也。脉浮而緩屬濕。為麻痺。脉緊而浮屬寒。為痛痺。脉逆而乳屬死血。為木。不知痛癢。內經曰。風寒溼三氣合而為痺。故寒氣盛者為痛痺。濕氣盛者為痺。痺河間曰。留着不去。四肢麻木拘攣也。經又曰。痛者寒氣多也。有寒故痛也。其不痛不仁者。病久入深。榮衛之行澁。經絡時疏。故不痛。皮膚不榮。故為不仁。夫所謂不仁者。或周身。或四肢。唧唧然。麻木不知痛癢。如繩扎縛初解之狀。古方為麻痺者是也。丹溪曰。麻是氣虛。木是濕痰死血。然則曰麻曰木者。以不仁中而分為二也。雖然。亦有氣血俱虛。但麻而不木者。亦有虛而感濕。麻木兼作者。又有因虛而風寒濕三氣乘之。故周身掣痛。兼麻木併作者。古方謂之周痺。治法宜先汗而後補也。醫者亦各以類推而治之。不可執一見也。

一論麻木過身手足俱麻者。此屬氣血兩虛。宜

加味八仙湯

當歸洗

川芎

熟地黃各七

白芍酒炒

人參各六

白朮去蘆

陳皮八

半夏曲七

白茯苓去皮

桂枝三

柴胡四

川羌活五

防風五

秦艽六

牛膝六

甘

草三

右剉一劑。生薑一片。棗一枚。水煎。食遠服。

○氣虛加黃芪蜜炒八分。

一論麻是渾身氣虛也。

加減益氣湯

黃芪蜜

人參

白朮去蘆

陳皮

當歸各一

升麻

柴胡

木香各五

香

附 青皮去

川芎各八

桂枝

甘草各三

右剉一劑。生薑蜜煎服。

一論十指盡麻。并面目皆麻。此亦氣虛也。

補中益氣湯

依前方去青皮。川芎。桂枝。加麥門冬。羌活。防風。烏藥。共十四味。

一論水是濕痰死血也。

雙合湯

當歸

川芎

白芍

生地黃

陳皮

半夏蜜炒

桃仁去皮

白茯苓去皮

紅花三錢

白芥子錢

甘草三

右剉一劑。生薑十片。水煎。熟入竹瀝。薑汁同服。

一論手足麻痺。因濕所致也。

香蘇散

方見感冒

依本方加蒼朮。麻黃。桂枝。白芷。羌活。木瓜。

一論感風濕。手膊或痛。或木。或遍身麻木。

五積散

方見中寒

一論婦人七情六鬱。氣滯經路。手足麻痺。宜

開結舒經湯

紫蘇

陳皮

香附

白烏

川芎

蒼朮米泔

羌活

南星 半夏 當歸 桂枝 甘草 右劉生薑三片入姜汁竹瀝服

一論口舌麻木涎及嘴角頭面亦麻或嘔吐痰涎或頭眩眼花惡心遍身麻木止渴消痰飲黃連 半夏 瓜蒌仁

黃芩 白茯苓 桔梗 枳殼 陳皮 天麻 細辛 南星 甘草 右劉生薑三片水煎服 血虛加當歸 氣虛加人參 亦有十指麻木胃中有濕痰死血加蒼朮白朮少佐熟附子行經中死血者四物湯加紅花桃仁韭菜忘

生冷魚腥發風發熱之物

一論十指疼痛麻木不仁 大附子木香各等分每服三錢姜三片水一碗煎七分服

一論婦人遍身麻痺謂之不仁皆因血分受風濕所致用祛風散送下五補丸 祛風散 生川烏 白朮 白芷 各三

甘草 右為細末酒調吞五補丸 五補丸 黃芪 蜜炒 人參 附子 當歸 白芍 酒炒 右為細末煉

蜜為丸如梧子大每服五七十丸祛風散送下

一論不仁者謂不凝和也痛痒不知針灸不知是也經曰諸乘虛寒而鬱冒不仁蓋其血氣虛弱不能周流於一身於是正

氣為邪氣所伏故肢體頑麻不知痛癢寒過厥如死屍而鬱且冒也用桂麻各半湯不愈者補中益氣湯入姜汁設或汗

如油喘不休喘而直視水漿不入者此為命絕也

一論風熱血燥皮膚瘙癢頭面手足麻木清涼潤燥湯 當歸 生地黃 黃連 黃芩 白芍 川芎 各一

天麻 防風 羌活 荆芥 細辛 甘草 右劉水煎食遠服麻甚加川烏炮三分

一論面上木處可將桂枝為末用牛皮膠和少水化開調敷之厚一二分若脚底硬木處可將牛皮膠銕化入生薑汁調和

仍入南星末五錢和勻膠用厚紙攤貼二三分乘半熱裏貼脚底上用溫火烘之此外治也

一治兩手指麻木四肢困倦怠惰嗜卧乃熱傷元氣也 黃芪 人參 白芍 柴胡 升麻 五味子 百

四十 生甘草 炙甘草 右劉水煎稍熱空心服

一治兩腿麻木沉重無力多汗喜笑口中涎下身重如山語聲不出右寸脉洪大 黃芪 當歸 蒼朮 陳皮 五

薑本 黃柏 柴胡 升麻 知母 五味子 生甘草 右每劉一錢水煎空心服少待以

一治皮膚間有麻木乃肝氣不行故也 黃芪一兩 白芍一兩 橘皮一兩半 澤瀉錢 炙甘草一兩 右剉水煎溫服

●癲狂

癲脈搏大滑者生沉小緊急不治○狂脈實大生沉小死○癲脈虛可治實則死

內經曰巨陽之厥則腫首頭重足不能行發為喘仆而暴仆也其目是蓋陽氣逆亂故令人卒然暴仆而不知人氣復則甦此則

癲之類也又曰陽明之厥則癲疾欲走呼腹滿不得卧面赤而熱妄見妄言又曰甚則棄衣而走登高而歌踰垣上屋罵

詈不避親疏是蓋得之於陽氣太盛胃與大腸實熱燥火鬱結於中而為之耳此則癲狂之候也曰癲曰狂分而言之亦

有異乎難經謂重陰者癲重陽者狂蓋問註云多喜為癲多怒為狂然則喜傷於心而怒傷於肝乃二臟相火有餘之症

難經陰陽之說恐非理也大抵狂為痰火實感癲為心血不足多為求高望遠不得志者有之癲病多主乎痰因火動之

所作也治法癲者宜吐狂宜下癲則宜安神養血兼降痰火雖然此三症者若神脫而目瞪如愚癡者縱有千金我醉吾

未如之何也已矣○癲者喜笑不常癲倒錯亂之謂也○狂者大開目與人語所未嘗見之事為狂也又云狂者狂亂而

無主定也○識語者合目自言日用常行之事為識也又蓄血症則重復語矣○鄭聲者聲顫無力不相接續造字出於

喉中為鄭聲也○陰附陽則狂陽附陰則癲脫陽者目盲脫陰者見鬼

一論癲者心血不足也此方主癲狂喜笑不常 養血清心湯 人參 白朮 白茯苓 遠志 酸棗仁 炒 川

芎 錢各一 生地黃錢一 石菖蒲錢一 當歸半錢 甘草五錢 麥門冬錢半 右剉一劑水煎服

一論狂者痰火實盛也宜後清心滾痰丸主之若風熱實盛者宜 防風通聖散 方見中風 依本方加牡丹皮生地黃桃仁

主之治一切大風癲狂之疾

一論喜笑不休者心火之盛也 以海鹽二兩火燒令紅研細以河水一大碗煎三五沸待溫三次服之以釵探吐熱痰次

服 黃連解毒湯 方見感冒 依本方加半夏竹葉竹瀝姜汁少許

一論婦人癲疾歌唱無時踰垣上屋者乃營血迷於心包所致也 加味道遙散 當歸 白芍 炒 白朮 去 白茯苓 去

柴胡 生地黃 遠志 去 桃仁 去 蘇木 紅花 甘草 右剉一劑煨薑一片水煎服有熱加小柴胡湯生地

辰砂水煎服

一論發狂無時披頭大叫欲殺人不避水火古人治狂謂之失心苦參主心腹結氣故足以治時熱狂言 苦參九 苦參為末煉蜜為丸如梧子大每服二三十九薄荷湯送下

一論一切癩癧風狂或因驚恐怖畏所發及婦人產後血虛驚氣入心并室女經脉通行驚邪結結頓服此比經効 抱膽九 水銀二錢 硃砂研 鉛半兩 乳香研 右將鉛入銚內水銀結成砂子次下朱砂滴乳乘熱用柳木棍研勻

九如茱萸大每一丸空心并花水吞下病者得睡切草驚動覺來即安再服一丸除根 一方薄荷湯化下亦可 一論癩狂失心不寐此方用朱砂能鎮心安神酸可便收引故棗仁能斂神歸心香可便利竅故乳香能豁達心志許學士

加人參亦謂人參能寧心耳 寧志膏 辰砂一 酸棗仁 炒五 乳香五 加人參一 右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸薄荷湯送下

一論癩狂失心此病因憂鬱得之痰涎包絡心竅此藥能開鬱痰 白金九 白礬二 鬱金七 右為末米糊丸每服五十九溫水送下

一論癩狂五癩驚悸一切怪症此皆痰火實盛也 清心滾痰丸 大黃 酒蒸 黃芩 四兩 青礬石 煨五 皂 犀角 錢五 麝香 五 朱砂 五 右為細末水為丸每服四五十丸滾水送下

一論心風者何蓋君火在心因感發之相火助盛痰動於中腸氣上攻迷其心竅則為癩為狂所怒之事膠固於心軌自談失其條序謂言之心風與風何干也若痰不盛則有感亦輕

一論久患心風癩狂健忘怔忡失志及恍惚驚怖入心神不守舍多言不定此藥大能安神養血寧心定志紫河車一具長流水洗淨慢火焙乾為末煉蜜為丸空心酒送下

一論癩狂打走叫上房用瓜蒂散吐出其痰數升又以承氣湯下之即愈 一人氣心風即痰迷心竅發狂作用具花蕊石煨黃酒淬一次為細末每服一錢黃酒送下

一論癩狂五癩眩暈時作時止痰涎壅盛心神昏憤此屬氣血虛而挾風痰鬱火也 驅風化痰湯 人參 白朮 去 茯苓 去 半夏 姜 陳皮 枳實 酒 當歸 酒 川芎 白芍 酒 桔梗 去 南星 遠志 甘草 水 瓜蒌仁 白附

子 礬蠶 天麻 黃連 炒 黃芩 酒 甘草 右剉一劑生薑五片水煎溫服

一癩狂健忘失志及恍惚驚怖入心神不守舍多言不定一切真氣虛損用紫河車入補藥內服之大能安神養血寧志治健忘驚悸怔忡不寐以六味丸加遠志石菖蒲人參白茯苓當歸酸棗仁炒

一治心恙狂惑用無灰酒一碗真麻油四兩共和白楊柳二十條逐一條攪一二下攪遍楊枝直候油酒相和如膏煎至八分狂者強灌之令熟睡或吐或不吐覺來即醒

一治狂言鬼語用蝦蟆一個燒為末酒調服

一治癩狂諸病將軍湯大黃四兩酒右用水三升煎之分作三服癩狂病者多怒為癩多喜為狂癩者精神不守

言語錯亂妄見妄言登高罵詈是也狂之病始發少臥少飢自賢自貴妄笑妄動登高而歌晝夜而走是也癩病者賊邪之并於肝狂病者賊邪之并於心也此皆實症宜瀉而不宜補故用大黃以瀉之取其苦寒無物不降可以瀉實又必數

日後方可與食但得寧靜便為吉兆不可見其瘦弱減食以溫藥補之反以飲食飽之病必再作戒之戒之緩與之食方為得體故曰損其穀氣則病易愈所以然者食入于陰長氣于陽故也又宜瀉痰九下之

一治癩狂不止得之驚憂極者用甜瓜蒂半兩為末每服一錢并水調一盞投之即大吐後熟睡勿令驚起神効

一治邪狂癩癩不欲眠妄行不止用白雄雞二隻煮熟五味調和作羹食

一治因驚憂失心或思過多氣結不散積有痰涎留灌心包窒塞心竅以致狂言妄語叫呼奔走雄朱丸朱砂二錢塊者研研雄黃一錢半白附子一錢右和勻以猪心血為丸如梧子大另用朱砂為衣每服三粒用人參菖蒲煎湯送下

常服一粒能安魂定魄補心益智

一牧童小子平白口中胡說一片鬼話令人驚駭予診之脉洪大此實熱也以蚯蚓數條研爛并水調服立愈

癩證

癩證

脉虛弦為驚為風癩

癩證者發則仆地悶亂無知嚙舌吐沫背反張目上視手足搐搦或作六畜聲者是也蓋癩疾之原得之于驚或在母腹之

時或在有生之後必以驚恐而致疾蓋恐則氣下驚則氣亂恐氣歸腎驚氣歸心併于心腎則肝脾獨虛肝虛則生風脾

虛則痰蓄極而通其發也暴故令風痰上湧而癩作矣內經曰然所以令人仆地者厥氣併于上實下虛清濁倒置故

令人仆地悶亂無知者。濁邪干乎天君。而神明壅閉也。古者心之苗。而脾之經絡連于舌本。陽明之經絡入上下齒縫中。故風邪實於心。胸則古自挺。風邪實于陽明。則口自噤。一挺一噤。故今噤舌吐沫者。風熱盛于內也。此風來潮洶之象。背反張目上視者。風在太陽經也。足太陽之經起于睛明。挾脊而下。風邪干之。則實而動急。故目上視而背反張也。手足搐搦者。屬肝木。肝木主筋。風熱盛于肝。則一身之筋牽掣。故令手足搐搦也。搐者四肢屈曲之名。搦者十指開握之義也。或作六畜聲者。風痰鼓其氣竅。而聲自變也。譬之弄笛。馬六孔閉塞不同。而宮商別異是也。

夫癰之為病。角弓反張。手足搐搦。口吐痰沫。俗云豬圈風也。亦因金衰木旺生風。外由驚邪入內。以致之。蓋癰病一月數發者。易治。周年一發者。難治。虛實之判也。實者即攻之。虛者先補可也。治法當先以瓜蒂散吐之。用甜瓜蒂為末。每服一錢。

井水調一盞。投之即大吐。後熟睡。勿令驚起。即効。後以湯藥調理。

一論癰症宜下。吐茶子喜湧而能吐頑痰。宜取一丹搗爛煎湯服。得大吐便止。

一論諸癰神志不宣。時發狂躁。多言好怒。而容不澤。定神至寶丹。生地黃黃汁炒 橘紅 貝母 白茯苓去 黃連

遠志去 石菖蒲 酸棗仁炒 枳實炒 瓜蒌仁 天花粉 甘草許 右劉生薑三片水煎服。

一論癰者痰涎壅併然也。加減導痰湯。主方神効。南星製 半夏 陳皮白 白茯苓去 瓜蒌仁 枳實炒 桔梗

山梔子 黃芩銹 黃連姜炒 甘草 木香五分 辰砂五分 右劉一劑生薑煎入竹瀝姜汁。磨水香調辰

砂末同服。

一論癰屬氣虛而兼痰火者。此攻補兼施。平肝解鬱。清火化痰。除眩暈諸癰之症。清心抑氣湯。當歸酒 白芍酒 白

朮去蘆 白茯苓去 陳皮去 半夏姜汁 枳實炒 竹茹 石菖蒲 黃連姜炒 香附一錢 麥門冬去 川芎

人參 遠志去 甘草銹 右劉一劑生薑煎服。

一論大人小兒忽然昏暈倒地。五癰之症。朱砂水飛 煨用猪心一個。剖開入砂末五錢。濕紙包。南星湯浸 三巴豆

仁五錢 石炭一 碗炒紅入仁在內。反冷取仁。將炭不用。全蝎去頭足尾 龍膽草兩 右為末。麩糊丸。如梧子大。每服十

五丸。姜湯送下。

一論風癰搐搦。心志發狂。棄衣而走。登高而歌。或數日不愈。踰垣上屋。妄言罵詈。不避親疏。妄見鬼神。一切潮熱。及風中厥。

逆牙關急並可治之

三聖散

防風去蘆 瓜蒂炒二

藜蘆去苗加減用或一

右為粗末每服五錢用薑汁二盞煎三沸濾於大碗中再用

一盞煎三沸卻先入煎藥同煎三沸澄清候溫徐徐投下不必盡劑吐如吐不止煎葱白湯嚥三五口立解如不吐

再加服之

如服藥多不吐出涎再飲薑汁鹽湯各一二盞投之如不出以光釵喉中探引即出矣須用白盆一個黑盆

不見涎形狀吐出青黃涎沫二三升為効吐罷之後吃微溫白粥一二頓此三性散汗吐下三法俱行防風發汗瓜蒂下

泄藜蘆湧吐凡用法則禁忌症候小者勿服病久雖合吐勿服吐血人勿服主病不正勿服眾口不能正勿服

先正病人心神居淨室中善侍病者一二人溫克和柔善誘患人則妙矣提防吐後眩暈跌撲呼叫病人諸狂必損吐瀉

罷可與冰水及新水降心火勿食熱物

一論諸風癱瘓不能言語怔忡健忘恍惚去來頭目眩暈胸中煩鬱痰涎壅塞精神昏倦心氣不足神志不寧驚恐憂悸虛

煩少睡或發癲狂小兒驚癇風搖大人暗風羊癇風癲發叫如雷其効如神千金保命丹朱砂錢珍珠錢膽星

錢甘草麻黃去根白附子炮雄黃薄荷各一防風琥珀金箔牛黃各一蠶蠶炒犀角各一麥門

冬法枳殼去桔梗去地骨皮神曲炒白茯苓去白朮去人參各三遠志去心柴胡錢三天麻錢一

膽礬七錢冰片許少黃芩錢七麝香許少紫河車錢七天竺黃錢一荊芥錢七蟬退七錢川芎錢一牙皂錢一右為

細末煉蜜為丸如彈子大金箔為衣用蠟包裏用時取開每服一丸薄荷煎湯磨化下不拘時服忌猪羊肉蝦米核桃動

風之物

卷五

曾補壽世保元

一參伯王播庵公子患癩七年諸醫罔效召余治以追風祛痰九安神九二藥兼進半載而愈逾四年未發復因不善保守

病發如前差役復求余治余以此方製藥一料投之輒効迄今數載不發氣體已復原安靈犀公優渥贈余匾曰醫士

無雙余因此方屢驗故更一字名曰醫癩無雙九南星雨半夏一兩二味用白礬皂角生姜煎湯浸一川芎錢三

當歸身酒軟石膏各一天麻錢七蠶蠶五懷生地黃酒炒荆芥穗錢五辰砂錢五川獨活錢五烏犀角錢五

白茯苓去皮揀麥遠志甘草各三金箔三十右為細末好酒打稀糊為丸如梧子大金箔為衣每服五

川黃錢五白附子煨珍珠錢三甘草錢三金箔三十右為細末好酒打稀糊為丸如梧子大金箔為衣每服五

十九空心白湯送下。最能去風化痰。降火補益。活血理脾。寧心定志。輕者半料。奏效。重者全料。

一 兜十五歲御女。後復勞役。考試失意。患癩症三年矣。過勞則發。用十全大補湯加味。歸脾湯之類。更以紫河車生研如膏。入蒸糯米飯為丸。如梧子大。每服百丸。日三四服。而痊後患遺精盜汗發熱。仍用前藥及六味丸而愈。此方治癩。不拘老幼皆效。清心痰九。治諸風癩癩有殊効。

一 治驚癇方。白礬一兩半 半粒 荆芥二 右為末。麩糊為丸。如黍米大。硃砂為衣。每服二十九。姜湯送下。

健忘

健忘者。陡然而忘其事也。盡心力思量不來。為事有始無終。言談不知首尾。皆主於心脾二經。蓋心之官則思。脾之官亦主思。此由思慮過多。傷於心。則血耗散。神不守舍。傷於脾。則胃氣衰。倦而疾愈深。二者皆知。人事則卒然而忘也。蓋心主血。因血少而不能養其真臟。或停飲而氣鬱。以生痰。氣既滯。脾不得舒。是病皆由此作。治之必須養其心血。理其脾土。凝神定智之劑。以調理。亦當以幽閑之處。安樂之中。使其絕於憂慮。遠其六慾七情。如此日漸安矣。

一 論思慮傷脾。不能攝血。致血妄行。或吐或下。或健忘怔忡。驚悸不寐。發熱盜汗。或心脾傷痛。嗜卧少食。大便不調。或血虛發熱。或肢體重痛。煩人月經不調。赤白帶下。或嘔熱內熱。或癰癰流注。不能消耗。清飲或思慮傷脾。而作癰癩。歸脾湯。

主方 黃芪炒 人參 白朮去 白茯苓去 當歸酒 遠志去 甘草炙 龍眼肉 酸棗仁炒 木香 甘草炙

右劉美東煎服。加柴胡附子名。加味歸脾湯。神不寧而健忘。倍酸棗仁。茯神當歸。加柏子仁。

一 論諸虛健忘。及驚悸怔忡等症。加減補心湯。人參 白茯苓 陳皮 白芍酒 遠志去 甘草水 酸棗仁炒 知母

白朮 生地黃 當歸 石菖蒲 麥門冬去 黃柏炒 甘草 右劉美東煎服。

一 論寧心保神益血固精。壯力強志。令人不忘。清三焦化痰。祛煩熱。瘡咽乾。除驚悸。定怔忡。育養心神。大補元氣。讀書勞

神勤政勞心。並宜服之。天王補心丹。大中丞松石劉公傳。加菖蒲百部杜仲甘草。懷生地四 天門冬去 桔梗

各五 當歸 柏子仁 酸棗仁炒 五味子各一 麥門冬去 遠志去 甘草水 白茯苓去 玄參 丹麥 人參

一方加酒炒黃連二 右為細末。煉蜜為丸。如梧桐子大。朱砂為衣。每服二三十丸。臨卧燈心竹葉煎湯送下。燈心裏湯

亦可如飲食不思。大便不實。恐不宜也。又當服後方。安神定智丸。功同補心丸。人參五 白朮去 白茯苓去

祛 白茯苓神志 遠志甘草心 石菖蒲去心 酸棗仁炒各 麥門冬去心 半黃另研 辰砂二錢半水 右為細末

丸 未圓眼肉四兩熬膏和煉蜜三四兩為丸如梧桐子大辰砂為衣每服三十丸清米湯送下不拘時日服

一論凡人多識不忘者心血足而無所蔽也若心血不足邪氣蔽之則傷其虛靈之體而學問易忘矣通介益之靈物也龍

鱗蠶之靈物也假二物之靈以養心之靈欲其同氣相求云爾遠志辛溫味厚辛溫可使入心味厚可使養陰菖蒲味平

氣溫味辛則利竅氣溫則通神以之而治易忘斯近理矣 聰明丸 春元周用廷經驗 敗龜介殼 龍骨煮一宿

遠志去心 石菖蒲九節者 右為末每服一錢酒調下日三服

一論讀書辛苦而有房勞者 當歸 生地黃 白朮 玄參各一錢 川芎 白芍 白茯苓 黃柏酒炒 知母酒炒 麥

門冬法 山梔炒 甘草各五 右到一劑生薑煎服

一論癲狂健忘失志及恍惚驚怖入心神不守舍多言不定一切真氣虛損用紫河車入補藥內服之大能安神養氣益志

治健忘驚悸怔忡不寐用六味丸加遠志石菖蒲人參白茯苓神當歸酸棗仁炒

一論諸虛健忘等症以十全大補湯去川芎黃耆肉桂加陳皮遠志石菖蒲麥門冬酸棗仁黃柏知母

●驚悸

脉寸口脉動而弱動為驚弱為悸○心中驚悸脉必大結飲食之悸沉伏動滑

夫驚悸即動悸也動之為病惕然而驚悸之為病心中怯怯如人所捕皆心虛膽怯之所致也又曰驚者恐怖之謂悸者怔

忡之謂怔忡健忘驚悸三症名異而病同又曰驚心虛驚然而跳躍驚動如有欲廢之狀有時而厥者是也屬血虛時作

心跳者亦是血虛蓋人之所主者心心之所養者血心血虛神氣不守此驚悸之肇端也

一人聞聲即驚者今患人坐於堂上使兩人扶之醫自堂下以小焚木槌手擊而口云吾擊堂亦當事耳爾何必驚且擊

且言患者視之久而驚遂定此深得乎治之法也

一論驚悸怔忡健忘不寐屬心血虛者 補心湯 主方 當歸二錢 川芎一錢 白芍一錢 生地黃二錢 白朮一錢

遠志去心 白茯苓二錢 酸棗仁炒 麥門冬去心 黃連一錢 甘草三錢 右到一劑水煎溫服

一方加柏子仁

一論血虛心神不安驚悸怔忡不寐並治。安神鎮驚丸。當歸酒洗。貝母去心。川芎七錢。生地黃酒洗一錢。麥門冬

去心。酸棗仁炒。白芍酒炒。遠志去心。陳皮去白。白茯苓七錢。黃連姜汁炒。甘草三錢。朱砂研末水飛

右為末煉蜜為丸如菜豆大每服五十九食遠氣湯送下。

一論七情六慾相感而心虛夜多夢寐睡臥不寧恍惚驚怖疲痺屬心虛者。益氣安神湯。當歸二錢。黃連姜汁

地黃麥門冬去心。酸棗仁炒。遠志去心。白茯苓七錢。人參黃芪炒。膽星各一錢。淡竹葉錢。甘草

六。右到一劑姜一片棗一枚水煎服。

一論小兒大人被驚神不守舍痰迷心竅恍惚健忘諸癰癰風心風等症。安神醒心丸。南星末五錢。川黃連末一兩五

汁拌浸半日入南星末調和。人參末一兩。製遠志末一兩。飛過辰砂研七錢。琥珀七錢。酸棗仁炒研末。右

用雄豬心血三個入竹瀝打麩糊為丸如梧桐子大金箔為衣每服五十九食遠白湯送下小者二十九

一論異夢多驚有二法一於夢中戴羅大靈砂一囊一於枕中置真麝香一囊皆能杜絕異夢而療夜驚

一論夜夢陰盛夢大水恐懼陽盛夢大火燭灼陰陽俱盛夢相殺上盛夢飛下盛夢墮飽夢與人食餓夢

取人食心實夢燭灼心虛夢救火陽物堅肝虛夢細草芒芒肝實夢伏樹下不敢起脾虛夢飲食不足脾

實夢築牆蓋屋肺虛夢白物斬血籍肺實夢兵刃血戰腎虛夢舟船溺水腎實夢伏水中若有所畏

夫怔忡者心中不安惕惕然如人將捕是也屬血虛有慮便動屬虛時作時止者痰因火動瘦人多血少肥人屬痰

怔忡者心胸躁動謂之怔忡此心血不足也多因富貴感威實賤不遂所願而成

一論血虛火盛怔忡心慌恍惚煩躁不寧養血清心湯。當歸酒洗。川芎七錢。白芍酒炒。生地黃酒洗

錢。片苓去柄。梔子炒入。酸棗仁炒。遠志去心。麥門冬去心。甘草三錢。右到一劑生薑煎服。黃連姜汁

一論心煩懊憹驚悸怔忡胸中氣亂此血虛而火盛也。朱砂安神丸。朱砂另研水浸。當歸酒洗二錢。生地黃酒洗一

黃連酒洗。甘草三錢。一方加人參白朮茯苓酸棗仁炒麥門冬去心各等分為末煉蜜為丸如黍米大每服五

十九食遠氣湯送下。

一論思慮即心跳者是心中無氣少血故作怔忡也 四物安神湯 當歸酒 白茯苓 白芍 熟地黃 黃連

一論氣怔忡而自汗者不過一二服即愈 參歸腰子 人參 當歸身 豬腰子 右先以腰子用水二碗煮

至一碗半將腰子細切入二味藥同煎至八分吃腰子以藥汁送下如吃不盡腰子同上二味藥汁焙乾為細末山藥糊

為丸如梧子大每服三五十丸米湯送下

一論精神虛憊恍惚不寧心思昏憤氣不足健忘怔忡 五味寧志丸 人參 白茯苓 遠志 甘草 石菖蒲 麥汁

酸棗仁 炒 黃連 柏子仁 各二 當歸 酒洗 木香 生地黃 朱砂 右為細末煉蜜為丸如菜豆

大半飢時麥門冬去心煎湯下五六十丸

●虛煩

夫虛煩者心胸煩擾而不寧也多是體虛攝養有乖榮衛不調使陰陽之二氣有所偏勝也或陰虛而陽盛或陰盛而陽虛

內經曰陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒令人虛煩多是陰虛生內熱所致虛勞之人腎水有虧心火內

蒸其煩必躁吐瀉之後津液枯竭煩而有渴惟傷寒及大病後虛煩之症卻無霍亂臨病宜審之○藥氏病源曰心煩不

得寐者心熱也但虛煩不得寐者痰冷也

一論病後虛煩不得眠即心胆虛怯觸事易驚短氣悸之或復自汗等症 溫膽湯 半夏 竹茹 枳實 陳皮 白茯苓 甘草 右到分二劑姜棗煎服 一方加酸棗仁炒遠志去心五味子熟地黃人參

各等分

一論大病後表裏俱虛內無津液煩渴心躁及諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不痛不可汗下宜服 竹葉石膏湯

●不寐

不寐有二種有病後虛弱及年高入陽虛不寐者有痰在膽經神不守舍亦令不寐虛者用六君子湯加炒酸棗仁黃芪服

者用溫膽湯減竹茹一半加南星炒酸棗仁傷寒不寐者當求之本門

一論心膽虛弱晝夜不眠百方無効服此如神 高枕無憂散 人參 熟石膏 陳皮 半夏 白茯苓 枳

實 竹茹 春門冬 酸棗仁 甘草 右到一劑龍眼五個水煎服 白茯苓 枳

一論勤政勞心疲多少睡心神不足 養心湯 人參 麥門冬 黃連 白茯苓 當歸 白芍

酒 遠志 陳皮 柏子仁 酸棗仁 甘草 右到連肉五個去心水煎溫服 安神復睡湯 當歸 川芎 白芍

酒 熟地黃 益智仁 酸棗仁 遠志 山藥 龍眼肉 右到姜棗煎服 白茯苓 枳

一論心氣不足恍惚多忘或勞心膽冷夜卧不睡此藥能安神定智 加味定智丸 人參 白茯苓 遠志 甘草

去心 石菖蒲 酸棗仁 柏子仁 右為細末煉蜜為丸如梧桐子大朱砂乳香為衣每服五十九臨卧

附睡法 睡不厭蹴覺不厭舒蹴者曲膝踞腹以左右肋側卧修養家所謂獅子眠是也如此則氣海深滿丹田常暖腎水

湧生益人多弘舒體而卧則氣宣而毒蓄神散而不潛故卧惟覺時可舒體耳 西山蔡季通引千金方睡訣云睡則必

側覺正而伸早晚以時先睡心後睡眼睡眼以為此古今未發之妙 右為末每服二錢不拘時竹葉湯調下

一論膽虛睡卧不安心多驚悸 酸棗仁 右為末每服二錢不拘時竹葉湯調下

一治心下怔忡眠倒即大聲打鼾睡即醒不寐余以 羚羊角 犀角 各用水磨濃汁入將所用或養心湯或復睡湯內服

之立效蓋打鼾睡者心肺之火也 右為末每服二錢不拘時竹葉湯調下

一治膽虛常多畏恐不能獨卧如人捕狀頭目不清 人參 枳殼 五味子 桂心 柏子仁 甘草 芍藥

拘杞子 山茱萸 熟地黃 右為末每服二錢溫酒調下 柏子仁 甘草 芍藥

厥症 脉陽厥脉滑而沉實陰厥脉細而沉伏 氣虛則發厥血虛則發熱厥者手足冷也氣屬陽陽虛則陰寒之故發厥也血屬陰血虛則陽寒之故發熱也氣虛發厥者

當用溫藥血虛發熱者不宜用涼藥當用溫養氣血之藥以補之宜養陰黃芪建中湯之類是也又有一種病實熱者極

而手足厥冷所謂熱深厥亦深此當用涼藥須以脉別之此最難辨

脈陽厥脉滑而沉實陰厥脉細而沉伏 氣虛則發厥血虛則發熱厥者手足冷也氣屬陽陽虛則陰寒之故發厥也血屬陰血虛則陽寒之故發熱也氣虛發厥者

當用溫藥血虛發熱者不宜用涼藥當用溫養氣血之藥以補之宜養陰黃芪建中湯之類是也又有一種病實熱者極

而手足厥冷所謂熱深厥亦深此當用涼藥須以脉別之此最難辨

脈陽厥脉滑而沉實陰厥脉細而沉伏 氣虛則發厥血虛則發熱厥者手足冷也氣屬陽陽虛則陰寒之故發厥也血屬陰血虛則陽寒之故發熱也氣虛發厥者

一論陽厥者是熱深則厥深蓋陽極則發厥也急宜六乙順氣湯治之

一論陰厥者始得之身冷脉沉四脉厥逆足踈卧唇口青或自利不渴小便色白宜四逆理中湯之類仍速灸關元百壯鼻

尖有汗為度

一論痰厥者卒然不省人事喉中有水雞聲者是也用于皂白礬等分研末吹鼻即以香油一盞入姜汁少許灌之立醒或

燒竹瀝姜汁灌之亦可

一論蛇厥者乃胃寒所致經曰蛇者長也胃中冷即吐蛇宜地中湯加炒川椒五粒檳榔五分吞烏梅丸

一論氣厥者與中風相似但風中身溫氣中身冷以薑香正氣散如南星木香烏藥如有痰以四七導痰湯主之

一論暴怒暴死者名曰氣厥蓋怒則氣上氣上則上焦氣實而不行下焦氣逆而不吸故令暴死氣上宜降之五磨飲子

木香 沉香 檳榔 枳實 台烏藥 右五件等分白酒磨服立効

建中湯 見汗症 六一順氣湯 見傷寒 四逆湯 見中寒 理中湯 見中寒 薑香正氣湯 見霍亂

四七湯 見諸氣

心胃

脉沉細而遲者易治浮大弦長者難治

胃脘痛者多因縱恣口腹喜好辛酸恣飲熱酒煎炒復食寒涼生冷朝傷暮損日積月深自鬱成積自積成痰痰火煎熬血

亦妄行瘀血相雜始得升降故胃脘疼痛吞酸噯氣諸雜惡心皆膈噎反胃之漸者也俗醫以燥熱之藥治之以火濟火悞

矣古者有九種曰飲曰食曰風曰熱曰冷曰悖曰蛇曰症曰去來痛夫所謂冷者惟一耳豈可例以熱藥治之乎須分新

久若明知身犯寒氣日得寒物而病於初得之時當用溫散溫利之藥若病久則成鬱生鬱則成積宜用炒山梔為君熱藥為輔

導則邪易伏病易退病安之後若縱恣不改病必再作難治矣此病雖日久不食不死必須待服藥數劑痛定一日漸而

少食方得痊安其有真心痛者大寒觸犯心君又曰汚血衝心手足青過節者朝發夕死夕發早死非藥所能療焉

一論胃脘積有鬱熱刺痛不可忍者此方治心胃痛之主方也清熱解鬱湯 山梔仁二錢 乾薑五分 川芎錢一

連錢一 香附錢一 枳殼去蘊炒 蒼水米甘浸 陳皮五 甘草三 右剉一劑生薑三片水煎熱服服後飲

連錢一 香附錢一 枳殼去蘊炒 蒼水米甘浸 陳皮五 甘草三

食大半日再服一劑神効如痛甚加薑汁二三匙入藥同煎

一論諸積氣為痛心脇痛腹痛血痛腎痛脇下痛大便不通氣噎宿食不消等症 神保丸 木香二錢 胡椒二錢 全蝎半

枳實 巴豆十枚去 右為末入巴豆霜再研湯浸蒸餅為丸如麻子大朱砂三錢為衣每服三十粒 心脇痛柿蒂燈心

湯下 腹痛柿蒂燈心煎湯下 血積痛炒薑醋湯下 肺氣盛者白礬蛤粉各一錢黃丹一錢同研為散煎桑白皮糯

米飲調三錢下 氣喘桑白皮糯米飲下 腎氣痛脇下痛炒茴香酒下 大便不調 蜜調檳榔末一錢下 氣壅木

香湯下 宿食不消茶下或酒漿飲任下 酒熱熱毒過度痼疾致臂痛柿蒂湯下 諸氣惟膀胱氣腸下痛最難治獨

此藥能治之 有人痛頂筋痛諸醫皆以為風治之數月不瘳乃流入背脊久之又注右脇掣痛甚苦乃合服之一投而

瘳再服除根

一論治心胃刺痛并兩脇肋痛嘔吐胸痞大便堅六脉數或發熱口乾 清上飲 柴胡 黃芩 赤芍 厚朴 枳實

梔子 鬱金 黃連 半夏 青皮 大黃 芒硝 甘草 右劉生薑三片水煎熱服

一論心氣及胃脘諸痛鬱火所致者 肥梔子 薑汁炒 枳實 香附 香附一錢 右劉水煎三滾入薑汁三四匙再

煎一滾去渣入百草霜二匙調和服之

一治心胃痛不可忍或心神恍惚 梔子炒黃連炒二味停用茯苓茯神減半水煎服立止

一治因食多煎炒燒餅米拌熟麪之類以致熱鬱胃脘當心而痛或嘔吐不已漸成翻胃 黃連錢 甘草錢 右劉水煎

溫服立止

一治胃脘心痛作痛有熱者 酒餅 梔子 石膏 右劉水煎一服立止

一論男婦小兒常憤心腹作痛宜服此一料以拔病根水不再發此藥能清痰涎消食積酒積肉積茶積一切諸積在胃脘

當心作痛及脾滿惡心嘈雜噎氣嘔吐吞酸痞疾諸痛神効 煨薑金丹 白朮 枳實 蒼朮 茯苓

苓一 麥芽 神曲 半夏 澤瀉 赤茯苓 川芎 黃連 白蠟 砂仁 草豆

蔻 黃芩 陳皮 青皮 萊菔子 生薑 陳皮 香附 瓜蒌仁 檳榔 川厚朴 甘草

二 木香 甘草 右為細末青荷葉湯浸晚粳米研粉作糊為丸如梧子大每服七十丸多至百丸米湯送下