



薄荷

甘草 各貳兩

琥珀

真珠

青黛

犀角 各貳斤半

麝香 伍分

右爲末煉蜜丸臨卧服薄荷汁或蜜水米飲化下

全蠍觀音散 治吐瀉截風定志庶免傳變慢驚

黃耆 炙

人參 各貳斤半

木香

炙甘草

蓮肉

扁豆 炒

茯苓

白芷

全蠍

羌活

防風

天麻 各貳錢

右每服三五錢薑棗煎服

疳積山本事方治小兒疳積黃瘦吐食

川烏 壹錢

定粉 叁个

艾灰 貳个

龍骨 貳錢

右爲末滴水丸如龍眼核大捏作餅子每服一餅

米飲磨下

補虛安胃六神湯 脾胃虛吐瀉不進飲食

黃耆

扁豆

人參

白朮

茯苓

炙甘草

藿香 各等分

每服三四錢薑棗煎服

和劑觀音散

吐瀉

人參散

治小兒臟腑冷若纔喫乳食卽又吐出或

因喫乳驚觸致作驚肘之狀令小兒外證面唇青  
白手足心熱口多清涎吐逆不住或作瀉候青黃  
紫白兼凍子或如鼻涕雞子清者或乳食不化並  
宜服之常服開胃益乳食

人參

白朮

茯苓

沉香

白芍藥

甘草

各半  
兩

右爲細末以密器收之遇小兒有前項形證半歲  
一字二三歲半錢大者一錢煎棗子米飲調下或

陳紫蘇湯亦可或吐瀉并作煎丁香湯下陳皮湯

尤妙

**雜方**經驗方治小兒吐不定

用五倍子貳箇一生一熟甘草一握濕紙裹炮過同搗爲末每服米泔調下半錢七瘥

掌中金 治小兒喫物喫乳卽吐下水乳不得飲食

白豆蔻

拾肆箇

甘草

壹兩半炙半生

砂仁

拾肆箇

右爲末逐旋安掌中與他乾噉牙兒乾糝口中亦

可

釀乳法

治初生嬰兒凡有胎熱證當令乳母服藥

不可求效之速治法當釀乳令兒喫漸次解之百  
無一失若遽以冷藥攻之必損脾胃加以嘔吐必  
成大患

澤瀉貳兩

豬苓去黑皮

赤茯苓

天花粉各壹兩半

乾生地黃貳兩

山茵陳用葉

甘草各壹兩

右剉散每服五錢水一盞煎六分食後捏去舊乳  
却服

錢吐沫及痰或白綠水皆胃虛冷吐稠涎及血皆

肺熱吐水不止者屬心痛胃冷吐水心痛者蟲

上吐涎沫水蟲

刀針

五

三

痛 口中吐沫水者後必蟲痛 面皤白無精光口  
中氣冷不思食吐水當補脾益黃散主之 四冬月  
吐蛻多是胃虛寒而蟲作吐用錢氏白朮散加丁香  
貳粒 亦可用理中湯去甘草加烏梅肉川椒

# 瀉

曾論瀉之原有冷瀉熱瀉傷食瀉水瀉積瀉驚瀉風

瀉臟寒瀉疳積釀瀉積種種不同各分於後 冷瀉

多是白水瀉密而少腹痛而鳴眉皺目慢面帶白魚

額有汗多用冲和飲慢驚當歸散潮熱合和水煨薑

煎服并守中湯本條參苓白朮散不乳益中膏本條

沉香檳榔丸不乳治之熱瀉大便黃色如筒吊水

瀉過卽止半日復然心煩口渴小便黃少食乳必壅

先用五苓散驚或大順飲吐次以錢氏白朮散渴主

瀉

之香薷散 吐瀉

亦佳

傷食瀉乃脾胃素弱復為生

冷果食所傷故大便不聚而瀉或因乳母餐生冷肥

膩之物自乳而過亦能作瀉面唇俱白瀉稀而少或

如壞雞子腥臭異常身形黃瘦宜先溫正胃氣次理

積而後固脾冲和飲

慢驚

當歸散

潮熱

合和水煨薑

棗子煎服理積兒大者烏犀丸

吐

小者化癖丸 癖三

稜散

宿食

固脾和中散

吐瀉

醒脾散

驚慢

水瀉謂之

洞泄乃陰陽不順水穀不分瀉黃水而小便少番次

密而無度是夏秋之際晝則解衣取涼夜則失蓋感

冷冷熱相激清濁渾亂或因母自熱中來乳有熱氣

遽以哺之令兒脾胃不和或穀交雜而下以咬咀五

苓散驚加薏苡仁車前子半夏水薑煎服分正陰陽

或先用大順飲吐溫白湯調下香薷散吐調中止

補錢氏白朮散渴六和湯吐亦好積瀉脾氣虛

弱乳食入胃不能運化積滯日久再為冷食所傷傳

之大腸遂成泄瀉留連不止諸藥無效蓋以積在脾

胃積既未除何由得愈宜先去積後止瀉瀉止實脾

則病除矣三稜散宿食烏犀丸吐續用沉香檳榔丸

不乳參苓白朮散慢驚和中散吐香橘餅本條調

理驚瀉糞青如苔稠若膠粘不可便止但鎮心抑

用和脾胃消乳食斯為治法先投五苓散驚次用三

稜散宿食水薑倉米煎服或三解散潮熱神麴生薑

煎湯調服及沉香檳榔丸不乳不驚丹驚調治風

瀉慢驚大病後有之其糞稀黃褐色或夾不消乳食

同下此因脾虛所致或夾黑褐色者屬腎蓋脾虛為

腎水所乘故也若久不進飲食再有驚搐宜疎腎水

去脾風次補脾則自愈庶無復作之患疎腎水咬咀

五苓散驚加黑牽牛半生半炒并薏苡仁水薑煎服

去脾風瀉黃散脾調脾氣參苓白朮散不乳臟寒

瀉糞如青竹色不稀不稠或下青水未瀉時腹痛而

鳴叫哭方瀉多是生來三五月內有此周歲則無殆

因斷臍帶短風冷自外逼內而成此疾先用冲和飲

漫驚

水葱白煎投温中解表次以當歸散潮熱水服

薑煎服及投勻氣散

痢理中湯瀉

疳積釀瀉其候

面色痿黃肚脹脚弱頭大項小髮稀且豎肌肉消瘦

不思飲食晝涼夜熱或腹內有癥癖氣塊瀉則顏色

不等其臭異常其瀉有時或一月半月旬日一番自

瀉自止名爲疳積釀瀉先以當歸散

潮熱

加三稜陳

皮水薑煎服次投烏犀丸

吐

沉香檳榔丸

不乳

及化

癖丸

癖

蘆薈丸

疳

沒石子丸

本條

兒最小者難下丸

子止投三稜散

宿食

快膈湯

痞

自然痊愈

若瀉或

痢色青甚而淡黃夾白寒多熱少此陰邪勝陽宜用

守中湯胃苓湯

俱本條

與服扶表救裏方進當歸散

潮

熱加陳皮紫蘇水薑糯米煎服亦宜和解理中湯

吐

瀉清米飲空心調服溫脾去濕益氣清神寒盛者理

中湯內加熟附子水薑棗煎服次投南星腹皮飲水

薑煎服和脾胃去陰邪

若瀉或泄色青淡而有沫

黃稠熱多寒少亦致向黃肌瘦煩躁不寧宜以呔咀

五苓散加薏苡仁車前子水薑煎服解散餘邪仍用

茵陳蒿梔子仁煎湯調細末五苓散溫服退黃色消

湯毒及當歸散水薑棗煎投戎服萬安飲

積熱

四神

丸

養生治大小老虛之人不拘冷熱泄瀉

黃連

去鬚

白芍藥

並剉如豆

吳茱萸

各拾兩

右三味釜內慢火炒赤色放冷杵羅爲細末每服三錢七水一盞半煎至八九分去滓空腹食前溫服日三四服小兒量與或以水浸蒸餅丸如桐子大更丸一等如菉豆黃米大小兒每服十五丸至二十丸溫米飲下若作散以沸湯或溫米飲調下並可服病泄痢之甚不禁生冷魚肉肥膩與不

服藥同 一方有木香無芍藥醋糊丸

茅先生香連丸 治瀉利

木香

黃連

茅黃半兩同於銚內炒  
令煙起取出去茅黃

肉豆蔻

訶子

炮去核  
各半兩

阿膠

炒

朱砂各一

右為細末軟飯為丸如桐子大每服十丸十四丸

用飯飲吞下兒小碎之

孔香散一治一切瀉痢

乳香

二冬用荷葉於炭火上炙  
令半鎔放地一碗蓋另研

肉豆蔻

白薑

甘草

炙

草菓子

各

右細剉用醋麴裹於熱灰內煨令赤色取出去麴  
爲末入乳香末拌勻每服半錢一錢陳米飯飲調  
下

**參湯** 薛湯氏云冷瀉者乃脾胃虛寒水穀不化而泄

錢仲陽云小兒不能食乳瀉褐色身冷無陽也當用

益黃散脾加減治之大便清白口不煩渴令積瀉也

理中湯吐瀉主之若口鼻吸風寒之氣脾胃受生冷

之食而作者先用理中湯後用異功散命門火衰不

能溫蒸中州之氣故脾胃虛寒者用益黃散及八味

九腎脾胃虛弱者五味異功散吐瀉脾氣下陷者補

中益氣湯

虛熱

脾氣虛寒者人參理中湯寒水侮土

者益黃散肝木乘脾者四君柴胡散手足並冷者加

木香乾薑治者審之百問云冷積瀉沒石子丸極

也人參散

吐

理中湯

吐瀉

加減服尤佳更加肉豆寇

則止來復丹

大科中暑

不換全正氣散

吐瀉

皆可觀音散

土瀉

銀白散加減調治乃平和之劑也

守中湯

理春夏相交陰濕氣重中傷脾胃致腹痛

泄利經久不止漸傳手足浮種飲食少思

桔梗

去蘆剉炒

蒼朮

米泔水浸一宿去麤皮慮乾剉片炒微黃色各二兩

白薑

剉炒

甘草

陸氏炙