

聖濟總錄纂要

三

聖濟總錄纂要

卷之三

程林雲來纂

閔世璋象南

新安

吳慈蓀蓮士

較

江入湘郢上閱

傷寒門

傷寒可汗可下可吐可溫傷寒過經不解

傷寒統論

論曰風寒暑溼飲食勞倦皆能爲病是謂五邪冬傷於寒

者。春必病溫。春傷於風者。夏必飧泄。夏傷於暑者。秋必痃瘕。秋傷於溼者。冬必欬嗽。是乃四時之氣也。然五邪所中。雖不同本。皆外邪。大率同類。唯多冬時嚴寒。其毒厲尤甚。人或中之。病在冬時。則正名傷寒。若邪毒藏於肌膚。至春之時。乘溫而發者。溫病。若留連日久。至夏之時。乘盛暑而發者。爲暑病。所謂先夏至一日爲病溫。後夏至日爲病暑。是也。其病之傳次。先客於太陽。其病令人頭項痛。腰脊強。其脉尺寸皆浮。太陽不已。傳於陽明。其病體熱目疼。鼻乾。不得臥。其脉尺寸皆大。陽明不已。傳於少陽。其病胸脇痛。

其字下

而耳聾。其脉尺寸皆弦。少陽不已。太陰受之。其病腹滿體重。其脉尺寸俱微。太陰不已。少陰受之。其病口燥舌乾而渴。或背微惡寒。其脉尺寸俱沉。少陰不已。厥陰受之。其病煩滿。舌卷囊縮。其脉寸尺俱緩。病之所傳。不過三陰三陽而已。其未滿三日者。邪在陽經。未入於裏。其病在表。宜汗之而愈。若經四日者。邪入陰經。其病在裏。宜下之而愈。特其大畧爾。蓋有一日而傳之數經者。亦有數日而尚在太陽者。陽病雖宜發汗。陽明之病反宜下之。陰病雖宜下。少陰之病或宜溫之。由人之稟受虛盛。其傳有遲速。又有不

其字下
脫脉字

傳經者。當審其脉證。凡此六經受病。五邪脉證各不同。傷風必惡風。其浮緩。傷寒者必惡寒。其脉浮緊。以至傷暑脉虛。傷溼脉濡。人迎緊盛爲傷寒。氣口緊盛爲傷食。診得五邪。知其本也。診得六經。知其標也。有病雖在表而不可汗者。或裏而不可下也。或若汗之太多。則津液燥竭。遂致亡陽。下之太早。則邪氣動膈。乃成結胸。清濁相干。則變爲霍亂。熱毒內瘀。則變爲瘀血。又或爲發黃者。溼熱相蒸也。或爲發斑者。陽毒太盛也。陽盛之人。得之於熱。乃爲陽毒。陰盛之人。得之於寒。乃爲陰毒。蟲動則爲狐惑。壞病之甚。則

爲百合。若勞復陰陽易之類。雖差後猶宜節慎。變態多端。不可備舉。當以類求之。皆以適當爲良。唯兩感之病。表裏皆受邪。爲難治。其他或陰證似陽。陽證似陰。或陰盛隔陽。陽盛隔陰者。在診病者以意詳之。

傷寒可汗

論曰。傷寒病。汗之而愈者。以初得病。一日至三日。陽經受邪。未傳諸陰。其邪在表。故當發汗。此大約也。然病數日。脉浮。太陽證不罷者。亦可汗之。當以脉證爲準。凡頭痛發熱。惡風振寒。是爲可汗之證。其脉浮者。是爲可汗之脉。陽虛

則惡寒。脉浮爲在表。或浮而弱。或浮而緊。或浮大而數。皆宜汁之。

麻黃湯方 治傷寒太陽病。頭痛發熱。身疼腰痛。骨節疼痛。惡風發熱。無汗而喘者。

麻黃

去根節
三兩

桂

去粗皮
三兩

甘草

炙一兩

杏仁

去粗皮
雙仁七

十枚 咬咀如麻豆大。每服五錢。水煎溫服。覆取微汗。不

須啜粥。餘如桂枝法將息。

大青龍湯方 治傷寒太陽中風。脉緊。發熱惡寒。身痛不汗出而煩躁。

清便之
下脫自
可二字

麻黃去根節六兩

桂去粗皮

甘草各二兩

杏仁去皮尖雙仁四十枚

生薑三兩

棗大者十枚

石膏一雞子大碎

咬咀如麻豆大每

服五錢水煎溫服脉微汗出惡風者不可服

桂枝麻黃各半湯方治傷寒太陽病得之八九日如瘧

狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便一日二三度

發脉微緩者為欲愈也脉微而惡寒者此陰陽俱虛

不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解

也以其不能得小汗出身必痒

桂去粗皮一兩半

芍藥

生薑

甘草

麻黃去根節各一兩

大棗

四枚

杏仁

三十四枚湯浸去皮尖雙仁

咬咀如麻豆大。每服五錢。水煎溫服。

桂枝湯方

治傷寒太陽病。外證未解。脉浮弱者。當以汗

解。

桂

去粗皮

芍藥

生薑

各三兩

甘草

二兩

大棗

十二枚

咬咀如麻豆大。每服五錢。水煎溫服。須臾啜熱稀粥。

助藥力取微汗。

麻黃附子甘草湯方

治傷寒少陰病。得之二三日。宜微

發汗。以二三日無裏證。故微發汗。

麻黃

去根節

甘草

各二兩

附子

一枚炮製去皮臍

咬咀如麻

豆大。每服五錢。水煎溫服。

葱豉湯方

治傷寒。初覺一二日。頭項腰脊痛。惡寒。

葱白

十四莖

豉

半合

乾薑

一分

麻黃

去根節

去粗皮

芍藥

各半兩

咬咀如麻豆大。每服五錢。水煎溫服。良久

投葱豉熱粥。蓋覆出汗。

葱粥方

治傷寒。服葱豉湯後。未得汗再服。

葱白

十莖并頭切

豉

三合炒

生薑

半兩拍碎

水五盞。煎至二

盞半。去滓入白米。依常法煮粥。入少鹽攪勻。任意食

之。衣覆出汗。未汗再服。

麻黃葛根湯方 治傷寒初得一二日出汗。

麻黃

去根節
一兩

葛根

柴胡

去苗各
一兩

芍藥

三分

每服五錢。水一盞。豉一百粒。開口椒七粒。連鬚葱白

三寸。薄荷二十葉。同煎熱服。服後葱豉湯一盞投之。

衣覆取汗。未快再服。

葛根湯方 治傷寒初覺頭痛惡寒壯熱腹內熱脉洪大。

一二日宜服。

葛根

黃芩

芷胡

去苗各
半兩

葱白

五莖

豉

合一

咬咀。每服五錢。生薑一棗大拍碎。同煎溫服。良久再

服。得汗即止。

麻黃解肌湯方 治傷寒初患一二日。體熱頭痛。

麻黃

去根節
一兩

石膏

碎

葛根

各一兩半

甘草

一分半

芍藥

杏仁

去皮尖雙仁
炒各一兩

桂

去粗皮
三分

每服五錢。生薑五片。水煎溫服。

葛根湯方 治傷寒一二日。頭痛壯熱。遍身疼痛。其脉洪

數。

葛根

白朮

芍藥

乾薑

各半兩

麻黃

去根節

根

根當作

去粗皮
各三分

甘草炙一分半

每服五錢。水煎熟服。如脉微即

加附子半兩。

石膏人參解肌湯方

治傷寒初得一二日。頭疼壯熱惡

寒。脉浮緊。

石膏碎

麻黃各一兩

芫胡去苗

人參各半兩

桂去粗皮

甘草各一分炙

葛根二兩

每服三錢。入葱豉生薑同煎熱服

十味人參湯方

治傷寒。頭痛體疼。寒熱不解。

人參厚朴

生薑汁炙

桂

甘草

杏仁

去皮尖雙仁炒

白朮

乾薑白茯苓

陳橘皮

湯浸去白各一兩

麻黃

去根節湯煮去沫二

兩

每服三錢。生薑二片。棗一枚。同煎熱服。纔覺傷風。

併三兩服。汗出立差。

羌活湯方 治傷寒表不解。頭痛體疼。發汗。

羌活 獨活 芫胡 前胡 人參 白茯苓 桔梗

芍藥 甘草 炙各一兩 枳殼 去瓢麩炒二兩 每服三錢。生薑二

片。薄荷少許。同煎溫服。不拘時。

蔥豉湯方 治傷寒。一日至三日以前。身熱脉大。肢體疼

痛。汗不出。

蒼朮 米泔浸去皮麩炒黃 麻黃 去根節湯煮去沫各二兩 甘草 炙 桂 各一兩

傷寒可汗

每服三錢。葱白三寸。鹽豉二十粒。同煎熱服。不拘時。
傷寒可下。

論曰。凡傷寒邪入於陰。其病在裏。法當下之。諸腹滿不大
便。或口燥舌乾而渴。或潮熱譫語。皆爲可下之證。諸診得
脉沈而實。卽爲可下之脉。但脉證已具。不必拘以日數。急
宜攻裏。若病雖過經。而裏證未備者。未可下也。故經曰。陽
盛陰虛。下之則愈。其法謂此。

陽明病。不吐不下。心煩者。可與調胃承氣湯。太陽病。三日發
汗不解。蒸蒸發熱者。可與調胃承氣湯。傷寒吐後。腹脹滿。

者可與調胃承氣湯。

調胃承氣湯方

甘草

炙二兩

大黃

以清酒洗四兩

咬咀。每服五錢。入芒硝一

錢。更煎一二沸。溫服。

陽明病。脉遲雖汗出。不惡寒者。其身必重。短氣腹滿而喘。有潮熱者。此外欲解。可攻裏也。手足濇然汗出者。此大便秘鞭也。與大承氣湯。若汗多微發熱惡寒者。外未解也。其熱不潮。未可與承氣湯。若腹大滿不通者。可與小承氣湯。微和胃氣。勿令至大泄下。大承氣湯主之。

大承氣湯方

大黃

酒洗 四兩

厚朴

炙半斤

枳實

麩炒 五枚

咬咀。每服五錢。

入芒硝一錢。同煎溫服。

陽明病。其人多汗。以津液外出。胃中燥。大便必鞭。鞭則譫語。小承氣湯主之。若一服譫語止者。勿再服。

小承氣湯方

大黃

四兩

厚朴

二兩

枳實

麩炒 大者

咬咀。每服五錢。水煎

溫服。初服湯當更衣。不爾者盡飲之。若更衣者勿服。

茈胡湯方

治傷寒四日以後。煩熱不解。大小腸澀。